

## مقایسه کارایی انواع بتا سیکلو دکسترين کراس لینک شده در حذف کلسترول کره

\*<sup>۱</sup> محسن وظیفه دوست

۱- استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

(تاریخ دریافت: ۹۵/۰۳/۲۱ تاریخ پذیرش: ۹۵/۰۶/۱۵)

### چکیده

کره یکی از فرآورده های لبنی مورد مصرف در کشور بوده که حاوی ویتامین های A، D و همچنین یک منبع با ارزش انرژی است. از طرفی مقدار کلسترول موجود در کره بسیار زیاد است و کلسترول عامل بسیاری از بیماری های قلبی و مرگ و میر ناشی از آن می باشد، به همین دلیل بعضی افراد از مصرف کره اجتناب می کنند. هدف از این مطالعه تولید کره با میزان کلسترول بسیار پایین است. بدین منظور کره با درصد های مختلفی (۵، ۱۰ و ۱۵) از بتا سیکلو دکسترين کراس لینک شده با دو اسید آلی متفاوت (اسید آدپیک و سیتریک) کلسترول زدایی گردید، سپس کلسترول باقیمانده در کره تیمار شده، اندازه گیری شد. هم‌زمان آزمایشات حسی در مورد نمونه های کره تیمار شده نیز انجام گردید. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که نمونه کره تیمار شده با ۱۵ درصد بتا سیکلو دکسترين کراس لینک شده با اسید سیتریک، به میزان ۹۲ درصد کلسترول کره را کاهش داد و همچنین مشخص شد کارایی بتا سیکلو دکسترين کراس لینک شده با اسید سیتریک بیشتر از بتا سیکلو دکسترين کراس لینک شده با اسید آدپیک بود. نتایج حسی نشان داد که بین طعم و بافت کره کلسترول زدایی شده و کره شاهد اختلاف معنی داری وجود نداشت، اما بین رنگ، بو و پذیرش کلی نمونه کره کلسترول زدایی شده با شاهد اختلاف معنی داری مشاهده شد ( $p < 0.05$ ). از نظر ویژگیهای حسی، نمونه کره کلسترول زدایی شده با ۱۵ درصد بتا سیکلو دکسترين کراس لینک شده با اسید آدپیک بالاترین امتیاز را کسب نمود.

**کلید واژگان:** بتا سیکلو دکسترين ، کلسترول ، کره، کراس لینک ، اسید آدپیک ، اسید سیتریک

ین و تسای ۱۹۹۵) با استفاده از ۵ درصد بتا سیکلو دکستربن، حدود ۹۰ درصد کلسترول لارد را جداسازی کردند [۶] و همچنین آریافر و همکاران (۱۳۸۶) از بتا سیکلو دکستربن برای کاهش کلسترول روغن کره استفاده کردند و توانستند به میزان ۷۵ درصد کلسترول را کاهش دهند [۷] و ظهیر اقدام و زندی (۱۳۸۴) کلسترول پیه گاو را با استفاده از بتا سیکلو دکستربن به تنهایی تا میزان ۸۰ درصد و بهمراه فرآیندهای تصفیه تا میزان ۹۰ درصد جدا کردند [۸]. علاوه بر آن، بتا سیکلو دکستربن در کشورهای اروپایی در سطح تجاری در مورد برخی مواد غذایی مثل شیر و چربی کوهان شتر به کار می‌رود [۹]، اما مقداری از این ترکیب در داخل ماده غذایی باقی می‌ماند و بازیافت نمیشود ضمن اینکه از بتا سیکلو دکستربن به دفعات مختلف نمی‌توان استفاده کرد به همین دلیل بعضی از دانشمندان استفاده از بتا سیکلو دکستربن کراس لینک شده را مورد استفاده قرار داده اند بعنوان مثال در مورد زرده تخم مرغ اینکار انجام شده است و بتا سیکلو دکستربن کراس لینک شده (دارای اتصالات عرضی) ۸۴ درصد ظرفیت جذبی خود را پس از ۱۲ بار استفاده در فرآیند کلسترول زدایی حفظ کرده بود [۶]. به روشهای مختلفی بتا سیکلو دکستربن را می‌توان کراس لینک نمود که از جمله میتوان به استفاده از اسیدهای آلی مختلف مثل اسید آدیپیک اشاره کرد [۱۱].

با توجه به اینکه اسید آدیپیک یک اسید گرانقیمت است و لذا هزینه تولید بتا سیکلو دکستربن کراس لینک شده با اسید آدیپیک، و متعاقباً هرینه کلسترول زدایی، بالا خواهد بود و از طرفی بخاطر افزایش راندمان کلسترول زدایی، مطالعه حاضر انجام شد. هدف از این مطالعه، مقایسه کارایی بتا سیکلو دکستربن کراس لینک شده با اسید آدیپیک و اسید سیتریک در حذف کلسترول کره می‌باشد.

## ۲- مواد و روش ها

### ۲-۱- مواد

مواد شیمیابی مورد نیاز شامل اسید آدیپیک، اسید سیتریک، دی سدیم فسفات، سود، اسید استیک، α-کلستان، بتا سیکلو دکستربن و کلسترول مورد نیاز از شرکت مرك و کره از شرکت بینالود تهیه شد.

### ۲-۲- آماده سازی کره برای فرآوری

## ۱- مقدمه

کره یکی از قدیمی ترین فرآورده های شیری می‌باشد که در نتیجه تغییر امولسیون خامه طی هم زدن بدست می‌آید و بخاطر طعم و مزه مطلوب مورد توجه مردم است، اما کره حاوی مقادیر بالایی از کلسترول است [۱]. هر ۱۰۰ گرم کره حدود ۲۵۰ میلی گرم کلسترول دارد. در عین حال که کره سرشار از ویتامین های A و D بوده و منبع خوبی برای دریافت انرژی می‌باشد و از طرفی حاوی اسید چرب لینوئیک کثروگه می‌باشد که برای قلب و عروق مناسب است ولی بخاطر کلسترول بالا بعضی افراد از آن ممکن است اجتناب کنند. یکی از راه های کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی، کاهش مصرف غذاهای حاوی کلسترول یا حذف کلسترول از چنین غذاهایی است به همین دلیل، تحقیقات متعددی برای کاهش کلسترول مواد غذایی انجام گرفته و روش های گوناگونی در این خصوص ارائه شده است که برخی از آنها عبارتند از: تقطیر، استخراج با دی اسید کربن، جذب سطحی با ساپونین و دیژیتونین، حالت فوق بحرانی، استخراج با حلal های آلی، تجزیه کلسترول با کلسترول اکسیداز، استفاده از انیدرید های حلقوی و پلی بازها، و استفاده از انیدرید های حلقوی و پلی بازها [۲].

بیشتر این روش ها غیرانتخابی هستند؛ یعنی علاوه بر کلسترول، ترکیبات مغذی و معطر ماده غذایی را نیز کاهش می‌دهند. همچنین، هزینه سرمایه گذاری و عملیاتی زیادی در بردارند، غیر اقتصادی هستند و حتی در برخی موارد اینمنی ماده غذایی را به خطر می‌اندازند [۳]، اما استفاده از بتا سیکلودکستربن مشکلات ذکر شده را ندارد.

بتا سیکلو دکستربن یک الیگوساکارید حلقوی مرکب از هفت واحد گلوكز است که با پیوندهای آلفای، ۱ به هم متصل شده اند. در مرکز مولکول این ماده، حفره ای وجود دارد که می‌تواند با ترکیبات مختلف از جمله کلسترول تشکیل کمپلکس دهد [۴]. علاوه این ترکیب غیرهیگروسکوپیک از نظر شیمیابی، پایدار و به آسانی قابل جدا کردن است. همچنین این ترکیب غیر سمی است و قابل جذب در روده کوچک نبوده و در کولون بوسیله میکروفلورای موجود در کولون متابولیزه می‌شود و از سال ۱۹۹۸ در لیست GRAS (مواد غذایی اینمن شناخته شده) قرار گرفته است [۵]. بنابراین می‌تواند به عنوان یک ماده مناسب برای حذف کلسترول از مواد غذایی به کار رود.

برای اندازه گیری کلسترون، ابتدا کلسترون از نمونه های کره، مطابق روش آدامز و همکاران (۱۹۸۶) استخراج شد [۱۳]. بدین صورت که یک گرم از کره داخل یک لوله با درب پیچی ریخته و یک سی سی آلفا کلستان (۱mg/ml) به آن اضافه شد. نمونه در دمای ۶۰ درجه به مدت ۳۰ دقیقه با ۵ سی سی از محلول هیدروکسید پتاسیم آتانولیک ۲ مولار صابونی شد. بعد از سرد کردن در دمای اتاق، کلسترون با ۵ سی سی هگزان استخراج شد و این فرآیند ۴ بار تکرار شد. لایه های هگزان به یک round bottomed flask منتقل شدند و تحت خلاء خشک گردیدند. عصاره مجددا در ۱ سی سی از هگزان حل شد و در دمای منهای ۲۰ تا زمان تزریق به ستون GC نگهداری شد.

جهت انجام گازکروماتوگرافی جرمی از روش سون و همکاران (۲۰۰۹) استفاده گردید. بدینصورت که از یک ستون (HP-5, 30m × 0.32mmid × 0.25 μm) به دتکتور flame-ionization که دمای اینجکتور و دتکتور ۱۷۰ و درجه ۳۰۰ استفاده گردید. درجه حرارت از ۲۰۰ به ۳۰۰ درجه سلسیوس با سرعت ۱۰ دقیقه سلسیوس در دقیقه برنامه ریزی شد و سپس برای ۲۰ دقیقه ثابت نگه داشته شد. از گاز نیتروژن با سرعت جریان ۲ سی سی در دقیقه استفاده گردید. حجم نمونه تزریق شده ۲ میکرولیتر با نسبت ریزش ۱:۵۰ بود [۴].

درصد کاهش کلسترون به شکل ذیل محاسبه شد:  
میزان کلسترون موجود در کره های تیمار شده بر میزان کلسترون موجود در شاهد تقسیم شده و نتیجه در عدد ۱۰۰ ضرب گردید و سپس از عدد ۱۰۰ کم شد.

## ۶-۱- روش ارزیابی حسی

جهت ارزیابی حسی کره های کلسترون زدایی شده با بتا سیکلودکسترین کراس لینک شده با اسید سیتریک و اسید آدیپیک و مشخص کردن نمونه های برتر از روش هدونیک ۵ نقطه ای (امتیاز ۱ خیلی بد و امتیاز ۵ خیلی خوب) استفاده شد و طبق روش محمدی ثانی و همکاران (۱۳۸۵) عمل ارزیابی حسی انجام گرفت [۱۴].

## ۷-۱- روش آماری

طرح آماری بکار رفته کاملاً تصادفی فاکتوریل بود و از نرم افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید و برای ویژگیهای حسی آزمون Post Hoc و جهت مقایسه

ابتدا کره را ذوب و به دمای ۳۵ درجه رسانده شد، سپس به نسبت ۱:۱ با آب مقطر مخلوط و با غاظت های مختلف (۵، ۱۰ و ۱۵ درصد) از دو نوع بتا سیکلودکسترین کراس لینک شده (با اسید سیتریک و اسید آدیپیک) مخلوط گردید و روی دستگاه شیکر مجهز به هیتر تحت دمای ۳۵ درجه سلسیوس به مدت ۸ ساعت مخلوط و همزده شد و سپس با کمک سانتریفیوژ (دور ۱۰۰۰ و زمان ۱۵ دقیقه)، سوپر ناتانت استخراج و تحت آزمایشها لازم قرار گرفت.

## ۳-۲- روش کراس لینک بتا سیکلودکسترین با اسید آدیپیک

برای این منظور ۱۰۰ گرم بتا سیکلودکسترین را با ۸۰ میلی لیتر آب مقطر مخلوط کرده و در دمای محیط با یک همزن شروع به آهستگی شروع به همزدن کرده و این کار را به مدت ۲ ساعت ادامه می دهیم. سپس ۵ گرم اسید آدیپیک اضافه شده و pH بوسيله NAOH یک نرمال روی عدد ۱۰ تنظیم می شود. محلول بتا سیکلودکسترین در دمای اتاق برای مدت ۹۰ دقیقه همزده شده و سپس با اسید استیک روی pH مساوی با ۵ تنظیم می شود. مخلوط را از کاغذ صافی واتمن ۲ عبور می دهیم و ۳ بار با ۱۵۰ میلی لیتر آب مقطر شستشو می دهیم. بتا سیکلودکسترین کراس لینک شده در دمای ۶۰ درجه داخل یک آون در مدت زمان ۲۰ ساعت خشک گردید و سپس از عبور داده شد [۱۱].

## ۴-۲- روش کراس لینک بتا سیکلودکسترین با اسید سیتریک


جهت تولید بتا سیکلودکسترین کراس لینک شده با اسید سیتریک از روش کاسپریزیک و همکاران (۲۰۱۰) استفاده شد. اسید سیتریک (CTR)، بتا سیکلودکسترین (CD) و NA<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> با نسبت مولی به ترتیب ۱:۲:۶ مخلوط شده و در دمای ۱۷۰ درجه سانتیگراد برای مدت ۲۰ دقیقه حرارت دیدند. سپس محصول تولید شده ساییده گردید و در آب مقطر خیسانده و سپس سانتریفیوژ شد. این کار چند بار تکرار شد بطوری که سوپر ناتانت عاری از مواد واکنش نداده شود. پس از آن محصول بدست آمده در دمای ۶۰ درجه خشک و سپس پودر شد و از غربال با مش عبور داده شد [۱۲].

## ۵-۲- روش استخراج و اندازه گیری کلسترون

میانگین داده ها، روش دانکن بکار گرفته شد و نمودار ها با نرم افزار EXEL رسم شدند.

### ۳- نتایج و بحث


میزان کلسترول باقیمانده در نمونه های کره تیمار شده با دستگاه GCMS اندازه گیری شد که نمونه هایی از پیک های بدست آمده از دستگاه ، مربوط به کره تیمار شده با بتا سیکلو دکسترین کراس لینک شده با اسید سیتریک با غلظت ۱۵ درصد(شکل ۱) و با بتا سیکلو دکسترین کراس لینک شده با اسید آدیپیک با غلظت ۵ درصد(شکل ۲) در ذیل مشاهده می گردد.



**Fig 2** the courier obtained from the GCMS device for the sample treated with 5% beta-cyclodextrin cross-linked by adipic acid

### ۱-۳- تاثیر تیمار های مختلف بتاسیکلو دکسترین کراس لینک شده با اسید سیتریک بر میزان کلسترول کره

طبق نمودار شماره ۱ میزان کاهش کلسترول با افزایش غلظت بتاسیکلودکسترین افزایش یافته است. همانطور که مشاهده می گردد بین شاهد و سایر تیمار ها اختلاف معنی داری در سطح اطمینان ۹۵ درصد وجود داشت. کمترین میزان کلسترول مربوط به نمونه تیمار شده با ۱۵ درصد بتا سیکلو دکسترین کراس لینک شده با اسید سیتریک با مقدار ۱۹/۶ میلی گرم می باشد که در مقایسه با شاهد حدود ۹۲ درصد در میزان کلسترول کاهش بوجود آمده است. با افزایش غلظت بتاسیکلودکسترین ، کاهش بیشتری در میزان کلسترول کره بوجود آمده است. با توجه به اینکه هر چه تعداد ملکولهای بتا سیکلو دکسترین بیشتر باشد تعداد ملکولهای بیشتری از کلسترول را بخود باند می کند لذا انتظار داریم کلسترول کره به میزان بیشتری کاهش یابد. که با




**Fig 1** the courier obtained from the GCMS device for the sample treated with 15% beta-cyclodextrin cross-linked by citric acid

سیکلودکسترین حدود ۹۰ درصد کلسترول حذف می‌گردد<sup>[۶]</sup>.

این مسئله توسط سایر محققان نیز به اثبات رسیده است. از آن جا که مولکول بنا سیکلو دکسترن یک اولیگو ساکاراید با هفت مولکول واحد قندی است که به نحوی آرایش یافته اند که می‌توانند مولکول‌های خاصی از جمله کلسترول را در خود جای دهند. مهمترین ویژگی‌های بنا سیکلودکسترن قابلیت دربرگیری کمپلکس‌های جامد (کمپلکس‌های میزان) با طیف وسیعی از ترکیبات جامد-مایع و گاز بصورت کمپلکس می‌باشد. در این نوع کمپلکس‌ها مولکول هدف به وسیله حفره مولکول‌های بنا سیکلودکسترن محصور می‌شود و تشکیل کمپلکس با جفت شدن مولکول هدف درون حفره بنا سیکلو دکسترن شکل می‌گیرد<sup>[۱۷]</sup>. بعلاوه حفره داخلی غیر قطبی و خاصیت آبگریزی دارد و با وجود این حفره بنا سیکلودکسترن قادر است مولکول‌های آب گریز را در خود جای دهد. کلسترول از جمله چربیهایی است که قادر است درون حفره جای گرفته و به همراه بتاسیکلودکسترن خارج شود. در عوض جداره خارجی مولکول خاصیت آب دوستی دارد و میتواند با مولکول‌های آب دوست از جمله خود بتاسیکلودکسترن تشکیل کمپلکس داده و سبب جلوگیری از جای دادن مولکول کلسترول درون حفره‌ها گردد. لذا وجود بتاسیکلودکسترن اضافی شناس جذب مولکول‌های کلسترول را کاهش می‌دهد<sup>[۱۵]</sup>.

همچنین Mihan و همکاران سال ۲۰۰۵ به نتیجه مشابهی دست یافتند بطوریکه با افزودن غلظت‌های ۱ تا ۲۰ درصد از بنا سیکلو دکسترن به خامه توائیتند حدود ۹۰/۷ درصد از کلسترول خامه را کاهش دهند و نتایج بدست آمده در مطابقت با مطالعه Jung و همکاران در سال ۲۰۰۵ و Kim و همکاران در سال ۲۰۰۶ می‌باشد<sup>[۱۹,۱۸,۱۱]</sup>.

نتیجه آریافر و همکاران(۱۳۸۶) مطابقت دارد<sup>[۷]</sup> و همچنین آهن و واک (۱۹۹۹) اعلام کردند که با افزایش غلظت بنا سیکلو دکسترن میزان کاهش کلسترول خامه بیشتر می‌شود<sup>[۱۵]</sup> و رودربرگ و همکاران در سال ۱۹۹۳ نیز به نتیجه مشابهی دست یافتند<sup>[۱۶]</sup>. البته لازم به ذکر است که استفاده از بتاسیکلودکسترن کراس لینک شده با اسید سیتریک برای اولین بار است که در جهان و توسط این مطالعه جهت کلسترول زدایی از کره بکار گرفته شده است.




**Chart 1** the amount of cholesterol remaining in the butter treated by beta-cyclodextrin cross-linked with citric acid


### ۳-۲-۳- تاثیر بتاسیکلودکسترن کراس لینک شده

#### با اسید آدیپیک بر میزان کلسترول کره

همانطور که در نمودار شماره ۲ ملاحظه می‌گردد، با افزایش غلظت بنا سیکلودکسترن میزان کاهش کلسترول در کره بطور معنی داری کاهش یافته است و اختلاف معنی داری بین نمونه کره تیمار شده با ۱۵ درصد بنا سیکلو دکسترن با سایر تیمارها و از جمله شاهد در سطح اطمینان ۹۵ درصد وجود داشت. بیشترین میزان کاهش مربوط به غلظت ۱۵ درصد بنا سیکلو دکسترن کراس لینک شده با اسید آدیپیک با میزان ۱۹/۷۵ میلی گرم که در مقایسه با شاهد، کاهشی معادل ۹۱/۸ درصد کلسترول بدست آمد. در مطالعه‌ای کهین و تسای سال ۱۹۹۵ بر روی برداشت کلسترول از پیه خوک انجام دادند هم به همین نتیجه رسیدند و اعلام کردند که همبستگی شدیدی بین غلظت بتاسیکلودکسترن کراس لینک شده با اسید آدیپیک و میزان کاهش کلسترول وجود دارد بطوریکه در غلظت ۱۰ درصد بنا



**Chart 3** Comparison of efficiency of two methods of cholesterol reduction



**Chart 2** the amount of cholesterol remaining in the butter treated by beta-cyclodextrin cross-linked with adipic acid

۳-۳- مقایسه تاثیر بین کلسترول زدایی بواسیله بتاسیکلولو دکسترین کراس لینک شده با اسید آدیپیک و اسید سیتریک

همانطور که در نمودار شماره ۳ ملاحظه می گردد بین میزان کاهش کلسترول نمونه های کره با استفاده از غلظت های ۵ و ۱۰ درصد بتا سیکلولو دکسترین کراس لینک شده با اسید آدیپیک و اسید سیتریک اختلاف معنی داری در سطح اطمینان ۹۵ درصد وجود ندارد. همچنین با توجه به مطالعات انجام گرفته توسط آریافر و همکاران در سال ۱۳۸۶ هیچگونه تفاوت معنی داری بین بافت کره کلسترول زدایی شده با بتا سیکلولو دکسترین و کره شاهد در زمان تولید و در حین نگهداری آنها مشاهده نگردید که علت بیان شده عدم اختلاف معنی دار ترکیب اسید های چرب نمونه شاهد و نمونه تیمار شده ذکر گردیده است [۷] و مطالعه صورت گرفته توسط سیف هاشمی و تقنگ سازان (2011) نیز بر روی کلسترول زدایی از روغن کره هیچگونه اختلاف معنی داری را از نظر فیزیکی (بافت) بین شاهد و تیمار ها نشان نداد [۲۰] که مطالعه حاضر با نتایج بدست آمده از مطالعات فوق همخوانی دارد اما بین رنگ، بو و پذیرش کلی کره کلسترول زدایی شده و کره شاهد اختلاف معنی داری وجود داشت ( $p < 0.05$ ).

### ۴-۴- ارزیابی حسی کره

نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که بین طعم و بافت کره کلسترول زدایی شده با بتاسیکلولو دکسترین کراس لینک شده با اسید آدیپیک و اسید سیتریک با شاهد اختلاف معنی داری در سطح اطمینان ۹۵ درصد وجود ندارد. همچنین با توجه به مطالعات انجام گرفته توسط آریافر و همکاران در سال ۱۳۸۶ هیچگونه تفاوت معنی داری بین بافت کره کلسترول زدایی شده با بتا سیکلولو دکسترین و کره شاهد در زمان تولید و در حین نگهداری آنها مشاهده نگردید که علت بیان شده عدم اختلاف معنی دار ترکیب اسید های چرب نمونه شاهد و نمونه تیمار شده ذکر گردیده است [۷] و مطالعه صورت گرفته توسط سیف هاشمی و تقنگ سازان (2011) نیز بر روی کلسترول زدایی از روغن کره هیچگونه اختلاف معنی داری را از نظر فیزیکی (بافت) بین شاهد و تیمار ها نشان نداد [۲۰] که مطالعه حاضر با نتایج بدست آمده از مطالعات فوق همخوانی دارد اما بین رنگ، بو و پذیرش کلی کره کلسترول زدایی شده و کره شاهد اختلاف معنی داری وجود داشت ( $p < 0.05$ ).

### ۴-۵- ارزیابی حسی رنگ کره کلسترول زدایی

شده با بتاسیکلولو دکسترین کراس لینک شده با اسید آدیپیک و سیتریک

همانطور که در نمودار شماره ۴ مشاهده می گردد، بیشترین امتیاز رنگ مربوط به نمونه F و کمترین امتیاز رنگ مربوط به نمونه های A و شاهد است و اختلاف معنی داری بین نمونه




Chart 5 sensory evaluation of butter smell

### ۷-۳- ارزیابی حسی پذیرش کلی کره کلسترول

#### زدایی شده با بتاسیکلو دکسترین کراس لینک

#### شده با اسید آدیپیک و سیتریک

طبق نمودار شماره ۶ اختلاف معنی داری بین پذیرش کلی نمونه F با سایر نمونه ها و شاهد در سطح اطمینان ۹۵ درصد مشاهده می گردد. در نمونه های تیمار شده با بتا سیکلو دکسترین کراس لینک شده با اسید آدیپیک یک ارتباط مستقیمی بین میزان افزایش غلظت بتا سیکلو دکسترین و افزایش امتیاز پذیرش کلی مشاهده می شود(نمونه های D، E و F). بالاترین امتیاز پذیرش کلی متعلق به نمونه F و کمترین امتیاز متعلق به نمونه B می باشد. با توجه به اینکه امتیازات رنگ و بوی نمونه F بالاتر از سایر نمونه ها بود لذا انتظار داریم که نمره پذیرش کلی بالاتری نسبت به سایر نمونه ها داشته باشد.

و نمونه های D، E، A و شاهد وجود دارد( $p<0.05$ ). همچنین بین تیمار های B، C و E، B و D اختلاف معنی داری وجود ندارد. یکی از دلایل احتمالی که باعث کاهش امتیاز رنگ کره کلسترول زدایی شده با بتا سیکلو دکسترین کراس لینک شده با اسید سیتریک در مقایسه با اسید آدیپیک می توان ذکر کرد احتمالاً تاثیر جانی کمپلکس ایجاد شده بر رنگ کره باشد.




Chart 4 sensory evaluation of butter color

### ۶-۳- ارزیابی حسی بوی کره کلسترول زدایی

#### شده با بتاسیکلو دکسترین کراس لینک شده با

#### اسید آدیپیک و سیتریک

همانطور که در نمودار شماره ۵ مشاهده می گردد، بین تیمار های F و سایر تیمار ها اختلاف معنی داری در سطح اطمینان ۹۵ درصد وجود دارد. اما بین تیمار های A، B و بین تیمار های C، D و شاهد اختلاف معنی داری دیده نمی شود. بیشترین امتیاز بوی کره مربوط به نمونه F و بعد از آن E و کمترین امتیاز بوی کره بترتیب مربوط به تیمار B و A می باشد. از جمله دلایل کاهش امتیاز بوی نمونه های کره تیمار شده با بتاسیکلو دکسترین کراس لینک شده با اسید سیتریک در مقایسه با اسید آدیپیک می توان احتمالاً به تاثیر منفی کمپلکس بتا سیکلو دکسترین کراس لینک شده با اسید سیتریک بر چربی و اسید های چرب کره اشاره کرد.


سیتریک حدود ۹۲ درصد و در نمونه کره تیمار شده با ۱۵ درصد بتا سیکلولو دکستربن کراس لینک شده با اسید آدیپیک ۹۱/۸ درصد و لذا حدود ۰/۲ درصد میزان کاهش کلسترول توسط بتا سیکلولو دکستربن کراس لینک شده با اسید سیتریک بیشتر از اسید آدیپیک بود. همچنین نتایج حسی نشان داد که بین طعم و بافت کره کلسترول زدایی شده و کره شاهد اختلاف معنی داری وجود ندارد اما بین رنگ، بو و پذیرش کلی نمونه کره کلسترول زدایی شده با شاهد اختلاف معنی داری در سطح اطمینان ۹۵ درصد مشاهده شد و از نظر ویژگیهای حسی نمونه کره کلسترول زدایی شده با ۱۵ درصد بتا سیکلولو دکستربن کراس لینک شده با اسید آدیپیک بالاترین امتیاز را کسب نمود.

## ۵- تشکر و قدردانی

بدین وسیله از دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور که حمایت های لازم را از طرح پژوهشی با عنوان "مقایسه کارایی انواع بتا سیکلولو دکستربن کراس لینک شده در حذف کلسترول کره" بعمل آورده و مقاله حاضر از آن استخراج شده است، قدردانی و تشکر می گردد.

## ۶- منابع

- [1] Taghvaie, Z. Taslimi, A. and Mazloumi, M.T. 2006. survey the production of low cholesterol cheese by sunflower oil. journal of food science and technology, 3(1). 1-11.
- [2] Heshmati, E. 2009. Reducing of cholesterol of butter oil by Soy lecithin. Journal of nutrition and food science, 4(3), 75-80.
- [3] Kodali, D.R.2001. Removal of sterols from fats and oils. US Patent 6,303,803.
- [4] Seon,k.h.,ahn.j. and kwak,h.s.2009. The accelerated ripening of cholesterol-reduced Cheddar cheese by crosslinked  $\beta$ -cyclodextrin. Journal of Dairy Science, 92,49-57.
- [5] Yamamoto, S. Kurihara, H. Mutoh, T. Xing, X. and Onno, H. 2005. Cholesterol recovery from inclusion complex of beta-cyclodextrin and cholesterol by aeration at elevated temperatures. Biochemical Engineering Journal, 22(3),197-205.
- [6] Yen, G.C. and Tsai L.G.1995. Cholesterol removal from a lard – water mixture with  $\beta$  -



**Chat 6** Sensory evaluation of the general acceptance of butter

## ۴- نتیجه گیری

کره یکی از فرآوردهای لبندی مورد مصرف در کشور است و بخاطر طعم و مزه مطلوب مورد توجه مردم است. اما مقدار کلسترول موجود در آن بسیار زیاد است. در عین حال که کره سرشار از ویتامین های A و D بوده و منع خوبی برای دریافت انرژی می باشد و از طرفی حاوی اسید چرب لیونلیک کثیروگه می باشد که برای قلب و عروق مناسب است ولی بخاطر کلسترول بالا بعضی افراد از آن ممکن است اجتناب کنند. به همین دلیل در این تحقیق سعی شد با استفاده از دو نوع بتا سیکلولو دکستربن کراس لینک شده با اسید سیتریک و آدیپیک میزان کلسترول کره کاهش داده شود و کارایی این دو روش با هم مقایسه و نمونه های مختلف کره تولید شده مورد ارزیابی حسی قرار گیرند. نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر نشان دهنده آن بود که اختلاف معنی داری بین نمونه های کره تیمار شده با غلطت های ۵ و ۱۰ درصد بتا سیکلولو دکستربن کراس لینک شده با اسید سیتریک نسبت به بتا سیکلولو دکستربن کراس لینک شده با اسید آدیپیک بود ( $p < 0.05$ ) و هر چند که اختلاف معنی داری بین غلطت های ۱۵ درصد بتا سیکلولو دکستربن کراس لینک شده با اسید سیتریک و آدیپیک وجود نداشت اما میزان کاهش کلسترول در نمونه کره تیمار شده با ۱۵ درصد بتا سیکلولو دکستربن کراس لینک شده با اسید

- cholesterol in meats. J. Assoc. Anal. Chem. 69,844-846.
- [14] Sany, A.,Ehsani, M.,Asadi, M.M.2006 . survey of metabolites of shermanii propionibacterium on sensory properties and shelf-life from cheese Iran. journal of research and manufacturing ,70.
- [15] Ahn, J. and Kwak, H.S. 1999. Optimizing cholesterol removal in cream using  $\beta$ -cyclodextrin and response methodology. Journal of Food Science, 64 (4), 629-632.
- [16] Roderbourg, H. Dalemans, D. and Bouhon, R.1993. Process for reducing the cholesterol and free fatty acids in an animal fat. US Patent .5, 232, 725.
- [17] Martin, E.M. 2004. Cyclodextrins and their uses: a review. Process Biochemistry, 39,1033–1046.
- [18] Jung, T.H. Kim, J.J. Yu, S.H. Ahn J and Kwak, H.S.2005. Properties of Cholesterol-reduced Butter and Effect of Gamma Linolenic Acid Added Butter on Blood Cholesterol. Asian-Aust. J. Anim. Sci.. ,18(11) , 1646-1654.
- [19] Kim, J.J. Jung, T.H. Ahn, J. and Kwak, H.S. 2006. Properties of cholesterol-reduced butter made with b- cyclodextrin and added evening primrose oil and phytosterols. Journal of Dairy Science, 89, 4503-4510.
- [20] Seif Hashemi, C. and Tofangsazan, F. 2011. Method of industrial producing of free cholesterol -butter oil, twentieth national congress of food science and technology, Tehran.
- cyclodextrin. Journal of Food Science, 60, 561 – 564.
- [7] Aryafar, M. and Zandi, P. 2007. Production of low cholesterol butter with  $\beta$  - cyclodextrin. Journal of nutrition and food science, 2(3),23-32.
- [8] Zahir Agdam, H. and Zandi, P. 2006. Effects of purification and treatment by  $\beta$ -cyclodextrin on the rate of cholesterol reduction of beef tallow,1(1), 1-6.
- [9] Elsanhoty,M.R. Elgoherly,S.S. and Badr,F.H.2011. Cholesterol reduction in camel hump fat using b-cyclodextrin. 6,183– 189.
- [10] Lee, D. K., J. Ahn, and H. S. Kwak. 1999. Cholesterol removal from homogenized milk with  $\beta$ -cyclodextrin. Journal of Dairy Science, 82,2327–2330.
- [11] Mihan, E. Kim, S.H. Ahn, J. and Kwak, H.S.2007. Optimizing cholesterol removal from cream using  $\beta$ -cyclodextrin cross – linked with adipic acid . International Journal of Dairy Technology, 60 (1),31-36.
- [12] Kasprzyk, W. Bednarz, S. and Bogdal, D.2010. Sorption properties of  $\beta$ -cyclodextrin—citric acid derivatives. 14<sup>th</sup>International Electronic Conference on Synthetic organic chemistry(Ecsoc-14) <http://www.sciforum.net> & <http://www.usc.es/congresos/ecsos> 1-30.
- [13] Adams, M. L. Sullivan, D.M. Smith, R.L. and Richer, E.F. 1986. Evaluation of direct saponification method in determination of

## Comparing the performance of the different types of cross-linked beta-cyclodextrin in removing the cholesterol from butter

Vazifedost, M.<sup>1\*</sup>

1. department of food science and technology, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran

(Received: 2016/06/10 Accepted: 2016/09/05)

Butter is one of the dairy products consumed in Iran that contains vitamins A, D, and also, it is a valuable source of energy. On the one hand, the amount of cholesterol is very high in butter and cholesterol causes many coronary heart diseases and the deaths as a result of it, so, some people avoid the consumption of butter. This study aimed to produce the butter with very low cholesterol. To this end, the cholesterol of the butter was removed by different percent (5, 10 and 15) of cross-linked beta-cyclodextrin with two different organic acid (adipic acid and citric), then, the residual cholesterol in treated butter was measured. Simultaneously, the sensory analysis was performed on treated butter samples. The results show that the butter sample treated by 15 percent of cross-linked beta-cyclodextrin with citric acid reduces 92 percent of cholesterol in butter and also, it was found that the performance of cross-linked beta-cyclodextrin with acid citric is more than the performance of cross-linked beta-cyclodextrin with adipic acid. The results of sensory experiments show that there no significant differences between the taste and texture of the treated butter and control butter but there are significant differences between the color, odor and overall acceptability of the treated butter and control butter ( $p<0.05$ ). In terms of sensory properties, the butter treated by 15 percent of cross-linked beta-cyclodextrin with adipic acid obtained the highest score.

**Key words:** Beta-cyclodextrin, Butter, Cross-linked, Adipic acid, Citric acid

\*Corresponding Author E-Mail Address:: imi\_vazifedost@yahoo.com