



بررسی تابش فرابنفش و مرئی بر استافیلوكوکوس اورئوس، سودوموناس آنروژینوزا محیط کشت و شمارش کلی میکروب دهان و سطوح جامد

محمد گلی^{1*}، شریفه شاهی^{2*}، مهدی مقصی³، رحمان امینی³، میترا منصوری بنی¹، محمد درویشی²،
محسن رنجبران²

- 1- گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوارسگان)، اصفهان، ایران.
- 2- مرکز تحقیقات لیزر و بیوفوتونیک در فناوریهای زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوارسگان)، اصفهان، ایران.
- 3- گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوارسگان)، اصفهان، ایران.
- 4- دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوارسگان)، اصفهان، ایران.
- 5- عضو حرفه‌ای، بنیاد تحقیقات جراحی فک و صورت و ایمپلنتولوژی و بیومتریال.

چکیده

اطلاعات مقاله

تاریخ های مقاله :

تاریخ دریافت: 1401/02/01

تاریخ پذیرش: 1401/03/17

تابش غیر یونیزان فرابنفش بخشی از ناحیه طیف امواج الکترومغناطیس است که دارای اثر زیان آور شناخته شده بر میکرووارگانیسم ها شامل باکتریها، ویروسها و قارچها می باشد. هدف از این پژوهش در دوران مبارزه با ویروس ها و غلبه بر میکرووارگانیسم های متنوع بیماریزا، بررسی ویژگیهای موثر و مضر این نوع تابش در سه ناحیه (UVC، UVB، UVA) با رویکرد خواص بیولوژیکی و موارد کاربردی در ضدغفونی و استریلیزه کردن می باشد. در این مطالعه پژوهشی به منظور اثر بخشی بر میکرووارگانیسم ها در ناحیه طیفی فرابنفش و پیرامون آن نزدیک ناحیه مرئی، از دو نمونه آزمون با لامپ های تجاری UVC و blue-LED استفاده شد. در این پژوهش به بررسی اثر تابش UVC بر میکرووارگانیسم های بیماریزا استافیلوكوکوس اورئوس و سودوموناس آنروژینوزا موجود در محیط مایع و کشت سطحی جامد، بررسی اثر تابش UVC بر شمارش کلی میکروب های سطحی جامد کاغذی و تلفن همراه پرداخته شد. در اخر به بررسی اثر نور مرئی ال ای دی در ناحیه آبی بر شمارش کلی میکروب های دهانی متصل به مسوک پس از مسوک زنی مورد بررسی قرار گرفت. در دو آزمون انجام گرفته با تابش در ناحیه فرابنفش و نزدیک آن در ناحیه مرئی، اثر کشنیدگی بر باکتریها و میکرووارگانیسم های کلی با بیش از 90 درصد اثربخشی و نابودی باکتریها نتیجه گیری شد که نشانگر موثر بودن این گونه تابش ها در ضدغفونی، باکتری زدایی و استریلیزه کردن مواد دارد. بررسی های طیف سنجی لامپ های تجاری در ناحیه فرابنفش همراه با خواص اثر بخشی آنها بر میکرووارگانیسم زدایی شاهدی بر مفید بودن این نوع تابش علاوه بر خطرات بیولوژیکی آن دارد که لزوم مراقبت نحوه کاربری آنرا می طلبد. تابش فرابنفش در صنعت و پزشکی فرایندی سرد، خشک ، ساده ، موثر و کم هزینه در رابطه با سایر فرایندهای استریل سازی است و هیچ نوع پرتوی یونیزه شده ای را تولید نمی کند.

کلمات کلیدی:

تابش فرابنفش،
دیود نوری مرئی آبی،
پاتوژن زدایی،
شمارش کلی باکتری دهانی،
سطح جامد،
محیط کشت.

DOI: 10.22034/FSCT.19.126.333

DOR: 20.1001.1.20088787.1401.19.126.30.1

* مسئول مکاتبات:

shahilaser@khuisf.ac.ir

۱- مقدمه

زمین می‌رسند، در حالی که، طول موج‌های کوتاه تابش فرابینفش (280-UVB 100 نانومتر) طرفیت میکروب کشی بالاتری دارند، اما به طور طبیعی از خورشید قابل دستیابی نیستند و با روش‌های تبدیل انرژی الکتریکی تولید می‌شوند. در لایه استراتوسفر جو، تابش UV-C توسط ازن جذب شده، توسط مولکولهایی مانند اکسیژن و نیتروژن پراکنده می‌شود. در حالی که در تروپوسفر تابش فرابینفش C توسط آلاینده‌ها جذب شده، توسط ذرات پراکنده می‌شود. ناحیه نامگذاری شده با خلاصه فرابینفش² که قادر به تولید کاژ سمی ازن است در بازه 100-200 نانومتر از نور تابشی ناحیه UV-C پیرامون طول موج 185 نانومتر قرار دارد. ناحیه فرابینفش با قدرت میکروب کشی³ قویتر پیرامون طول موج 253/7 نانومتر یا همان 254 نانومتر قرار دارد و ازن چندانی تولید نمی‌کند [1]. در شرایط فیزیولوژیکی، کره زمین و پوست انسان فقط در مععرض تابش فرابینفش A و فرابینفش B است. در تابستان تابش نور خورشید A حاوی حدود شش درصد فرابینفش B و ۹۴ درصد فرابینفش است که در فیزیولوژی طبیعی رشد، تشخیص و تاثیر سلولی، ملانوژنر و تولید ویتامین D بسیار تاثیر گذار است. با این وجود مقادیر زیاد این تابش می‌تواند باعث آفات سوختگی و هایپرپلازی شود و قرار گرفتن طولانی مدت باعث پیری پوست شده، خطر ابتلا به انواع خاصی از سرطان پوست را افزایش می‌دهد. تابش پرتو فرابینفش به غیر از طیف خورشید به روش‌های تولید مصنوعی در مدهای پیوسته یا پالسی قابل کاربری است که مد پالسی آن برای غیر فعال‌سازی میکروبی کاربردی تر و موثرتر است. لازم به ذکر است که نور فرابینفش تولید شده تجاری، بازه طول موجی از ناحیه فرابینفش است و طول موج تکی تولید نمی‌کند. به عنوان مثال، نور فرابینفش با طول موج 185 نانومتر برای تولید نور فرابینفش در قله طیف (185 نانومتر) تنظیم شده است، اما ممکن است نور فرابینفش را در بازه (240-280 نانومتر) یا حتی بیشتر تولید کند [2].

ال ای دی ها فقط برای روشنایی خانه و محل کار نیستند. تابش انواع لامپ ال ای دی رنگی خاص بر روی سطوح بسته به هر مورد استفاده، می‌تواند میکروب‌ها، باکتری‌ها و سایر عوامل بیماری‌زا را از بین ببرد. هنگام استفاده از نور ضد میکروبی، هر سطحی که بتوان دید، روشن می‌شود که به معنای ضدغونی شدن آن است. رنگ‌های مختلف لامپ‌های ال ای

تابش امواج الکترومغناطیسی را در اصل می‌توان به سه ناحیه گسترده تابش مرئی، فروسرخ و فرابینفش تقسیم کرد. نور مرئی در بازه طول موجی 400-700 نانومتر تعریف می‌شود که طول موج‌های بالاتر از این ناحیه به بازه طول موجی تابش فروسرخ نامگذاری شده است. نور فرابینفش¹ از طیف امواج الکترومغناطیسی تابشی غیر یونیزان است که بسامد بیشتر از نور مرئی می‌دارد، همان‌طورکه رنگ بنفش بالاترین بسامد نور ناحیه مرئی می‌باشد. از این رو نور فرابینفش اصطلاحی است که برای نور با بسامد‌های بالاتر از نور مرئی به کار می‌رود. پرتو فرابینفش در سال 1801 توسط دانشمند آلمانی جان ریتر، کسی که نوعی نور مرئی، فراتراز بنفش که قادر به اکسید کردن هالیدهای نقره‌ای بود را مشاهده و کشف کرد. در پایان قرن نوزدهم این نوع تابش، نور فرابینفش نامگذاری شد. نور فرابینفش بازه وسیعی از طول موج‌ها در فضای غیر یونیزه کننده طیف الکترومغناطیسی، بین ناحیه تابشی پرتو ایکس (100 نانومتر) و پیرامون نور مرئی (تقریباً 400 نانومتر) را اشغال می‌کند [1].

- به طور خلاصه تابش ناحیه فرابینفش (ناممرئی) در بازه 100-400 نانومتر را می‌توان به سه ناحیه طول موجی تقسیم کرد:
- تابش A (با ویژگی برنزه کردن پوست، 400-320 نانومتر)
- تابش UVB (با ویژگی درمانی، 320-280 نانومتر)
- تابش UVC (با ویژگی ویروس و میکروب کشی، 280-100 نانومتر)

در این پژوهش بیشترین تمرکز نویسنده‌گان بر ناحیه سوم یا همان تابش UVC است. اثرات میکروب زدایی تابش UVC، موجب تخریب DNA در باکتری‌ها، ویروس‌ها، هاگ‌ها، قارچ‌ها، کپک‌ها و کنه‌ها شده، از رشد و تکثیر آنها جلوگیری می‌کند. این فناوری یک روش ضدغونی کننده فیزیکی با فواید مناسب و فرایندی زیست محیطی است که برخلاف مواد شیمیایی، بدون ایجاد هیچ مقاومتی در برابر میکروارگانیسم‌ها کارایی دارد. طول موج‌های بلند (UVA، 320-400، 400-320 نانومتر) و متوسط (UVB، 280-320 نانومتر) تابش فرابینفش موجود در نور خورشید دارای خاصیت کم میکروب کشی هستند و از لایه استراتوسفر جو به میزان قابل ملاحظه‌ای عبور کرده به

2. Vacuum UV

3. Ultra violet germicidal irradiation (UVGI)

1. Ultra violet (UV)

آزمون در دستگاه با روکش استیل خاص به ابعاد $50 \times 40 \times 60$ سانتی متر مجهر به درزگیر، درب و فیلتر مناسب (شکل 1) حاوی دو لامپ مولد UVC با توان 15 وات در طول موج اثر بخشی 254 نانومتر (شکل 2) انجام گرفت. از ناحیه طیفی UVC برای بررسی نابودی دو باکتری بیماریزای شایع محیطی تهیه شده به روش نیم مک فارلند رقیق شده با نرمال سالین استفاده شد. از کشت مایع و کشت سطحی جامد اختصاصی مانیتول سالت آگار و مولر هیتنون آگار با شمارش‌های متفاوت (جدول 1) بترتیب برای شمارش نهایی استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا تیمار اشعه دیده شده استفاده شد. همچنین برای بررسی نابودی شمارش کلی سطوح جامد کاغذی و تلفن همراه از محیط کشت پلیت کانت آگار استفاده شد. برای نمونه شاهد (کنترل مثبت) هم محیط‌های مایع و جامد، و سطوح جامد کاغذی و تلفن همراهی که مورد تیمار اشعه دهی قرار نگرفت استفاده گردید. درصد کشندگی عبارت است از تعداد باکتریهای از بین رفتہ پس از تیمار اشعه دهی در مقایسه با شمارش اولیه باکتریایی قبل از تیمار اشعه دهی می‌باشد. این آزمایشات در ده تکرار صورت گرفت [3].

2-2-آزمون دوم: تاثیر تابش لامپ LED مرئی

ناحیه آبی در میکرووارگانیسم زدایی باکتریهای دهانی برای تعیین اثر بخشی طیف نوری لامپ‌های LED ناحیه آبی بر مسوک و میکرووارگانیسم‌های دهانی آزمون دوم انجام شد که در شکل 1 نشان داده شده است. چشمۀ نوری مورد نظر طبق نتایج طیف سنجی در بخش یافته‌ها در بازه 400-500 نانومتر آبی رنگ از ناحیه طیفی امواج الکترومغناطیسی پیرامون ناحیه فرابنفش قراردارد. از دیود نوری به مدت دو ساعت برای بررسی نابودی شمارش کلی باکتریهای دهانی متصل شده به مسوک، پس از مسوک زنی پنج دقیقه ای از محیط کشت پلیت کانت آگار استفاده شد. برای نمونه شاهد (کنترل مثبت) هم از مسوکهایی که پس از مسوک زنی مورد تیمار اشعه قرار نگرفت استفاده شد. برای شمارش باکتریهای مسوک پس از هر بار عملیات مسوک‌زنی، مسوک‌ها در نرمال سالین شستشو شد و از این محلول شستشو کشت سطحی بر پلیت کانت آگار انجام گردید. این آزمایش در پنج تکرار انجام گردید [3].

دی اثرات متفاوتی دارند مثلاً ای دی‌های مخصوص سفید، توانایی کشتن باکتری‌ها، کپک‌ها و فارچ‌ها را دارند و در عین حال به افراد، گیاهان و حیوانات خانگی آسیبی نمی‌رسانند. بنابراین، برای مثال، بیمارستان‌ها می‌توانند در طول روز بدون نیاز به تخلیه مردم از آنها استفاده کنند. نور آبی تشدید شده یکی دیگر از نورهای رنگی است که ثابت شده است باکتری‌های خاصی مانند اشریشیا کلی و باکتری لیستریا مونوسایتوئنز را می‌کشد و ویروس مرس را غیرفعال می‌کند. در حالی که ال ای دی قرمز و آبی به طور جداگانه هر دو باکتری‌ها را از بین می‌برند، بهترین نوع نور ال ای دی، نوری است که نور ال ای دی قرمز و آبی را ترکیب کند [2]. در این پژوهش به بررسی اثر تابش C UVC بر میکرووارگانیسم‌های بیماریزای استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا موجود در محیط مایع و کشت سطحی جامد، بررسی اثر تابش UVC بر شمارش کلی (توatal کانت) میکرووارگانیسم‌های سطوح جامد LED کاغذی و تلفن همراه، و در اخر به بررسی اثر نور مرئی ناحیه آبی نزدیک ناحیه فرابنفش بر شمارش کلی میکروباهای دهانی متصل به مسوک پس از مسوک زنی مورد بررسی قرار گرفت.

2- مواد و روشها

2-1- مواد

در این پژوهش به منظور اثر بخشی طیفهای امواج الکترومغناطیس بر میکرووارگانیسم‌ها از دو نوع لامپ تجاری شامل لامپ UVC و دیودهای نوری مرئی (آوانتر، هلند) در بازه‌های طیفی هدف استفاده شد. از دو باکتری بیماریزای استافیلوکوکوس اورئوس، سودوموناس آئروژینوزا (مرکز کلکسیون میکرووارگانیسم‌های صنعتی، ایران) و محیط کشت اختصاصی مانیتول سالت آگار، مولر هیتنون آگار و پلیت کانت آگار (مرک، آلمان) استفاده شد.

2-2- روش‌ها

2-2-1-آزمون اول: تاثیر تابش UVC در نابودی میکرووارگانیسم‌های تلقیح شده در محیط کشت مایع و جامد، سطوح کاغذی و تلفن همراه


**A****B****Fig 1** Ultraviolet-C generator (A), and Disinfectant device (B) with visible light emitting diode (blue)

این تحقیق از نرم افزار آماری اس-پی-اس-اس ورژن 16 برای ارزیابی های آماری استفاده شد.

3- نتایج

1-3- یافته آزمون 1

در شکل 2 طیف خروجی تابش لامپ UVC دارای دامنه قله انرژی پیرامون طول موج 254 نانومتر و قله های با انرژی کمتر پیرامون 430 و 550 نانومتر می باشد.

**Fig 2** UV-15 combination lamp output spectrum

شد. ابتدا میزان باکتری اولیه موجود بر روی این سطوح (قسمتی از سطح) سنجیده شد، سپس با اعمال تابش فرابنفش به مدت 4 دقیقه در دستگاه اثر کشنده ای بر روی هر یک از سطوح بررسی شد و با توجه به بیش از 91/86 درصد اثربخشی و نابودی باکتریهای موجود بر روی سطوح مورد نظر، نتیجه گیری شد که تابش محفظه نوری با راندمان بالا، اثر قابل توجهی در از بین بردن باکتریهای موجود بر سطوح دارد.

2-3- تجزیه و تحلیل آماری

در آزمون تاثیر اشعه فرابنفش بر دو باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آثروژینوزا در قالب بلوك کاملاً تصادفی و با سه فاکتور بترتیب شامل فاکتور اول، زمان تیمار اشعه دهی در دو سطح 40 و 80 ثانیه، فاکتور دوم شامل نوع محیط کشت در دو سطح کشت سطحی و مایع و فاکتور سوم شامل لگاریتم شمارش اولیه باکتریها در سه سطح 4، 5 و 6 انجام شد. مقایسه میانگین ها به روش آزمون چند دامنه دانکن در سطح معنی دار 95 درصد استفاده شد. برای ازمون ها در

جدول 1، 2 و 3 نتایج این بررسی ها در دو بازه زمانی با درصد کشنده ای مختلف را نشان می دهد. نتیجه این بررسی ها نشان داد که با افزایش زمان تابش دهی اثر باکتری زدایی بیشتر شد، همچنین در محیط جامد (سطح جامد) اثر بیشتری نسبت به محیط مایع (غوطه وری) مشاهده گردید. سپس اثرگذاری این دستگاه بر روی آلدگیهای موجود بر دو سطح کاغذ و تلفن همراه که آگشته به کلیه باکتریهای موجود در محیط می باشند، طبق نتایج جدول 3 مورد بررسی قرار داده

Table 1 Effect of UV-C radiation on bacterial count of surface culture and immersion of *Staphylococcus aureus* at different irradiation times

Bacteria type			<i>Staphylococcus aureus</i>									
Time	40 sec			80 sec								
	Culture type		Surface culture	Liquid culture	Culture type		Surface culture	Liquid culture				
The first total count (cfu/ml)	10 ⁴	10 ⁵	10 ⁶	10 ⁴	10 ⁵	10 ⁶	10 ⁴	10 ⁵	10 ⁶	10 ⁴	10 ⁵	10 ⁶
Lethality (%)	98.40±0.82 ^a	98.65±0.01 ^a	99.92±0.02 ^a	84.05±0.49 ^b	90.25±0.48 ^c	98.4±0.22 ^c	99.04±0.09 ^a	99.49±0.11 ^a	99.88±0.01 ^a	83.87±0.12 ^b	97.00±0.47 ^b	99.40±0.01 ^b

Dissimilar letters in each row indicate for each the first total count a significant difference at the 99.5% confidence level. The number of each sample was 10

Table 2 Effect of UV-C radiation on bacterial count of surface culture and immersion of *Pseudomonas aeruginosa* at different irradiation times

Bacteria type			<i>Pseudomonas aeruginosa</i>									
Time (second)	40 sec			80 sec								
	Culture type		Surface culture	Liquid culture	Culture type		Surface culture	Liquid culture				
The first total (cfu/ml) count	10 ⁴	10 ⁵	10 ⁶	10 ⁴	10 ⁵	10 ⁶	10 ⁴	10 ⁵	10 ⁶	10 ⁴	10 ⁵	10 ⁶
Lethality (%)	99.99±0.002 ^a	99.99±0.002 ^a	99.99±0.003 ^a	99.98±0.008 ^b	99.98±0.005 ^a	99.98±0.003 ^a	99.99±0.002 ^a	99.99±0.003 ^a	99.99±0.004 ^a	99.99±0.003 ^a	99.99±0.003 ^a	99.99±0.003 ^b

Dissimilar letters in each row indicate for each the first total count a significant difference at the 99.5% confidence level. The number of each sample was 10

Table 3 Effect of UV-C radiation on bacterial count of paper and mobile surface

Parameters	Total count	
	Time (second)	240 sec
Sample	Paper surface	Mobile surface
The first total count (cfu/cm ²)	25.1±0.9 ^b	105.6±8.5 ^a
Total count after radiation (cfu/cm ²)	1.8±0.13 ^b	8.6±0.7 ^a
Lethality (%)	92.85±0.47 ^a	91.86±0.14 ^b

Dissimilar letters in each row indicate a significant difference at the 99.5% confidence level. The number of each sample was 10


نشان داده شده است. همان طور که در شکل مشهود است این

1-یافته آزمون 2

تابش دارای قله دامنه انرژی پیرامون طول موج 480 نانومتر

در شکل 3 نتایج طیف خروجی لامپ LED مرئی (آبی) پیرامون ناحیه فرابنفش در بازه طول موجی 400-500 نانومتر می باشد.

spectrum of LED

**Fig 3** Output spectrum of visible light emitting diode (blue)

91/67 تا حد اکثر 95/46 درصد دیده شد که از نظر آماری در خور توجه است (جدول 4).

در آزمون دوم مقایسه نتایج شمارش کلی بر مسوکاهای تحت تابش دیود نوری نشان داد که باز میکروبی مسوکها به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرد. بعارتی درصد کشندگی حداقل

Table 4 Effect of visible light emitting diode radiation on the total count of oral bacteria (number of colonies per ml of toothbrush detergent solution)

Test stage	Toothbrush 1	Toothbrush 2	Toothbrush 3	Toothbrush 4	Toothbrush 5
After brushing with toothpaste	22	37	17	12	13
After 2 hours of irradiation Ultraviolet light emitting diode	1	2	1	1	1
Lethality (%)	95.46	94.59	94.12	91.67	92.31

به وضوح اصلاح می‌شوند، اما تعداد آنها به طور قابل توجهی کمتر از موارد توصیف شده در مدل‌های جوندگان است. به دلیل تفاوت بین گونه‌ها در تولید AMP های پوستی و یا به دلیل کاستی‌های اپیدمیولوژیک و با توجه به تعیین پارامترهای کمی قرار گیری انسان در معرض تابش حبس زده می‌شود [11]. علاوه بر خواص بیولوژیکی تابش فرابنفش، خواص ضدغونی و میکروب زدایی تابش فرابنفش نیز در این پژوهش به صورت تجربی و بررسی مطالعات مروری مورد بررسی قرار گرفت که در ادامه بیشتر مورد بحث قرار خواهد گرفت. ویروس‌ها ذرات کوچک و مستقلی هستند که از بلورها و ماکرومولکول‌ها ساخته شده‌اند و برخلاف باکتری‌ها، فقط در سلول میزان تکثیر می‌شوند. کاربرد UGVI برای ضدغونی و میکروب زدایی از اواسط قرن بیستم، به صورت عملیاتی پذیرفته شده است. نخست از این نوع تابش، برای رعایت اصول بهداشتی پزشکی و امور استریل کنندگی استفاده شد. در سالهای اخیر به ویژه در دوران مواجه با ویروس کرونا به طور چشمگیری، از این فرایند با دوز تابشی بالاتر برای استریل کردن آب آشامیدنی، پساب، لوازم، مواد، بسته بندی‌های غذایی و دستگاه‌های تصفیه‌هوا استفاده شده است. همان گونه که پیش تر بیان شد، نفوذ نور تابشی UVC در سطح زمین بسیار ضعیف است، زیرا لایه ازن جو، آن را فیلتر می‌کند. دستگاه‌های UGVI جدید با تابش موثر می‌توانند در سیستم‌های آب و هوای درحال گردش در محیط میزان، میکرووارگانیسم‌ها مانند باکتری‌ها، ویروس‌ها، کپک‌ها و سایر عوامل بیماری‌زا را تحت تاثیر قراردهند [10]. تابش فرابنفش توسط پروتئین، RNA و DNA در میکرووارگانیسم‌ها جذب

4- بحث و نتیجه گیری

مطالعات ضد میکروبی تابش فرابنفش علاوه بر تاثیرات بر پوست و سیستم خود اینمی نیز در گزارش‌های دیگری تایید شده است. اولین مطالعه برای توصیف القای پتیلهای ضد میکروبی با تابش فرابنفش نشان داد که این تابش به شدت با گیرنده ویتامین دی همبستگی دارد. این مطالعه بالینی نشان داد که تابش UVB موجب القای پتیلهای LL-37 و هم چنین ویتامین دی می‌شود [4]. با این حال، بیش از یک قرن پیش، مشاهده شد که نور خورشید می‌تواند سل را درمان کند. این امر در سال 2006 نیز با کشف اینکه فعال شدن گیرنده‌های TLR⁴ توسط مایکوباکتریوم تویرکلوزیس موجب جذب ویتامین دی و آنژیمی می‌شود که ویتامین دی غیرفعال را به ویتامین دی فعال تبدیل می‌کند، تایید گردید. در نهایت ویتامین دی به نوبه خود باعث تولید اتوکرین و آزاد سازی LL-37 از مونوپسیت‌ها می‌شود که باعث از بین رفتن باکتری‌ها می‌گردد [5]. تابش فرابنفش هم چنین قادر است عفونت پنهان ویروس هرپس سیمپلکس و عفونت ویروس واریسلا زوستر را دوباره فعال کرده، منجر به زونا شود [6-8]. ارتباط مثبتی بین زونا و قرار گرفتن در معرض تابش فرابنفش در مناطق معتدل جهان وجود دارد [9]. با این وجود، علیرغم مطالعاتی که نشان می‌دهد تابش فرابنفش پاسخ اینمی به عفونت‌های باکتریایی، قارچی و ویروسی را سرکوب می‌کند، تابش فرابنفش خورشید ممکن است عفونت‌های باکتریایی پوستی را بهبود بخشد [10]. اگرچه برخی از عفونت‌ها در معرض تابش فرابنفش در انسان

4. Toll like receptors

فرابینفشن با طول موج کوتاه (UV-C) میکروارگانیسم ها را به وسیله ازبین بردن اسیدهای نوکلئیک و ایجاد اختلال در DNA شان مانع از انجام عملکرد حیاتی سلول می شود. تابش UVC با خواص میکروارگانیسم زدایی در کاربردهای مختلفی مانند موادغذایی، لوازم، تصفیه آب و هوا، شستشوی سیستم های درجا و ضدغوفونی سطوح بسته بندی و مخازن ذخیره سازی استفاده می شود. تابش دیودهای نوری مرئی (آبی) در بازه طول موج 400-500 نانومتر نشان داد که این بازه مرئی نیز در مواردی قادر به میکروب زدایی از وسایل بوده و در کاربردهای خانگی، پیپرپزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی کاربرد داردند [3].

تابش فرابینفشن به عنوان یکی از بی خطرترین و نزدیک ترین روش به طبیعت در فرایند گندزدایی بدون نیاز به مواد شیمیایی است که باکتری ها به علت داشتن پروتئین و اسید نوکلئیک، می توانند مقدار زیادی از تابش را جذب نمایند و اگر باکتری ها در مسیر تابش مزبور قرار گیرند به علت آسیب رسیدن به دئوکسی ریبونوکلئیک اسید، از بین خواهند رفت. برخی آندوسپورهای باکتریایی در برابر این تابش مقاوم هستند و علت آن مادی است که در پوشش اسپور آنها وجود دارد و سبب جذب تابش می گردد. بنابراین تابش فرا بنفس یک عامل استریل کننده نیست ولی می تواند به عنوان یک گندزدا مورد استفاده قرار گیرند. با این حال، نور فرابینفشن فرایند فیزیکی است که مزایای مختلفی دارد که پسماند شیمیایی ایجاد نمی کند و یک فرایند سرد، خشک، ساده، موثر و کم هزینه در رابطه با سایر فرایندهای استریل سازی است، علاوه بر اینکه هیچ نوع پرتوی یونیزه شده تولید نمی کند [2-3].

5- تشك و قدردانی

این اطلاعات برگرفته از طرح پژوهشی مصوب دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوارسگان) با شناسه اخلاق 1400.215 IR.IAU.KHUISF.REC.1400.215 نویسندهای این مقاله، از همکاران در مرکز تحقیقات لیزر و بیوفوتونیک در فناوریهای زیستی و شرکت دانش بنیان معیار دانش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوارسگان) به دلیل همکاری های علمی و پژوهشی در راستای محقق شدن این تحقیق کمال تشك را دارد.

می شود. جذب تابش فرابینفشن توسط پروتئین ها در غشای با نفوذ بالای دوز فرابینفشن درنهایت منجر به اختلال درغشای سلول و درنتیجه مرگ سلول می شود. با این حال، در اثر دوز RNA تابشی کمتر، جذب فرابینفشن توسط DNA یا RNA دربرخی ویروسها میتواند توانایی تکثیر میکروارگانیسم را مختل کند. در هر حال سلولی که قادر به تکثیر نباشد، می تواند منجر به بیماری شود. بعضی از میکروارگانیسم ها (به ویژه باکتری ها) مکانیزم ترمیمی دارند که باعث جدا شدن دیمرهای تیمین می شوند، این فرایند با جذب نور فرابینفشن آغاز می شود و بنابراین فعل سازی مجدد نوری نامیده می شود. این موضوع می تواند بر مکانیسم ترمیمی غلبه کند، اما نیاز به دوز تابشی فرابینفشن بالاتری دارد. براساس اطلاعات فوق، تابش UVC برای غیرفعال کردن کرونا ویروس ها موثر گزارش شده است [1].

بررسی های انجام شده با طول موج تابشی 254 در طیف UVC و مقایسه اثر آن با تابش های مشابه خورشیدی ناحیه UVA/UVB در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی نشان داد که تنها چند ویروس منتخب مربوط به ذرات معلق در هوا، سطوح و محلول های مایع قابل کنترل هستند [2]. همچنین میکروارگانیسم های رایج موجود همانگونه که در آزمون یک نیز انجام شد با این روش قابل کنترل می باشند. علاوه بر خواص میکروب زدایی قوی تر ناحیه تابش UVC که اصولا در سیستم های تجاری قابل تولید و کاربردی است، در سیستم تجاری مورد آزمون شماره دو با آرایه دیود نوری مرئی نیز با طیف پیرامون طول موج های ناحیه UVA به غیرفعال سازی موثر میکروارگانیسم ها پرداخته شد. در پژوهش گزارش شده مشابه نیز با این ناحیه طیفی به طور موثر ویروس های مشابه نیز با این ناحیه طیفی به طور موثر ویروس های MS2، QB، X174 غیرفعال گردید [12]. در هر حال دیودهای نوری مرئی، که به سرعت در حال تولید هستند، می توانند عوامل بیماریزا را غیرفعال کرده، بسته های غذایی و دارویی و سایر مواد را نیز در مراحل بسته بندی حفاظت کنند. بنابراین، این نوع تابش های غیر گرمایی و سرد برای این نگه داشتن غذا و بسته بندی ها و لوازم، بدون استفاده از ضدغوفونی کننده های شیمیایی یا مواد افزودنی رشد باکتری ها را کند و متوقف می کنند که از نظر اقتصادی و زیست محیطی نیز سیار مفید می باشند [3]. هم چنین تابش میکروب کش فرابینفشن (UVGI) روش ضدغوفونی کننده ای است که با استفاده از نور

6- منابع

- [6] Stein B, Angel P, Van Dam H, Ponta H, Herrlich P, van der Eb A, Rahmsdorf HJ. Ultraviolet-Radiation Induced c-jun Gene Transcription: Two AP-1 like Binding Sites Mediate the Response. *Photochem photobiol*, 1992; 55(3): 409-415.
- [7] Loiacono CM, Taus NS, Mitchell WJ. The Herpes Simplex Virus Type 1 ICP0 Promoter is Activated by Viral Reactivation Stimuli in Trigeminal Ganglia Neurons of Transgenic Mice. *J. Neurovirol*, 2003; 9(3): 336-345.
- [8] Zak-Prelich M, Borkowski JL, Alexander F, Norval M. The Role of Solar Ultraviolet Irradiation in Zoster. *Epidemiol Infect*, 2002; 129(3): 593-597.
- [9] Korostil IA, Regan DG. Varicella-Zoster Virus in Perth, Western Australia: Seasonality and Reactivation. *PLoS One*, 2016; 11(3): e0151319.
- [10] Boere TM, Visser DH, Marceline Van Furth A, Lips P, Cobelens FGJ. Solar Ultraviolet B Exposure and Global Variation in Tuberculosis Incidence: An Ecological Analysis. *Eur. Respir. J*, 2017; 49(6): e1601979.
- [11] Norval M, Halliday GM. The Consequences of UV-Induced Immunosuppression for Human Health. *Photochem. Photobiol*. 2011; 87(5): 965-977.
- [12] Do-Kyun K, Dong-Hyun K. UVC LED Irradiation Effectively Inactivates Aerosolized Viruses, Bacteria, and Fungi in a Chamber-Type Air Disinfection System. *Appl. environ. Microbiol*. 2018; 84(17): e00944-18.
- [1] Cheng N, Moe P, Salas BV, Beltran-Partida E, Nedev NR. Inactivation of Enveloped Viruses (Coronavirus, H5N1 Virus) and Disinfection of the Air with Legionella-X 100 Via Ultraviolet Germicidal Irradiation (UVGI). Autonomous University of Baja California-UABC2, 2020; 1-18.
- [2] Lima FR, Vieira KS, Santos M, de Souza PM. Effects of Radiation Technologies on Food Nutritional Quality. *Descrip. Food sci*, 2018; 5: 137-152.
- [3] D'Souza C, Yuk HG, Khoo GH, Zhou W. Application of light-emitting diodes in food production, postharvest preservation, and microbiological food safety. *Compr. Rev. Food Sci. Food Saf*, 2015; 14(6): 719-740.
- [4] Schwarz A, Maeda A, Kernebeck K, van Steeg H, Beissert S, Schwarz T. Prevention of UV Radiation-Induced Immunosuppression by IL-12 is Dependent on DNA Repair. *J Exp Med*, 2005; 201(2): 173-179.
- [5] Liu PT, Stenger S, Li H, Wenzel L, Tan BH, Krutzik SR, Ochoa MT, Schuber J, Wu K, Meinken C, Kamen DL, Wagner M, Bals R, Steinmeyer A, Zügel U, Gallo RL, Eisenberg D, Hewison M, Hollis BW, Adams JS, Bloom BR, Modlin RL. Toll-like Receptor Triggering of a Vitamin D-Mediated Human Antimicrobial Response. *Science*, 2006; 311(5768): 1770-1773.



Evaluation of ultraviolet and visible radiation on *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* of culture medium and total count of oral microbes and solid surfaces

Goli, M. ^{1,2}, Shahi, S. ^{2,3*}, Moghzi, M. ³, Amini, R. ³, Mansoori Beni, M. ¹, Darvishi, M. ^{2,4,5}, Ranjbaran, S. M. ²

1. Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, Isfahan (Khorasan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
2. Laser and Biophotonic in Biotechnologies Research Center, Isfahan (Khorasan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
3. Department of Medical Engineering, Faculty of Engineering, Isfahan (Khorasan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
4. Dentistry Student, Faculty of Dentistry, Isfahan (Khorasan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
5. Professional Member, Maxillofacial Surgery & Implantology & Biomaterial Research Foundation.

ARTICLE INFO**ABSTRACT****Article History:**

Received 2022/04/21

Accepted 2022/06/07

Keywords:

UV radiation,
Visible blue-LED light,
Pathogenicity,
Oral bacterial count,
Solid surfaces,
Culture medium.

DOI: [10.22034/FSCT.19.126.333](https://doi.org/10.22034/FSCT.19.126.333)DOR: [20.1001.1.20088787.1401.19.126.30.1](https://doi.org/10.1001.1.20088787.1401.19.126.30.1)

*Corresponding Author E-Mail:
shahilaser@khuisf.ac.ir

Non-ionizing ultraviolet (UV) radiation is a kind of electromagnetic radiation that has been shown to be harmful to microorganisms such as bacteria, viruses, and fungus. The goal of this study is to evaluate the effective and hazardous features of this type of radiation in three regions (UVA, UVB, and UVC), using the approach of biological properties and applications in disinfection and sterilizing. In this research study, in order to be effective on microorganisms in the ultraviolet spectrum and its surroundings near the visible area, two test samples with commercial UVC and blue-LED lamps were used. In this study, the effect of ultraviolet C radiation on pathogenic microorganisms of *Staphylococcus aureus* and *Pseudomonas aeruginosa* in liquid environment and solid surface culture, the effect of ultraviolet C radiation on the total count (total count) of microorganisms on paper and mobile surfaces, and finally to The effect of UV LED on the total number of oral microbes attached to the toothbrush after brushing was investigated. In two tests performed with radiation in the ultraviolet region and near it in the visible region, the lethal effect on bacteria and microorganisms was concluded with more than 90% effectiveness and destruction of bacteria. Which indicates the effectiveness of such radiation in disinfecting, disinfecting and sterilizing equipment. Spectroscopic investigations of UV commercial lamps, as well as their efficacy on microbes, demonstrate the use of this sort of radiation, in addition to its biological hazards, which necessitate careful consideration of how it is utilized. In comparison to alternative sterilizing methods, the use of UV radiation in business and medicine is a cool, dry, easy, effective, and economical technique that produces no ionized radiation.