

# بررسی اثر جلبکهای دریایی بر میزان کلسترول تخم مرغ

محمد رضا حسن نیا<sup>۱\*</sup>، بایرام محمد قرنجیک<sup>۲</sup>، علی اصغر دادقانی<sup>۳</sup>

۱- استادیار گروه مهندسی آبیان موسسه تحقیقات شیلات ایران

۲- مریض پژوهشی مرکز تحقیقات چاه بهار

۳- مدیر تولید شرکت جوجک

## چکیده

برای کاستن کلسترول تخم مرغ از دو نوع جلبکهای دریایی سارگاسم *Sargassum glaucescens* و نیزیمیدین *Nizimuddinia zanardinii* استفاده شد. در این تحقیق از دو نوع جلبک و به نسبتهای ۱/۱، ۰/۲۵ و ۰/۵ به صورت جایگزین غذای معمول مرغداری استفاده شد. در طی دوره‌ای ۱۸ روزه اثر جلبکهای فوق بر میزان کلسترول خون مرغ و تخم مرغ و سایر فاکتورهای از قبیل HDL، LDL بررسی شد. همچنین راندمان تولید تخم در اثر جلبکها بررسی گردید. از جمله نتایج تحقیق این بوده که با استفاده از ۱٪ سارگاسم در غذای مرغ به اندازه ۳۴٪ کلسترول تخم مرغ کاهش می‌یابد. استفاده از سارگاسم ۰/۲۵٪ موجب افزایش ۱۱٪ تولید بیشتر تخم مرغ نسبت به تیمار شاهد می‌شود.

کلیدواژگان: جلبک، علف دریائی، سارگاسم، نیزیمیدین، کلسترول

## ۱- مقدمه

متعددی برای کاهش کلسترول زرده تخم مرغ پیشنهاد شده است.

روشهایی از قبیل استفاده از لوستین (3-hydroxy-3-methyl-glutaryl coenzyme A) موجب کاهش ۱۹-۳۶ درصدی کلسترول در مرغ تخم گذار گردید [۲]. سولفات مس و یا استات مس را در جیره مرغ اضافه نمودند که برای کاهش کلسترول مفید بود [۳]. بعضی تلاش‌های دیگر از قبیل تغذیه مرغ با اسیدهای چرب غیر اشیاع از جمله روغن سیر به عمل آمد [۴] که نتوانست کلسترول را به طور معنی داری تغییر دهد. در مجموع اینگونه تحقیقات نتوانست به طور موثری کلسترول را کاهش دهد. در کنار این تحقیقات روشهای پیچیده تری از قبیل استفاده از عصاره‌ها مانند بتا سیکلودکسترين و دیگر مواد نیز بررسی گردید. عصاره‌های محلول [۵] یا عصاره‌های روغن در استفاده آسان هستند؛ هرچند ممکن

کلسترول زرده تخم مرغ یکی از عناصر با اهمیت غذایی می‌باشد. هر تخم مرغ حاوی ۶ گرم پروتئین، ۰/۸ IU ویتامین A، ۰/۵ گرم چربی (بیشتر چربهای چند غیر اشباع و یک غیر اشباع) و ۱/۵ گرم چربی اشباع شده می‌باشد. تخم مرغ منع با ارزش ویتامینهای E، D، B12 فولات، ریبو فلاوین و آهن می‌باشد. زرده تخم مرغ یکی از معدود غذاهایی است که به طور طبیعی حاوی ویتامین D می‌باشد. سفیده تخم مرغ منع ایده آل پروتئین است، زیرا حاوی تمامی اسیدهای آمینه ضروری در تمام نسبتهای بهینه می‌باشد. غذاهای با کلسترول بالا موجب تنگی عروق شده که یکی از علل عمدۀ بیماریهای کرونر قلب می‌باشد. مقدار کلسترول بالا علت اصلی کاهش مصرف تخم مرغ می‌باشد [۱]. از این جهت روشهای

ویبریو و غیره همزیست بوده که بعضًا وجود آنها در لوله گوارش جانوران می‌تواند اثرات مثبتی به همراه داشته باشد.



شکل ۱ جلبک *Sargassum sp.*

## ۲- مواد و روشها

### ۱-۱- محل انجام آزمایش

کلیه مراحل این تحقیق در شرکت خصوصی تولیدی تخم مرغ انجام گرفت. فضای اختصاص یافته به گونه‌ای بوده است که ضمن بر خورداری از خدمات کارگاهی، اجرای طرح آزمایشی بدون هیچگونه تداخل کاری قابل انجام بوده است. در این فضای سه ردیف مرغداری در اختیار قرار گرفت.

### ۱-۲- مرغ و تخم مرغ

تعداد ۲۱۶ عدد مرغ از سوی شرکت تولیدی در اختیار قرار گرفت که در قالب طرح آزمایشی بلوکهای کاملاً تصادفی تیمار بندی شد.

### ۱-۳- طرح آزمایشی

در این تحقیق از دو نوع جلبک دریایی استفاده شد. از هر جلبک سه تیمار  $1\%, 2,5\% \text{ و } 5\%$  استفاده شد. از هر تیمار ۳ تکرار در نظر گرفته شد. برای هر تکرار از هر تیمار ۱۲ عدد مرغ تخم گذار در یک ردیف مرغداری استفاده شد. در مجموع ۲۱۶ مرغ در دوره‌ای هجدۀ روزه بررسی شدند. در مقاطع زمانی مختلف از خون و تخم

است موجب تغییر شکل پروتئین و محلولهای باقیمانده در محصول گردد. دیگر فرآورده‌های از این نوع ممکن است موجب کاهش کلسترول تخم مرغ شود ولی نیازمند هزینه‌های سنگین تحقیقاتی است [۵]. به علاوه ممکن است ترکیبات محلول در چربیها در هنگام فرآوری موجب بروز اثرات ناخواسته‌ای در خواص تخم مرغها گردد [۶]. سیکلودکسترین که به تازگی موارد استفاده تجاری نیز یافته است کلسترول زرد را جذب نموده که این ماده اجبارا در فرآورده باقی می‌ماند که برای آن یک نکته منفی محسوب شده و به همین دلیل در بعضی کشورها استفاده از آنرا ممنوع کردند، هر چند هزینه استفاده از آن نیز بالا می‌باشد. استفاده از باکتری در برخی منابع مورد استفاده قرار گرفته است [۵]. نه تنها بسیاری از آلگهای دریایی ارزش تغذیه‌ای داشته بلکه مقادیر متناسبی از نوتریتها را دارند. ۵۰ الی ۲۰ درصد وزن خشک جلبک از پروتئین است. ویتامین C جلبکها به نسبت از سایر موجودات بیشتر است. عناصر کمیاب و فیبرهای غذائی دارند [۷]. آلگهای دریایی تقریباً ۱۷ نوع اسید آمینه آزاد داشته که از آن جمله تورین می‌باشد که توانایی کنترل سطح کلسترول خون را دارد [۸]. از جلبکها ماده‌ای استخراج می‌کنند که می‌تواند باعث افزایش فعالیت آنتی اکسیدانی در گیاهان و جانوران شود. این عصاره باعث افزایش مقادیر آنتی توکوفرول، اسید اسکوربیک، بتاکاروتون می‌شود. این عصاره می‌تواند در ارتباط با موجودات هدف باعث افزایش پراکسیداز اسکوربات و کاهش دهنده گلوتانیون باشد [۹]. استفاده از روش‌های طبیعی تر و با تأکید بر موادی که امکان تولید مواد مضر کمتری دارند، نیز وجهه همت بسیاری جهت کاهش کلسترول تخم مرغ می‌باشد. استفاده از جلبکهای دریایی اعم از میکروسکوپیک و ماکروسکوپی از جمله نکاتی است که جای تعمق دارد. از آنجایی که معمولاً این گونه جلبکها با باکتریهایی از قبیل پسودوموناس، باسیلوس،

استفاده شد.

## ۶-۲- سنجش میزان کلسترول

جهت سنجش میزان کلسترول از روش [۱۰] استفاده شد. نمونه‌های مورد نظر به دو آزمایشگاه ارسال و آزمایشات مورد نظر انجام شد. چربی‌های موجود در تخم مرغ به دو دسته کلسترول و تری گلیسیرید تقسیم می‌گردند. آزمون کلسترول بر اساس کالریمتری و بر مبنای واکنش رنگ Libermann –Burchard شامل Low (LDL, High Density Lipoprotein) HDL و Very Low Density (VLDL) Density Lipoprotein (Lipoprotein) می‌باشد. HDL به عنوان عاملی مثبت محسوب شده و در روغنهای گیاهی یافت می‌شود. LDL به عنوان چربی منفی مد نظر قرار می‌گیرد. متخصصین بر این باورند که حداقل ۲۵٪ چربی بایستی به صورت HDL باشد تا سیستم بدن بتواند کلسترول را از جریان سرخرگی خارج و وارد کبد سازد. HDL می‌تواند کلسترول را از پلاکهای تشکیل شده درون رگها جدا کند. HDL کمتر از ۴۰ µg/dl خطر حمله قلبی را زیاد می‌کند.

## ۳- نتایج

از دو نوع جلبکهای دریایی Sargassum glaucescens و Nizimuddinia zanardinii با نسبتهای ۱٪، ۲٪، ۵٪ به صورت جایگزین غذای معمولی استفاده شد. پس از پایان دوره ۱۸ روزه، مقادیر کلسترول اندازه گیری شد. مقادیر اندازه گیری شده پس از انجام آنالیز واریانس یکطرفه (جدول شماره یک) و با استفاده از آزمون تفکیک میانگینهای LSD گروههای هموژن از گروههای با تفاوت معنی دار مشخص شدند (جداول ۲، ۳، ۴، ۵). شکل شماره یک نیز تغییرات حاصل را نشان می‌دهد.

مرغهای تولیدی جهت سنجش کلسترول نمونه‌های لازم اخذ و جهت بررسی بیشتر به آزمایشگاه‌های متعدد ارسال شد. نتایج حاصل با استفاده از نرم افزار اکسل و استات گراف بررسی و پردازش شد.

**جلبکهای مورد آزمایش:** در این تحقیق از دو نوع جلبک Sargassum glaucescens ، J. agardh و (Nizimuddinia zanardinii Schiffner) نیزیمیدین استفاده شد. جلبکهای مورد نیاز بهوسیله عملیات غواصی و از ستون آبی تهیه شدند. سعی شد فاصله زمانی صید و استفاده از جلبک به حدائق کاهش یابد.

**آماده سازی جلبکها:** جلبکها پس از صید به مدت یک روز در معرض آفتاب قرار گرفته تا خشک شده و پس از انتقال به محل آزمایش آنها را با آسیاب خرد کرده، سپس با ترکیهای ۱٪، ۲٪، ۵٪ وزنی به صورت جایگزین غذای معمول ترکیب و تهیه شد.

## ۴-۲- غذای مورد استفاده


غذای مورد استفاده با ترکیب سویا ۵۵ کیلوگرم، گندم ۴۵۰ کیلو گرم، کربنات کلسیم ۳۰ کیلوگرم، صدف جنوب ۶۰ کیلوگرم، پودر استخوان ۲۶ کیلوگرم، نمک ۲،۵ کیلوگرم، مکمل ویتامینی و معدنی ۵ کیلو گرم، میتوینین ۹۰۰ گرم، ذرت ۲۲۰ کیلوگرم، کنجاله آفتاگردان ۵۰ کیلوگرم، کنجاله پنبه ۵۰ کیلوگرم، کنجاله ذرت ۵۰ کیلوگرم، لیزین ۱۳۰۰ گرم بوده است که جمع غذای استفاده شده ۱۰۰۰،۷ کیلوگرم بوده است.

## ۵-۲- ساخت غذا

ترکیب غذایی فوق با استفاده از آسیاب خرد شده و جلبک مورد نیاز برای هر تیمار محاسبه و با ترکیبهای دلخواه با غذای فوق مخلوط و برای هر تیمار غذا به علاوه مقدار متناسب جلبک بدست آمده و در طی دوران آزمایش برای هر تکرار هر تیمار از غذای خاص خود

جدول ۱ آنالیز واریانس سنجش کلسترول بر اثر اعمال تیمارهای مختلف جلبکی در سطح اطمینان ۹۵٪

منبع	جمع مریعات	درجه آزادی	میانگین مریعات	F	مقدار p
بین گروهها	۱۸۷۱۴,۷	۶	۳۱۱۹,۱	۳,۵۳	.۰۲
درون گروهها	۱۳۲۵۱,۱	۱۵	۸۸۳,۴		
جمع	۳۱۹۶۰,۸	۲۱			



شکل ۱ تغییرات کلسترول بر اثر اعمال تیمارهای جلبکهای دریایی

جدول ۲ مقادیر میانگینهای حاصل از میزان کلسترول بر اثر تغذیه مرغ با جلبکهای مختلف در سطح اطمینان ۹۵٪ (P&lt;.05)

تیمار	میانگین ± s.d.
سارگاسم ۱٪	۹۲,۵ ± ۱۴,۴۶ <sup>a</sup>
سارگاسم ۰.۲٪	۱۱۵,۷۵ ± ۱۴,۴۶ <sup>ab</sup>
سارگاسم ۰.۵٪	۱۰۳ ± ۲۰,۴۶ <sup>b</sup>
نیزیمیدین ۱٪	۱۰۲ ± ۱۶,۷ <sup>bc</sup>
نیزیمیدین ۰.۲٪	۱۲۳,۷ ± ۱۴,۴۶ <sup>ab</sup>
نیزیمیدین ۰.۵٪	۱۵۱ ± ۱۶,۷ <sup>b</sup>
شاهد	۱۸۶,۳ ± ۱۶,۷ <sup>c</sup>

(P&lt;.05) %

c b a

جدول ۳ مقدادیر میانگینهای HDL تخم مرغ بر اثر تغذیه مرغ با جلبکهای مختلف در سطح اطمینان ۹۵٪ (P&lt;0.05)

تیمار	میانگین ± s.d.
سارگاسم٪۱	<sup>b</sup> ۲,۳۸ ± ۱۲,۹۵
سارگاسم٪۲,۵	<sup>a</sup> ۲,۳۸ ± ۵,۷۵
سارگاسم٪۵	۵,۴۵ ± ۳,۷۷ <sup>ab</sup>
نیزیمیدین٪۱	۷,۱۳ ± ۲,۷۵ <sup>ab</sup>
نیزیمیدین٪۲,۵	۵,۶ ± ۲,۳۸ <sup>a</sup>
نیزیمیدین٪۵	۴,۹ ± ۲,۷۵ <sup>a</sup>
شاهد	۸,۳۶ ± ۲,۷۵ <sup>ab</sup>

مقدادیر a, b و c تفاوت معنی دار میانگینهای را در سطح اطمینان ۹۵٪ (P<0.05) نشان می دهند.

جدول ۴ مقدادیر میانگینهای تری گلیسرید تخم مرغ بر اثر تغذیه مرغ با جلبکهای مختلف در سطح اطمینان ۹۵٪ (P&lt;0.05)

تیمار	میانگین ± s.d.
سارگاسم٪۱	۱۲۶۶,۷ ± ۳۴۴,۴ <sup>a</sup>
سارگاسم٪۲,۵	۱۴۶۷ ± ۳۴۴,۴ <sup>a</sup>
سارگاسم٪۵	۱۴۱۳ ± ۴۸۷ <sup>a</sup>
نیزیمیدین٪۱	۱۳۷۵ ± ۳۹۸ <sup>a</sup>
نیزیمیدین٪۲,۵	۱۵۵۸,۷ ± ۳۹۸ <sup>a</sup>
نیزیمیدین٪۵	۱۴۹۴ ± ۳۹۸ <sup>a</sup>
شاهد	۱۹۹۴ ± ۳۹۸ <sup>a</sup>

جدول شماره ۵ تکرار مقدادیر میانگینهای تری گلیسرید تخم مرغ بر اثر تغذیه مرغ با جلبک سارگاسم در سطح اطمینان ۹۵٪ (P&lt;0.05)

تیمار	میانگین ± s.d.
سارگاسم٪۱	<sup>a</sup> ۸۶۱۱۰,۶ ±
سارگاسم٪۲,۵	<sup>ab</sup> ۸۶ ± ۱۲۰
شاهد	<sup>b</sup> ۱۳۹۹±۸۶

مقدادیر a, b و c تفاوت معنی دار میانگینهای را در سطح اطمینان ۹۵٪ (P<0.05) نشان می دهند.

۰٪۲,۵ و ۰٪۵ به صورت جایگزین غذايی معمولی استفاده شد. تعداد تخم مرغهای شمارش شده در روزهای یازدهم تا هجدهم پس از انجام آنالیز واریانس یکطرفه (جدول شماره ۶) و با استفاده از آزمون تفکیک میانگینهای LSD گروههای هموژن از گروههای با تفاوت معنی دار مشخص شدند (جدول ۷).

از آنجائیکه جلبکهای مورد استفاده در طیف وسیعی اثرات چند جانبی بر طیور دارند، در کنار سنجش کلسترول اثر جلبک بر میزان تخم دهی مرغها بررسی شد. در این رابطه تعداد تخم مرغهای تولید شده با تیمارهای مختلف سارگاسم *Sargassum glaucescens* و نیزیمیدین *Nizimuddinia zanardinii* با نسبتهای ۱٪،

جدول ۶ آنالیز واریانس میزان تخم دهی مرغهای تغذیه شده با جلبکهای مختلف

منع	جمع	جمع مربعات	درجه آزادی	میانگین مربعات	F مقدار	p مقدار
بین گروهها	۱۱۵,۹	۲۳,۲	۵	۳,۱	.۰۱۸	
درون گروهها	۳۱۴	۷,۵	۴۲			
جمع	۴۲۹,۹	۴۷				

جدول شماره ۷ تخم دهی مرغهای تغذیه شده با جلبکهای مختلف در سطح اطمینان ۹۵٪ (p&lt;.05)

تیمار	میانگین ± s.d.
سارگاسم	۱۹,۵ ± ۱,۱ <sup>a</sup>
سارگاسم	۱۸,۳۷ ± ۰,۵ <sup>a</sup>
سارگاسم	۲۲,۳۷ ± ۱ <sup>c</sup>
نیزیمیدین	۲۲,۱۲ ± ۱ <sup>b,c</sup>
نیزیمیدین	۱۸,۷۵ ± ۱ <sup>a</sup>
نیزیمیدین	۲۰,۶۲ ± ۱ <sup>abc</sup>
شاهد	۱۹,۲۵ ± ۱ <sup>a</sup>

مقادیر a, b و c تفاوت معنی دار میانگینها را در سطح اطمینان ۹۵٪ (P<.05) را نشان می دهد.

#### جلبک ۱٪ سارگاسم همراه با غذای معمول مرغداری

استفاده شده در این تحقیق همخوانی دارد.

استفاده از عصاره‌ها می‌تواند موجب تغییر شکل پروتئینها گردد ولی استفاده از جلبکهای دریایی صرف نظر از راندمان بالای آن، چنین اثراتی ندارد. استفاده از بتا سیکلو دکسترون نیز راندمان بالایی تا حد ۹۴٪ کاهش کلسترول را نشان می‌دهد ولی در عوض به عنوان ماده‌ای که می‌تواند سرطان زا باشد، استفاده از آن دچار محدودیت جدی است.

دسته دوم از روش‌های مطرح استفاده از مواد طبیعی همچون باکتریها، قارچها و گیاهان مختلف است. هرچند استفاده از باکتریها و قارچها نتایج موفقی در کاهش کلسترول در برداشته ولی آنجاکه صحبت از غذای انسان می‌باشد، بدون شک استفاده از اینگونه تولیدات با رغبت کمتری همراه خواهد بود. مطمئناً در آینده ای نزدیک بهره‌گیری از جلبکهای دریایی در کاهش کلسترول جایگاه ویژه‌ای را بخود اختصاص خواهد داد. برخی خصوصیات ویژه‌ای آنها از قبیل همزیستی با باکتریهای مفید از قبیل

#### ۴- بحث

تخم مرغ یکی از غذاهایی است که به دلیل ویژگیهای خاص خود در گستره سنی وسیعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ماده غذایی مقبولیت گسترده‌ای دارد و عمدها مانع اصلی مصرف بیشتر آن میزان کلسترول آن می‌باشد. چنانچه این مانع به نحوی مرتفع شود، میزان مصرف آن به طور قابل ملاحظه‌ای متفاوت خواهد شد. حل این مشکل می‌تواند برای سینین بالا و بیماران قلبی نوید بخش استفاده از رژیمهای غذایی بهتری باشد.

روشهای متعددی برای کاهش کلسترول پیشنهاد شده است که به طور کلی می‌توان آنها را در دو دسته روشهای شیمیائی و روشهای بیولوژیک تقسیم کرد.

در استفاده از روشهای شیمیائی ممکن است محصول نهایی ایجاد شده تفاوت‌هایی از نظر کیفیت داشته باشند. این روشهای طیف وسیعی از مواد شیمیائی از قبیل استفاده از لواستین تا استات مس را در بر می‌گیرد.

هرچند استفاده از لواستین می‌تواند ۱۹ الی ۳۶ درصد کلسترول تخم مرغ را کاهش دهد. این کاهش با اثر

سپاس به عمل آید. بی گمان عملکرد مثبت این شرکت می تواند در زمینه اجرای طرحهای تحقیقاتی الگوی بسیار خوبی برای سایر ین در زمینه پیشبرد تحقیقات محسوب گردد.

همچنین از خدمات دقیق آزمایشگاههای بوفون به مدیریت جناب آقای دکتر امین کیوان و آزمایشگاه گلستان به مدیریت جناب آقای دکتر حمید رضا طبیب زاده و سرکار خانم دکتر ژاله مصطفوی کمال تشکرو سپاس را دارد.

-

- [1] Sheather, K.R., 1992, Successes and failures in Australia, *Poultry international*, 31,60-68[
- [2] Mori, A.V., Mendonca,C.J., Santos, C. 1999, Effect of dietary lipid- lowering drugs upon plasma and egg yolk cholesterol level of laying hens . Journal of Agricultural and food Chemistry, 47, 4731-4735.
- [3] Ankari, A., Najib, H., Hozab, A., 1998, Yolk and serum choleral and production traits, as affected by incorporating a supraoptimal amount of copper in the diet of the leghorn hen *British Poultry Science*, 39,393-397.
- [4] Reddy,R.V.,Lightsey,S.F.,Maurice,D.V.,1991, Effect of feeding garlic oil on performance and egg yolk cholesterol concentration, *Poultry Science*, 70, 2006-2009
- [5] Chenfeng , L.V., Tang, Y., Wang, I., Ji,W., Chen , Y., Yang,S., Wang, W., 2002, Bioconversion of yolk cholesterol by extracellular cholesterol oxidase from *Brevibacterium* sp., LSEVIER, Food chemistry, vol 77, pp 457-463.
- [6] Arntfield, S.D.,Bully,N.R.,Crerar, W.j., 1992, Supercritical CO<sub>2</sub> extraction of egg yolk: impact of temperature and entrainer on

باسیلهای [11] که هم اکنون به عنوان پروپیوتیک طیور مطرح هستند. همچنین توانایی جلبکها در افزایش اثر آنتی اکسیدانی در سایر گیاهان و جانورانی که از آن استفاده می کنند، نکته ای است که به صورت طبیعی می تواند موجبات بهبود کیفیت گوشت مرغ و تخم مرغ حاصل را دربی داشته باشد. این خاصیت منحصر به فرد نه تنها موجب کاهش کلسترول می شود بلکه می تواند ماندگاری گوشت مرغ و تخم مرغ را افزایش دهد. این خواص با وجود اسید آمینه آزاد تورین در این جلبکها تقویت می شود.

در این تحقیق اکثر تیمارهای جلبکی توانسته اند میزان کلسترول را کاهش دهند که از آن میان سارگاسم ۰.۱٪ بهترین نتیجه را در بر داشته است و ۰.۳۴٪ کلسترول را کاهش داده است. سارگاسم ۰.۱٪ نیز میزان HDL را به طور معنی داری افزایش داده است و این در حالی بوده است که بر میزان تری گلیسرید تفاوت معنی داری نداشته اند. استفاده از جلبک می تواند بر میزان تخم دهی اثر مثبت بگذارد، نیز میبدین ۰.۵٪ توانسته ۰.۱۱٪ تخم دهی مرغ را بهبود بخشد.

بدون شک و با دانستنی های کنونی، استفاده از جلبک سارگاسم برای کاهش کلسترول می تواند یکی از روشهای خوب و بدون عوارض جانبی قلمداد گشته و برای ایجاد جیره غذایی بهتر توصیه شود.

بدون شک جای تحقیق بسیاری در مورد اثر جلبک بر کاهش کلسترول وجود دارد و تحقیق انجام شده فقط می تواند به عنوان یک شروع قلمداد شود. این امید وجود دارد که علاقه مندان ضمن ارشاد نگارندگان از بذل نظرات اصلاحی خود دریغ نفرمایند.

## ۵- قدردانی

شایسته است که از همکاری صمیمانه هیأت مدیره شرکت تولیدی جوچک که با نظر بلند امکانات و هزینه اجرای این پروژه را در اختیار گذاشتند کمال تشکر و

- residual protein, *Journal of American Oil Chemist, Society*,69,823-825
- [7] Noda, H., 1993, J., *Appl. Phycol.* Vol. 5 , pp. 255-258, in Sahoo, D., Tang, X., Yarish, C., 2002, Porphyra- the economic seaweed as a new experimental system, *Scientific Corresponding* Vol. 83, NO, 11, PP 1313-1316.
- [8] Sahoo, D., Tang, X., Yarish, C., 2002, Porphyra- the economic seaweed as a new experimental system, *Scientific Corresponding* Vol. 83, NO, 11, PP 1313-1316
- [9] Alle V.G., Pond,K.R., Saker,K.E.,Fontenot, J.P., Bagley, R.L., Ivy.R.L., Evans, R.R., Schmidt, J.H., Fike.,J.H., Zhang, X., Ayad, J.Y., Brown, C.P., Miller, M.F., Montgomery,
- J.L., Mahan, J., Wester, D.B., and Melton, C., 2001, Influence of a brown seaweed on antioxidants in forages and livestock – A review, *American Society of Animal Science*
- [10] Pasin , G., Smith, G.M. ,O'Mahony, M., 1998 , Rapid determination of total cholesterol in egg yolk using commercial diagnostic cholesterol reagent , ELSEVIER, *Food chemistry*, vol 61, No, ½, pp 2255-259
- [11] حسن نیا، محمد رضا، ۱۳۷۹، بررسی اثرات غذایی مکمل (بacterی پسودوموناس فلوروسنس) و غذای زنده (جلبک و آرتمیا) بر میگوی سفید هندی (Penaeus indicus) در مراحل لاروی ، دانشگاه آزاد اسلامی.

## Effects of marine algae on egg cholesterol

**Mohammad Reza Hasannia<sup>1\*</sup>, Bairam Mohammad Gharanjik<sup>2</sup>, Ali Asghar Dadghani<sup>3</sup>**

1- Assistant Professor, Department of Aquaculture Engineering, Shilat Research Organization of Iran

2- Lecturer, Chabahar Research Center

3- Production Manager of Jojac Company

In order to reduce egg cholesterol, two types of marine algae; *Sargassum glaucescens* and *Nizimuddinia zanardinii* were substituted 1% , 2.5% and 5% of poultry routine diet. During 18 days period, effects of algae on cholesterol factors of hen blood and egg like LDL and HDL were studied. The efficiency of egg production as a result of algae impact also was determined. the results of this study showed that using of 1% *Sargassum* can reduce 34% cholesterol in egg and 2.5% *Sargassum* sp can increase 11% egg production in compare with control.

**Keywords:** Algae, Seaweed, *Sargassum*, *Nizimuddinia*, Cholesterol.

\* Corresponding author E-mail: hassannia\_mr@yahoo.com