

اثر آنزیم ترانس‌گلوتامیناز میکروبی و جایگزین‌های چربی بر پایه پروتئین بر ویژگی‌های فیزیکی بستنی کم‌چرب و انبیلی

سمانه فرجی کفشه‌گری^۱، مهران اعلمی^{۲*}، مرتضی خمیری^۳، علی معتمدزادگان^۳

۱- دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

۲- دانشیار و عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

۳- دانشیار و عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

(تاریخ دریافت: ۹۳/۱/۲۴ تاریخ پذیرش: ۹۳/۵/۱۰)

چکیده

در این پژوهش تاثیر کنسانتره پروتئین آب‌پنیر به عنوان جایگزین چربی بر پایه پروتئین سویا (در مقدار ۰، ۱ و ۲ درصد) و آنزیم ترانس‌گلوتامیناز میکروبی (در مقدار ۰ و ۱ و ۲ درصد) بر ویژگی‌های فیزیکی بستنی کم‌چرب و انبیلی (۴ درصد چربی) شامل میزان ذوب و سختی مورد بررسی قرار گرفت. الگوی الکتروفورز پروتئین‌های بستنی و عملکرد آنزیم ترانس‌گلوتامیناز میکروبی نیز در نمونه‌های بستنی با ژل-SDS-PAGE بررسی شد. تمامی فرمولاسیون‌ها ماده خشک یکسانی داشتند (۳۴ درصد). نتایج حاصل داد به کارگیری کنسانتره پروتئین آب‌پنیر در فرمولاسیون بستنی‌های کم‌چرب به طور معنی‌داری موجب افزایش سختی و میزان ذوب شد ($P < 0.01$). همچنین استفاده از ایزوله پروتئین سویا به طور معنی‌داری، موجب افزایش سختی و کاهش میزان ذوب شد ($P < 0.01$). آنزیم ترانس‌گلوتامیناز میکروبی در نمونه‌های بستنی نسبت به نمونه شاهد، موجب کاهش سختی و میزان ذوب شد ($P < 0.01$) و طبق نتایج می‌توان دریافت استفاده از آنزیم ترانس‌گلوتامیناز میکروبی در بستنی‌های کم‌چرب نسبت به استفاده از این دو نوع پروتئین اثرات مطلوب‌تری به جای گذاشت.

کلید واژگان: آنزیم ترانس‌گلوتامیناز میکروبی، ایزوله پروتئین سویا، بستنی کم‌چرب و انبیلی، جایگزین چربی بر پایه پروتئین، کنسانتره پروتئین آب‌پنیر.

* مسئول مکاتبات: mehranalami@gmail.com

تری یافته، اگرچه رنگ آن کمی تیره‌تر و سبزتر شد [۶]. همچنین جایگزینی ۶ درصد پروتئین آب‌پنیر به عنوان جایگزین چربی در بستنی وانیلی کم‌چرب، اثرات قابل توجهی روی طعم و اندیلی نداشته درحالی که بافت را بهبود می‌بخشد [۷]. در پژوهشی که توسط کاراکا و همکاران [۸] صورت گرفت، استفاده از جایگزین‌های چربی حاوی پروتئین‌های آب‌پنیر به طور معنی داری موجب بهبود خصوصیات حسی بستنی‌های با چربی کاهش یافته و کم‌چرب و نیز کاهش سختی آن‌ها شد. با وجود این که تحقیقات انجام شده بر ارزش تغذیه‌ای و درمانی بالای پروتئین سویا و عملکرد مناسب WPC به عنوان جایگزین چربی و نقش MTG در بهبود بافت مواد غذایی اذاعان داشته‌اند، اما تاکنون در زمینه به کارگیری WPC، SPI و MTG به طور همزمان در بستنی کم‌چرب پژوهشی انجام نگرفته است لذا در این مطالعه به تولید بستنی کم‌چرب با استفاده از MTG، SPI و WPC پرداخته شده است.

۲- مواد و روش‌ها

۱-۱- مواد

مواد اولیه‌ای که در این پژوهش استفاده شد شامل شیرخشک پس‌چرخ، خامه استریل با ۲۵ درصد چربی، شیر استریل کم‌چرب ۱ درصد چربی، شکر، شعلب، وانیل، استabilایزر تجاری پالسکارد، MTG، SPI، WPC

۲-۲- روش

در این پژوهش نمونه‌های بستنی بر اساس روش آکالم و همکاران [۴] تهیه شدند. تمامی نمونه‌های بستنی دارای ۳۴ درصد ماده خشک بودند. جهت تهیه مخلوط بستنی، ابتدا هر یک از مواد اولیه توزیں گردیدند. در این پژوهش مقادیر SPI و WPC با توجه به کارهای تحقیقاتی اولیه انتخاب شد. پس از توزیں مواد اولیه، شیر و خامه با یکدیگر مخلوط و حرارت داده شدند. پس از رسیدن به دمای ۴۵ درجه سانتی گراد و حل شدن خامه در شیر، مخلوط مواد خشک شامل شکر، پایدارکننده، شیرخشک به آن اضافه شدند. در برخی از نمونه‌ها با توجه به نوع فرمولاسیون پیش‌بینی شده با استفاده از

۱- مقدمه

در سال‌های اخیر، به دلیل مزایای تغذیه‌ای و سلامتی، مصرف بستنی کم‌چرب توسعه یافته است. بستنی کم‌چرب، بستنی است که کمتر از ۵ درصد وزنی چربی دارد [۱]. تولید کنندگان بستنی کم‌چرب با استفاده از جایگزین‌های چربی بر پایه کربوهیدرات مانند مالتون-دکسترین یا جایگزین‌های چربی بر پایه پروتئین مانند کنسانتره پروتئین آب‌پنیر (WPC)^۱، بافت و طعم و ساختار آن را بهبود می‌بخشند. مطالعات نشان داده است که استفاده از جایگزین‌های چربی بر پایه کربوهیدرات نسبت به جایگزین‌های چربی بر پایه پروتئین، مخلوط بستنی با ویسکوزیته بسیار زیادی می‌سازد که قابلیت زدن را کاهش می‌دهند. در حالی که برخی مطالعات نشان داده است که WPC، پودر آب‌پنیر و بسیاری از فرآورده‌های آن می‌توانند به طور موفقیت‌آمیزی به عنوان جایگزین ماده خشک شیر بدون چربیدر بستنی استفاده شوند. به دلیل ارزش تغذیه‌ای بالای ایزوله پروتئین‌سوسیا (SPI)^۲، کاربرد آن در مواد غذایی توسعه یافته است. آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی (MTG)^۳ آنزیمی است که در پروتئین‌های مانند گلوبولین‌های سویا، پروتئین‌آب‌پنیر، کازئین، گلوتن و اتصالات عرضی ایجاد می‌کند و بر ویژگی‌های پروتئین مانند پایداری حرارتی، ظرفیت نگهداری آب و ... تاثیر می‌گذارد. بنابراین در این طرح از WPC به عنوان جایگزین چربی و MTG جهت بهبود ساختار بستنی کم‌چرب حاوی SPI استفاده می‌شود. پروتئین‌ها نقش مهمی در توسعه ساختار بستنی داشته و موجب پایداری کف می‌شوند [۲]. بنابراین، پلیمریزاسیون آن‌ها توسط MTG موجب تشکیل فیلم پروتئینی با مقاومت بیشتر و بهبود ویژگی‌های کاربردی در بستنی می‌شود [۳]. تحقیقات نشان داده است که افزودن ایزوله پروتئین آب‌پنیر در بستنی‌های کم‌چرب، افزایش معنی داری در سختی و پایداری ذوب دارد [۴]. غنی‌سازی بستنی کم‌چرب با SPI نشان داد که با افزایش میزان SPI، ویسکوزیته و رنگ سبز افزایش می‌یابد [۵]. همچنین بستنی کم‌چرب غنی شده با SPI، احساس دهانی، ویسکوزیته و پوشش دهانی، دمای ذوب و افزایش حجم مناسب-

1. Whey protein concentrate

2. Soy protein isolate

3. Microbial enzyme transglutaminase

سوکسله [۹]، اندازه‌گیری ماده خشک تمامی مواد فرمولاسیون بستنی [۱] بود.

۲-۳-۲- آزمایشات اصلی

آزمایشاتی که بر روی نمونه بستنی انجام گرفت شامل اندازه‌گیری میزان ذوب شدن و سختی و بررسی الگوی الکتروفوروز پروتئین‌ها بود که با روش زیر انجام شد.

۴- اندازه‌گیری میزان ذوب شدن

یک قالب بستنی با وزن 30 ± 1 گرم روی الکی با حفره‌های ۲ میلی‌متری قرار داده شد و در انکوباتور با دمای ۲۵ درجه سانتی گراد قرار داده شد. پس از مدت ۳۰ دقیقه وزن مایع ذوب شده بر حسب درصدی از وزن نمونه اولیه اندازه‌گیری و محاسبه شد [۱۰].

۵- اندازه‌گیری سختی

اندازه‌گیری سختی بافت در دمای اتاق (25 ± 1 درجه سانتی گراد) و با دستگاه بافت‌سنج با مدل TA.XT و پروب استوانه‌ای از جنس استیل ضد زنگ با قطر $2/5$ سانتی‌متر انجام شد. نمونه‌های بستنی به مدت ۱ ماه در فریزر با دمای -18 درجه سانتی گراد و ۲۴ ساعت قبل از آزمون، در دمای -10 درجه سانتی گراد نگهداری شدند. نمونه‌های بستنی در ظروف پلاستیکی در دو مکان روی سطح صاف و بزرگ قرار گرفتند و حداقل نیروی فشاری بر حسب گرم طی نفوذ در نمونه به عنوان سختی اندازه‌گیری شد [۴]. شرایط آزمون به صورت جدول ۱ بود.

روش سطح پاسخ، SPI و WPC نیز همراه با سایر مواد خشک در همین مرحله به مخلوط بستنی اضافه شدند. سپس نمونه‌ها به مدت ۵ دقیقه به وسیله هموژنایزر هیدولف با سرعت ۷۰۰۰ دور در دقیقه به طور کامل مخلوط گردیدند. در نمونه‌های حاوی MTG نیز، پس از اتمام عمل اختلاط و یکنواختی کامل توسط هموژنایزر، در این مرحله MTG اضافه شد و به مدت ۴۵ دقیقه در دمای 40 درجه سانتی گراد فعالیت نمود. جهت پاستوریزاسیون مخلوط حاصل از دمای 75 درجه سانتی گراد به مدت ۲۵ دقیقه استفاده گردید. در طی فرآیند پاستوریزاسیون، MTG نیز غیرفعال شد. پس از پایان عملیات پاستوریزاسیون، مخلوط حاصل بلافاصله به وسیله حمام آب و یخ سرد گردید و جهت رسانیدن به مدت ۲۴ ساعت در یخچال با دمای 4 درجه سانتی گرادنگه‌داری شد. عملیات انجام بستنی به وسیله دستگاه بستنی‌ساز موسو به مدت ۲۰ دقیقه انجام شد. سپس نمونه‌های بستنی در ظروف پلاستیکی دربوش دار بسته‌بندی و سطح آنها به وسیله قاشق صاف شد. نمونه‌های آماده شده در فریزر -18 درجه سانتی گراد نگهداری گردید. تولید نمونه‌ها با دو تکرار در روزهای مختلف انجام شد.

۳-۲- آزمایشات

۱-۳-۲- آزمایشات مقدماتی

آزمایشاتی که بر روی مواد اولیه صورت گرفت شامل اندازه‌گیری چربی شیر و خامه به روش حجمی ژربر [۹]، اندازه‌گیری پروتئین SPI و WPC و شیرخشک پس چرخ به روش کجلدال [۹]، اندازه‌گیری چربی شیرخشک پس چرخ و SPI و WPC به روش

جدول ۱ شرایط آزمون سختی نمونه‌های بستنی

عمق نفوذ (میلی‌متر)	نیرو (گرم)	سرعت پروب طی نفوذ (میلی‌متر بر ثانیه)	سرعت پروب قبل و بعد از نفوذ (میلی‌متر بر ثانیه)
۱۵	۵	۳/۳	۳

نکته: تمامی آزمون‌ها در سه تکرار انجام شدند.

۷-۲- طرح آماری

طرح مرکب مرکزی در قالب روش سطح پاسخ، با استفاده از نرم افزار Design Expert طراحی گردید. این طرح

۶-۲- بررسی الگوی الکتروفوروز پروتئین‌ها

الگوی الکتروفوروز پروتئین‌های بستنی و عملکرد MTG نمونه‌های بستنی با ژل SDS-PAGE بررسی شد [۱۱].


شامل MTG و WPC SPI از آزمون‌های اولیه استنتاج گردید (جدول ۲).

آزمایشی شامل ۸ نقطه فاکتوریل، ۶ نقطه محوری و ۶ تکرار در نقطه مرکزی بود. کلیه‌ی تیمارهادر ۲ تکرار صورت پذیرفتند. همچنین محدوده‌ی متغیرهای مستقل

جدول ۲ متغیرهای مستقل و سطوح مورد استفاده آنها در فرمولاسیون بستنی کم‌چرب

سطوح و حدود متغیرها			متغیرهای مستقل
-1	0	+1	
.	1	2	(درصد) SPI
.	2	4	(درصد) WPC
.	1	2	(درصد) MTG

با وزن مولکولی بالا نشان داده می‌شود. نتایج SDS-PAGE پروتئین‌های موجود در بستنی کم‌چرب در شکل ۱ نشان داده شده است.



شکل ۱ الگوی الکتروفورز پروتئین‌های SPI و WPC و سایر پروتئین‌های بستنی

M: پروتئین نشانگر الکتروفورز، A : نمونه شاهد، B : حاوی ۲ درصد C : حاوی ۲ درصد SPI و ۴ درصد WPC و ۴ درصد MTG، D: SPI و ۲ درصد WPC و ۴ درصد MTG، E: حاوی ۴ درصد WPC، نمونه ۶ حاوی ۴ درصد WPC و ۲ درصد MTG، F: حاوی ۲ درصد SPI و ۲ درصد MTG

تجزیه و تحلیل داده‌ها به روش سطح پاسخ در قالب طرح مرکب مرکزی (CCD)⁴ با استفاده از نرم افزار Design Expert⁵ انجام گرفت. برای نشان دادن رابطه هریک از متغیرهای تابع (ویسکوزیته، اورزان، pH، اسیدیته و پذیرش کلی) در مدل رگرسیون با متغیرهای مستقل، نمودارهای سطح پاسخ آنها به وسیله نرم افزار Design Expert ترسیم شدند.

۳- نتایج و بحث

ترکیبات شیمیایی برخی از مواد اولیه مصرفی در فرمولاسیون بستنی کم‌چرب در این پژوهش، از نقطه نظر میزان رطوبت، پروتئین و چربی در جدول ۳ آورده شده است.

۱-۳- الگوی الکتروفورز پروتئین‌های بستنی حاوی WPC، SPI، MTG و

در این پژوهش اتصالات درون مولکولی پروتئین‌های شیر و پروتئین‌های افروده شده به مخلوط بستنی شامل SDS-PAGE، MTG با تاثیر عمل MTG، با این یک روش پذیرفته شده برای مشاهده پیوندهای درون مولکولی تشکیل شده توسط MTG است. در این روش اتصالات عرضی درون مولکولی از طریق تشکیل پیوندهای جدید


4. Central Composite Design (CCD)

5. Design Expert, 8.0.7.1 Trial, Stat-Ease Inc.

جدول ۳ ترکیبات شیمیایی مواد اولیه مصرفی در فرمولاسیون بستنی کمچرب

مواد اولیه	SPI	WPC	شیر خشک پس چرخ	شیر	خامه
رطوبت (درصد)	۷/۳۶	۶/۱۷	۴/۵۳۲	۹۰/۳۷	۶/۷۶۵۹
پروتئین (درصد)	۸۷/۵	۳۵	۳۷	۳	۳/۲
چربی (درصد)	۰/۲	۰/۴	۰/۴	۱	۲۵
مواد اولیه	SPI	WPC	شیر خشک پس چرخ	شیر	خامه

* رطوبت بر اساس وزن مرطوبو پروتئین و چربی بر اساس وزن خشک نمونه گزارش گردیده‌اند و نتایج میانگین سه تکرار است.



شکل ۲ تغییرات ذوب شدن نمونه‌های بستنی در اثر تغییرات مقدار WPC و SPI


ملحوظه می‌گردد که افزایش مقدار SPI و WPC به ترتیب موجب افزایش و کاهش میزان ذوب شدن نمونه‌های بستنی گردید و افزایش غلظت SPI در غلظت‌های ثابت WPC موجب کاهش میزان ذوب شدن نمونه‌های بستنی می‌گردد و این روند کاهشی در محدوده‌ای که غلظت‌های SPI بالاتر از ۱/۵ و WPC کمتر از ۲ درصد شدیدتر بوده که با میزان ذوب شدن در محدوده‌ای از غلظت‌های SPI کمتر از ۰/۵ و WPC بالاتر از ۲ درصد که میزان ذوب شدن این محدوده قابل مقایسه است. میزان ذوب شدن نمونه‌ها به ترتیب با احتمال ۹۹ و ۹۵ درصد معنی‌دار گزارش شد. علت افزایش میزان ذوب شدن نمونه‌های بستنی در اثر جایگزینی WPC به نوع پروتئین آن بر می‌گردد. زیرا به علت وجود قندهای محلول بیشتر در WPC، نقطه انجماد مخلوط حاوی WPC کاهش بیشتری یافته و لذا در زمان یکسان انجماد، بستنی نرم‌تری نسبت به سایر نمونه‌ها تولید شده

با توجه به این‌که در تمامی چاهک‌ها غلظت یکسانی از پروتئین پلیمریزاسیون شده است، نتایج نشان داد که در حضور MTG مولکولی بالاتر تشکیل می‌شوند و این پروتئین‌های سنگین، نمی‌توانند وارد ژل شوند، در نتیجه ایجاد رنگ در زمینه ژل streaking) می‌کنند و شدت رنگ زیاد می‌شود. از مقایسه هر یک از دو ردیف A و B، C و D، E و F و G و H با یکدیگر، مشخص می‌شود که در نمونه‌های حاوی MTG، از شدت باندهای حدود ۳۰-۲۰ کیلو دالتون کاسته شد و باندهای جدیدی در ناحیه بالای ۴۲ کیلو دالتون تشکیل شده است.

این نشان می‌دهد که MTG از طریق برقراری اتصالات عرضی بین پروتئین‌های با وزن مولکولی پایین، پروتئین‌های بزرگ‌تری تشکیل می‌دهد [۱۲، ۱۳]. این نتایج نشان می‌دهد که MTG اتصال پروتئین‌های مختلف و ایجاد پروتئین‌های جدید می‌شود و در واقع این پروتئین با پروتئین‌های دیگر باند شده، ایجاد پروتئین‌های سنگین‌تر می‌کند. بنابراین می‌توان گفت که پروتئین‌های با وزن مولکولی پایین در واکنش‌های آنزمی شرکت نموده و به پروتئین‌های سنگین‌تر تبدیل شده‌اند.

۲-۳- اثر متقابل افزودن SPI و WPC بر میزان ذوب شدن نمونه‌های بستنی

در شکل ۲ اثرات ترکیبی SPI و WPC بر میزان ذوب شدن نمونه‌های بستنی نمایش داده شده است.



شکل ۳ تغییرات میزان ذوب شدن نمونه‌های بستنی در اثر تغییرات
مقدار SPI و MTG

افزایش مقدار MTG موجب افزایش پایداری و بهبود مقاومت به ذوب نمونه‌های بستنی شده است که این امر به واسطه پلیمریزاسیون پروتئین‌های موجود در مخلوط بستنی شامل MTG و SPI و WPC و پروتئین‌های شیر از طریق فعالیت MTG و SPI در گیری حباب‌های هوا در این شبکه پروتئینی که منجر به کاهش میزان انتقال حرارت و ذوب شدن می‌شود قابل توجیه است که با نتایج روسا و همکاران [۲۰] نیز مطابقت دارد. اثرات MTG بر میزان ذوب شدن نمونه‌ها با احتمال ۹۹ درصد معنی‌دار گزارش شد.

۴-۳-۱ اثر متقابل افزودن SPI و MTG بر میزان ذوب شدن نمونه‌های بستنی

در شکل ۴ ملاحظه می‌گردد که افزایش مقدار MTG و SPI به ترتیب موجب افزایش و کاهش میزان ذوب شدن نمونه‌های بستنی گردید و افزایش غلظت MTG در غلظت‌های ثابت WPC موجب کاهش میزان ذوب شدن نمونه‌های بستنی می‌گردد و این روند کاهشی در غلظت‌های MTG بالاتر از ۱/۵ و کمتر از ۳ درصد شدیدتر است که این مسئله بیان گر مناسب بودن این محدوده‌ی غلظت در مورد میزان ذوب شدن می‌باشد.

که مقاومت به ذوب مخلوط نسبت به شاهد کاهش بیشتری یافته است [۱۴]. در این خصوص نیز نتایج مشابهی به دست امده که در ذیل به آن اشاره می‌کنیم. ردی [۱۵] و خالفا [۱۶] در مقالات خود بیان کردند که با افزایش نسبت جایگزینی مواد جامد آب‌پنیر در مخلوط، زمان لازم برای ذوب کاهش می‌یابد. گای [۱۷] نیز گزارش کرده است که اگرچه افزایش سطوح جایگزینی WPC باعث افزایش میزان ذوب نمونه‌ها شد، اما این اختلاف معنی‌دار نبوده است. [۱، ۱۰] نیز به نتایج مشابهی دست یافتند. اما نتایج مخالفی دیگری نیز وجود دارد. اهم و همکاران [۱۸] گزارش کردند که بستنی‌های حاوی دیری لو (نوعی جایگزین چربی بر پایه پروتئین آب‌پنیر)، میزان ذوب کمتری نسبت به نمونه‌های شاهد داشتند. از طرف دیگر همان‌طور که از نمودار پیداست با افزایش سطح جایگزینی SPI به طور معنی‌داری از میزان ذوب نمونه‌های بستنی به طور معنی‌داری کاسته شد ($P < 0.05$). کاهش میزان ذوب نمونه‌های حاوی SPI می‌تواند به علت ویژگی اتصال آب SPI جهت تشکیل شبکه ژل باشد که مانع حرکت آزادانه مولکول‌های آب میان‌مولکول‌های مخلوط شده است. همین طور، ال ناگار و همکاران [۱۹] در پژوهش خود گزارش کردند که این‌ولیین ممکن است به عنوان یک پایدارکننده عمل کند زیرا به دلیل داشتن ظرفیت جذب آب موجب کاهش حرکت آزادانه مولکول‌های آب شده و در نتیجه موجب کاهش ویژگی‌های ذوب نمونه‌های بستنی شده است.

۴-۳-۲ اثر متقابل افزودن SPI و MTG بر میزان ذوب شدن نمونه‌های بستنی


در شکل ۳ مشاهده می‌گردد که افزایش مقدار MTG و SPI دو موجب کاهش میزان ذوب شدن نمونه‌های بستنی گردید و افزایش غلظت MTG در غلظت‌های ثابت SPI موجب کاهش میزان ذوب شدن نمونه‌های بستنی شد. این روند کاهشی در محدوده‌ی غلظت‌های SPI بالاتر از ۱ و MTG بالاتر از ۱/۵ درصد شدیدتر است که این مسئله بیان گر مناسب بودن این محدوده‌ی غلظت از SPI و MTG در افزایش مقاومت به ذوب بستنی می‌باشد.

با افزایش SPI در غلظت‌های ثابت WPC، سختی نمونه‌های بستنی افزایش می‌یابد. تغییرات مقدار SPI نسبت به تغییرات مقدار WPC تاثیر بیشتری بر سختی نمونه‌ها داشت. در این پژوهش افزودن SPI یا WPC تاثیر معنی‌داری بر سختی بستنی پژوهش افزودن SPI یا WPC تاثیر معنی‌داری بر سختی مشاهده شده در بهجای گذاشت، به نظر می‌رسد بتوان تغییرات مشاهده شده در میزان سختی بافت را با مکانیسم‌هایی که از طریق خاصیت جذب آب SPI و WPC موجب افزایش ویسکوزیته سیستم و به دنبال آن موجب افزایش سختی شده‌اند مرتبط دانست. از آنجایی که قدرت جذب آب SPI نسبت به SPI بیشتر است، افزایش بیشتر ویسکوزیته و به دنبال آن ایجاد سختی بیشتر در بستنی‌های حاوی SPI نسبت به بستنی‌های حاوی WPC دور از انتظار نیست. ماوس و هارتل [۲۱] گزارش کردند که سختی در بستنی با ویژگی‌های رئولوژی مخلوط بستنی نیز در ارتباط مستقیم است. مطابق با نظر آن‌ها بستنی‌هایی با شاخص قوام بالا، خیلی ویسکوز بودند و این ویسکوزیته سختی را افزایش داد.

۶-۳- اثر متقابل افزودن SPI و MTG بر سختی

نمونه‌های بستنی

همان‌طور که در شکل ۶ مشخص است، در غلظت‌های ثابت SPI، با افزایش MTG میزان سختی نمونه‌ها کاهش یافت. همان‌طور که در مباحث قبلی بیان شد، با افزایش SPI میزان سختی بستنی به‌طور معنی‌داری افزایش یافت ($P < 0.01$) که این امر به واسطه عملکرد SPI در ایجاد ویسکوزیته بیشتر و اوران کمتر محصول تولیدی قابل توجیه است اما با افزایش مقدار MTG، با وجود نقش MTG در افزایش ویسکوزیته، از شدت سختی نمونه‌های بستنی به‌طور معنی‌داری کاسته شد ($P < 0.05$).




شکل ۴ تغییرات میزان ذوب شدن نمونه‌های بستنی در اثر تغییرات مقدار WPC و MTG

اثرات WPC و MTG بر میزان ذوب شدن نمونه‌ها به ترتیب با احتمال ۹۹ درصد معنی‌دار گزارش شد. تاثیر MTG در کاهش میزان ذوب شدن از تاثیر WPC در افزایش میزان ذوب شدن نمونه‌های بستنی بیشتر بوده است.

۶-۴- اثر متقابل افزودن SPI و WPC بر سختی

نمونه‌های بستنی

همان‌طور که از شکل ۵ مشخص است افزودن هم‌زمان SPI و WPC موجب افزایش سختی در نمونه‌های بستنی شد و با افزایش سطح جایگزینی به میزان سختی اضافه شد. طوری که بیشترین مقدار سختی $73/741$ گرم در نمونه حاوی ۴ درصد SPI و ۲ درصد WPC مشاهده شد.



شکل ۵ تغییرات سختی نمونه‌های بستنی در اثر تغییرات مقدار SPI و WPC


همان‌طورکه از شکل ۷ مشخص است که در غلظت‌های ثابت MTG، با افزایش WPC میزان سختی نمونه‌ها افزایش یافت طوری که در محدوده غلظت MTG کمتر از ۱ و WPC بیشتر از ۳ میزان سختی به‌طور معنی‌داری افزایش یافت (P<0.01) که این امر به‌واسطه عملکرد WPC در جذب آب و ایجاد ویسکوزیته بیشتر محصول تولیدی قابل توجیه است با این حال با افزایش مقدار MTG سختی به‌طور معنی‌داری کاهش یافت (P<0.05). تغییرات مقدار WPC نسبت به تغییرات مقدار MTG تاثیر بیشتری بر سختی نمونه‌ها داشت. افزایش سختی در اثر افزایش WPC را می‌توان به افزایش ویسکوزیته در حضور WPC نسبت داد که با دلایلی که در مورد SPI در بالا به آن اشاره شده است قابل توجیه است.

۴- نتیجه گیری

تاكيد روز افزون متخصصين تغذيه بر استفاده از مواد غذائي کم-چرب و افزایش آگاهي مصرف‌کنندگان نسبت به اثرات نامطلوب چربی بر سلامت بدن، باعث گرایش جهاني مصرف‌کنندگان به سمت فراآورده‌های غذائي کم‌چرب شده است. نتایج نشان داد که بستني‌های کم‌چرب حاوي آنژیم ترانس گلوتامیناز نسبت به نمونه‌های کم‌چرب حاوي کنسانتره پروتئين آب‌پنير و ايزوله پروتئين سويا و يزگي‌های فيزيکوشيميايی بهتری داشتند. بنابراین، آنژیم ترانس گلوتامیناز میکروبی می‌تواند به تولید‌کنندگان بستني به خصوص در تولید مخلوط‌هایی که چربی آن‌ها کاهش یافته، پيشنهاد شود.

۵- منابع


- [1] Asadi Nejad, SH., Habibi Najafi, B., Rizvi, A., Nasiri Mohalati, M. 2004. Effect of whey protein concentrate cream cheese on the physicochemical and organoleptic properties. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources University of Mashhad, year 11, Issue 4..
- [2] Chegeni, B. Meshkat, A. 2006. History of ice cream in science and technology. Ayyizh Publications, Tehran, Iran.



شکل ۶ تغییرات سختی نمونه‌های بستنی در اثر تغییرات مقدار SPI و MTG

علت کاهش سختی در اثر افزودن MTG می‌توان پلیمریزاسیون پروتئین‌های SPI و کازئین‌های موجود در بستنی و تشکیل شبکه سه‌بعدی توسط MTG دانست که موجب درگیری حباب‌های هوا در این شبکه شده است که افزایش حضور هوا در بستنی مقاومت به نفوذ پروب و سختی را کاهش داده است [۲۴-۲۲].

۷-۳ اثر متقابل افزودن WPC و MTG بر سختی نمونه‌های بستنی



شکل ۷ تغییرات سختی نمونه‌های بستنی در اثر تغییرات مقدار WPC و MTG

- [14] Razavi, A., Habibi Najafi, B. 2000. Affect replace dairy and soy ice cream stabilizer on the chemical and physical properties. *Iranian Journal of Agricultural Sciences.* 32 (3), 624-615.
- [15] Reddy, V. P. 1987. Studies of value of Channa whey solids in the preparation of ice cream in partial replacement of milk solids non-fat of mix. *Indian J. Dairy science,* 40, 128-131.
- [16] Khalfalla, S. M., Mahran, G. A. 1975. The Use of whey solids in ice cream. *Egyptain J. Dairy Science.* 3, 43-50.
- [17] Guy, E. J. 1980. Partial replacement of nonfat milk solids and cane sugar in ice cream with lactose-hydrolyzed sweet whey solids. *Food Science,* 45,129-133.
- [18] Ohem, R. I., Marshal, R.T., Heymann, H. 1997. Sensory and physical properties of ice cream containing milk fat or fat replacers. *Dairy Science,* 81, 1222-1228.
- [19] El-Nagar, G., Clowes, G., Tudorica, C.M., Kuri, V., Brennan, C.S. 2002. Rheological quality and stability of yog-ice cream with added inulin. *DairyTechnology.* 55, 89-93.
- [20] Rossa, N. R., Sá, E. M. F., Burin, V. M., Bordignon-Luiz, M. T. 2011. Optimization of microbial transglutaminase activity in ice cream using response surface methodology. *Food Science and Technology,* 44, 29-34.
- [21] Muse, M.R., and Hartel, R.W. 2004. Ice cream structural elements that affect melting rate and hardness, *Dairy Science,* 87, 1-10.
- [22] Tanaka, M., Pearson, A. M., deMan, J. M. 1972. Measurement of ice cream with a constant speed penetrometer. *Food Science and Technology.* 5,105–110.
- [23] Goff, H. D., B. Freslon, M. E. Sahagian, T. D. Hauber, A. P. Stone, Stanley, D.W. 1995. Structural development in ice creamdynamic rheological measurements. *Texture Studies.* 26,517-536.
- [24] Wilbey, R.A., Cooke, T., Dimos, G. 1998. Effects of solute concentration, overrun and storage on the hardness of ice cream. Pages 186–187 in *Ice Cream: Proceedings of the International Symposium held in Athens, Greece, 18–19 September 1997.* W. Buchheim, ed. *International Dairy Federation,* Brussels, Belgium.
- [3] Pinterits, A ., Arntfield, S. D. 2008. Improvement of canola protein gelationproperties through enzymatic modification with transglutaminase. *Food Science and Technology,* 41, 128-138.
- [4] Akalm, A. S., Karagozlu, C., and Unal, G. 2008. Rheological properties of reduced-fat and low-fat ice cream containing whey protein isolate and inulin. *European Food Research and Technology,* 227, 889-895.
- [5] Friedeck,K.G., Karagul-Yuceer,Y.2003.Soy protein fortification of a low –fat dairy- based ice cream.*Food Science,*68, 2651-2657.
- [6] KHashayar, P. 2006. Enriched of low-fat ice cream with soy. Sixteenth National Congress of Iranian food. Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
- [7] Yilsay,T.O,Yilmaz,L,Bayzit,A.A. 2006. Theeffectofusingawheyprotein fat replacer on textural and sensory characteristics of low-fat vanilla ice cream *European Food Research Technology,*222,171-175.
- [8] Karaca, O.B., Guven, M., Yasar, K., S., Kahyaoglu, T. 2009. The functional, rheological and sensory characteristics of ice creams whit various fat replacers, *Dairy Technology,* 62,93-99.
- [9] Parvaneh, V. 2006. chemical quality control testing of foods. Third edition. Press Institute of Tehran University. 332 p.
- [10] Lee, F. Y., White, C. H. 1991. Effect of ultrafiltration retentates and whey protein concentrates on ice cream quality during storage. *DairyScience,* 74,1170–1180.
- [11] Laemmli, U. K. 1970. Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage T4. *Nature,* 227, 680e685.
- [12] Sharma, R., Lorenzen, P. C., & Qvist, K. B. 2001. In fluence of transglutaminase treatment of skim milk on the formation of e-(g-glutamyl)lysine and the susceptibility of individual proteins towards cross-linking. *International Dairy Journal,* 11 (10), 785-793.
- [13] Moon, J. H., Hong, Y. H., Huppertz, T., Fox, P. F., & Kelly, A . L. 2008. Properties of casein micelles cross-linked by transglutaminase. *International Journal of Dairy Technology,* 62, 27 -32.

The effect of microbial transglutaminase and protein-based fat replacers on the physical properties of low-fat ice cream

Faraji Kafshgari, S. ¹, Alami, M. ^{2*}, Khomeiri, M. ², Motamedzadegan, A. ³

1. MSc. in Food Science and Technology. Gorgan university of agricultural sciences and natural resources.
2. Associate professor. Department of Food Science and Technology. Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources.
3. Associate professor. Department of Food Science and Technology. Saari University of Agricultural Sciences and Natural Resources.

(Received: 93/1/24 Accepted: 93/5/10)

The present research work was aimed to evaluate the effects of whey protein concentrate (WPC) at different levels of 0, 2, and 4%, as a protein based fat replacer, soy protein isolate (SPI) (0, 1, and 2%) and microbial transglutaminase (MTG) (0, 1, and 2%) on some physical properties of a low fat vanilla ice cream (4% fat). Electrophoresis pattern of ice cream proteins and effect of MTG on proteins were analyzed by SDS-PAGE. Total solids of all formulations was adjusted on 34%. Results showed that application of WPC in formulation of low fat ice cream significantly increased hardness and melting values, while SPI significantly ($P<0.01$) increased hardness and reduced melting value. MTG decreased hardness and melting of ice cream samples compared to the control ($P<0.01$). Results showed that application of MTG in low fat ice cream was more useful than the utilization of SPI and WPC in terms of hardness and melting properties.

Keywords: Microbial transglutaminase, Soy protein isolate, Low fat ice cream, Protein-based fat replacer, Whey protein concentrate.

* Corresponding Author E-Mail Address: mehranalam@gmail.com