

# بررسی تأثیر نوع ماده اولیه، دما و نحوه فرآوری مغز تخمه آفتابگردان بر ویژگی‌های شیمیایی، حسی و ماندگاری مغز تخمه آفتابگردان بسته بندی شده

نفیسه دریائی<sup>1</sup>، افسین جعفر پور<sup>\*2</sup>، ثمر منصوری پور<sup>2</sup>

1- دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشکده داروسازی و علوم دارویی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2- استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده پرایپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمیار، سمنان، ایران.

3- استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده داروسازی و علوم دارویی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

(تاریخ دریافت: 26/12/97 تاریخ پذیرش: 24/09/98)

## چکیده

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر نحوه فرآیند و شرایط دمایی آن بر ویژگی‌های شیمیایی و حسی مغز تخمه آفتابگردان می‌باشد. برای این منظور دو نوع از واریته آجیلی مغز تخمه آفتابگردان تهیه شده از دو بازار مختلف (A و B) با دو روش (سرخ کردن و برشته کردن) با دمای 150، 165، 180، 195 و 210 درجه سلسیوس مورد تیمار قرار گرفت. پس از روغن کشی از نمونه‌ها، اندیس‌های پراکسید، یدی، صابونی، آبیزیدین و توتونکس و عدد اسیدی و همچنین ارزیابی حسی نیز بررسی شد. با توجه به نتایج حاصل شده، بالفزایش‌دمامیزانپراکسیدو عدد اسیدی، صابونی، آبیزیدین و توتونکس افزایش یافت. ریز اساس داده‌ها بیشترین مقدار پراکسید و اسیدهای چرب غیر اشباع‌بهتر ترتیب در نمونه‌های B برشته شده و نمونه‌های A سرخ شده مشاهده شد. بالاترین اندیس اسیدی و صابونی نیز در نمونه B برشته شده در دمای 210 درجه وجود داشت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اندیس آبیزیدین و توتونکس بالاترین مقدار را در نمونه‌های B برشته شده نشان داد. نمونه‌های سرخ شده در دمای 165 درجه از نظر ظاهر، تردی بافت و طعم و پذیرش کلی دارای امتیاز بالاتری در میان ارزیاب‌ها بودند. بر اساس نتایج مغز تخمه نوع A برای تولید و نگهداری طولانی مدت از نوع B مناسب‌تر می‌باشد که از نظر ویژگی‌های شیمیایی در پایین‌ترین سطح اکسیداسیون و فساد شیمیایی قرار گرفت. همچنین با در نظر گرفتن ارزیابی حسی نمونه‌ها و ویژگی‌های شیمیایی، نمونه‌های سرخ شده نسبت به نمونه‌های برشته شده کیفیت بهتری داشتند. در نهایت نمونه مغز تخمه نوع A سرخ شده در دمای 165 درجه سلسیوس به عنوان بهترین تیمار معرفی شد.

**کلید واژگان:** مغز تخمه‌ای آفتابگردان، ماندگاری، سرخ کردن، برشته کردن

استفاده از هوای گرم و بدون استفاده از روغن یا آب به عنوان یک حامل (انتقال دهندهٔ حرارت و گرما) انجام می‌شود. برشه کردن یکی از مراحل اصلی برای فرآوری آجیل می‌باشد. عطر و طعم، رنگ، بافت و ظاهر آجیل به طور قابل توجهی با فرآیند برشه کردن افزایش پیدا می‌کند. این تغییرات عمده‌ای مربوط به تغییرات در اثر میلارد است و تعداد زیادی از اجزای فرار در این زمینه شناسایی شده است [5]. مغز تخمه آفتابگردان برشه شده و سرخ شده دارای محتوی چربی بالایی هستند. که در این محصولات اثر منفی اکسیژن و نور نسبت به محصولات این چنینی، قوی‌تر است. موادی که برای بسته‌بندی انتخاب می‌شوند باید در برابر این عوامل بهترین ممانعت‌کنندگی را داشته باشند [6-8]. انواع مختلفی از بسته‌بندی‌های پلی‌پروپیلن (جهت‌دار، دو طرفه مانند ورق‌های پلی‌پروپیلن تک لایه یا دو لایه) برای بسته‌بندی این قبیل محصولات استفاده می‌شوند. استفاده از ورق‌های دولایه مانند پلی‌استر/پلی‌ایتیلن (PET/PE) بسیار رایج می‌باشد [8]. Xiaolei Shi و همکاران (2017) تحقیقاتی که بر روی بررسی ویژگی‌های بادام زمینی پس از فرآیند برشه کردن به صورت خشک، با روغن و سرخ کردن انجام داده‌اند، دریافتند که مناسب‌ترین فرآورده تولید شده برای مصرف عموم، محصولات فرآوری شده به دو روش برشه کردن بوده است و برشه کردن به روش خشک کمترین آسیب ظاهری را به نمونه‌ها وارد کرده است [10]. Silvia Marzocchi و همکاران (2017) مطالعه‌ای بر روی بررسی اثر شرایط متفاوت برشه کردن بر روی ویژگی‌های فیزیکو‌شیمیایی فندق (با پوست) انجام داده و این پژوهش با بررسی دو پارامتر زمان و دما که موثرین پارامترها بر روی کیفیت محصول هستند انجام شده است. این محقق بیان کرده است که همیشه فرآیندهایی با دمای پایین و مدت زمان کوتاه، مناسب‌ترین راه برای رسیدن به بهترین محصول نبوده زیرا به محتوی توکوفرول، ترکیبات فنولی و ترکیبات معطر آسیب وارد می‌شود [11]. در مطالعهٔ دیگری که توسط Schlormann و همکاران (2015) بر روی اثر شرایط مختلف برشه کردن بر روی ترکیبات سودمند در آجیل‌های متفاوت (گردو، بادام، پسته و فندق) انجام شده به طور کلی نتیجه‌گیری شده است که دماهای میانه مورد استفاده ممکن است اثر مثبتی بر حفظ تعادل بین ترکیبات سودمند و سلامتی بخش و ترکیبات

## 1- مقدمه

آفتابگردان با نام علمی (*Helianthus annuus*) گیاهی است یکساله و دارای ساقه راست، خشن و به ارتفاع 2 متر که پیوسته در بخش‌های پهناوری از کشورهای مختلف کشت می‌شود. این گیاه یکی از مهم‌ترین محصولات روغنی در جهان می‌باشد. تخمه آفتابگردان سرشار از فسفر، منگنز، روی، پتاسیم و اسیدهای چرب اشباع نشده و امگا 6 (اسید لینولئیک) می‌باشد. براساس آخرین آمار به دست آمده در سال 2016 اوکراین با تولید 13 میلیون و 626 هزار تن در رتبه اول، روسیه و آرژانتین به ترتیب با میزان تولید 11 و 3 میلیون تن در مقام دوم و سوم قرار گرفته‌اند. ایران با میزان تولید نزدیک به 40 هزار تن در مقام 35 دنیا قرار گرفته است [1]. آفتابگردان نقش بسیار مهمی در تولید روغن جهان دارد که حدود 12 درصد روغن دنیا را تأمین می‌کند. مغز پس از استخراج روغن شامل 40 درصد پروتئین می‌باشد. براساس درصد روغن و نوع مصرف دانه، بذر آفتابگردان به دو نوع روغنی<sup>3</sup> و نوع غیرروغنی (آجیلی)<sup>4</sup> تقسیم می‌شود. نوع روغنی به لحاظ برخورداری از 45-50 درصد روغن جهت تهیه روغن مورد استفاده قرار می‌گیرد و مناسب تغذیه مستقیم نیست در حالیکه نوع آجیلی از درصد روغن کمتری برخوردار است [2]. یکی از متدائل‌ترین روش‌ها برای فرآوری محصولات به این صورت است که ابتدا دانه‌ها پوست‌گیری شده و در مرحله‌ی بعدی سورت و درجه‌بندی می‌شوند در ادامه‌ی این روند نمک‌سود شده و خشک می‌شوند و برشه شده و بعد خنک و بسته‌بندی می‌شوند [3]. سرخ کردن<sup>5</sup> عملی است که عمدتاً برای تغییر کیفیت غذا با حرارت دادن آن در دمای بالا در روغن بکار گرفته می‌شود. غذاهای سرخ شده دارای رنگ طلایی، بافتی ترد، حس دهانی شفاف و عطر و طعم غذاهای سرخ شده هستند. یک موضوع مهم در سرخ کردن اثر حفاظتی آن است که منجر به تخریب حرارتی میکرووارگانیسم‌ها، غیرفعال شدن آنزیم‌ها و کاهش فعالیت آبی به علت کم شدن آب در سطح غذا می‌شود [4]. برشه کردن<sup>6</sup> به روشن خشک با حرارت دادن مواد غذایی با

3. Oily seed

4. Nut seed

5. Frying

6. Roasting

## 2-2-2- استخراج روغن

حدود 100 گرم از نمونه همگن شده را برداشته و مقداری هگزان به آن افزوده به طوری که کاملاً روی آن را پوشاند. آن را به خوبی مخلوط کرده، مدتی ساکن مانده تا فاز حلال شفاف شود. فاز شفاف شده را با کاغذ صافی، صاف کرده سپس با استفاده از دستگاه روتاری حلال را تبخیر کرده تا حلال کاملاً تبخیر شود. سپس روغن (چربی) باقیمانده برای آزمون‌های مختلف مورد استفاده قرار داده شد.

## 2-3- آزمون‌های فیزیکوشیمیایی

آزمون‌های تعیین عدد پراکسید (طبق استاندارد ملی ایران به شماره 4179 [13]، تعیین ان迪س اسیدی (استاندارد ملی ایران به شماره 4178 [14]، تعیین عدد یدی (استاندارد ملی ایران به شماره 4888 [15]، تعیین عدد صابونی (استاندارد ملی ایران به شماره 10501) [16] و تعیین عدد آنیزیدین (استاندارد ملی ایران به شماره 4093 [17] در سه تکرار انجام شد.

## 2-4- آزمون حسی

برای ارزیابی ویژگی‌های حسی از ارزیابان حسی و روش 5 امتیازی استفاده شد و فاکتورهای رویت ظاهری، طعم، بافت و مطابویت کلی بررسی شد. امتیازدهی به نمونه‌ها با انتخاب یکی از گزینه‌های خیلی بدم آمد، بدم آمد، برايم بی تفاوت است، خوش آمد و خیلی خوش آمد توسط داوران که به ترتیب از 1 تا 5 امتیاز داده شده بود.

## 2-5- تجزیه و تحلیل آماری

تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار SPSS در سطح احتمال خطای 1 % انجام شد. مقایسه میانگین‌ها با استفاده از آزمون LSD انجام شد. نمودارها با استفاده از نرم افزار Excel.2016 رسم شده است.

## 3- نتایج و بحث

### 1- آزمون‌های فیزیکوشیمیایی

#### 1-1- نتایج نمونه‌ها قبل از فرآوری

نتایج مندرج در جدول 1 در خصوص نمونه‌های خام A و B نشان دهنده آن است که میزان ان迪س پراکسید و ان迪س اسیدی

مضر و موثر که بر روی خواص حسی نیز موثراند، داشته باشد [12]. از آنجایی که مغز تخمه‌آفتابگردان برشته شده یا سرخ شده ماندگاری کوتاه زیر دو ماه دارد این امر موجب می‌شود در قیمت‌گذاری و فرآیند فروش مسائل اقتصادی به وجود آید. البته استفاده از آنتی‌اکسیدان‌های مصنوعی غیر مجاز بوده و با مخاطراتی تؤمن است. در این تحقیق سعی شده تا با بهره‌گیری از تأثیر نوع ماده اولیه، دما و همچنین نحوه فرآوری مغز تخمه‌آفتابگردان مدت زمان ماندگاری را افزایش داد. اهداف علمی پژوهش شامل بررسی اثر نگهداری و وضعیت فرآوری دانه‌هادر شرایط مختلف بر ویژگی‌های کیفی نمونه‌ها، مقایسه‌ی بین شیوه‌های فرآوری مغز تخمه‌آفتابگردان (سرخ کردن و برشته کردن) و مناسب ترین روش فرآوری و شرایط دمایی مغز تخمه‌ی آفتابگردان می‌باشد.

## 2- مواد و روش‌ها

### 1- مواد

مغز تخمه‌آفتابگردان وارداتی واریته آجیلی پوست‌گیری شده از کشور چین، سود مصرفی از شرکت مجللی، ایزواکتان، اسیداستیک، هگزان، پتاس، فنول فتالین، تیوسولفات سدیم، اتانول، یدید پتاسیم و اسید کلریدریک از شرکت مرک آلمان تهیه شدند.

### 2- روش‌ها

#### 1- تهیه نمونه‌ها

در ابتدا نمونه‌های تخمه‌آفتابگردان واریته آجیلی پوست‌گیری شده را تهیه کرده به‌این صورت که در این پژوهش از دو نوع مغز تخمه موجود در بازار، با نام تجاری A و B کد گذاری شده و حدود 100 گرم از هر نمونه را برداشته به طور مجزا طبق 5 دمای متفاوت شامل دمای‌های 150، 165، 180، 195 و 210 درجه سلسیوس عملیات برشته کردن و سرخ کردن بر روی هر کدام از نمونه‌ها اعمال شد. تیمارها شامل 5 نمونه سرخ شده A، 5 نمونه برشته شده A، 5 نمونه سرخ شده B و 5 نمونه برشته شده B می‌باشد. در آخر از آن‌ها نمونه گیری کرده و عملیات روغن کشی بر روی هریک انجام شد.

نمونه B، در حالت برشته شدن و درجه حرارت 210 درجه سلسیوس می باشد.

با توجه به این کهاسیداسیون چربی ها یکی از علل فساد مواد غذایی بوده و ماده حاصله‌ی پراکسید که توسط عدد پراکسید سنجش می شود، در ایجاد بدطعمی در مواد غذایی نقش حائز اهمیتی دارد. مقدار پراکسید موجود بر حسب میلی اکی والان گرم اکسیژن فعال در هر کیلو گرم روغن بیان می شود و هدف از این آزمون ارزیابی میزان فساد اکسیداتیو و شاخصی برای تعیین میزان کیفیت محصول می باشد. یکی از دلایل افزایش پراکسید در نمونه های برشته شده در معرض هوا گرفتن آن می باشد. در نمونه های سرخ شده این فضای موجود را روغن احاطه کرده و از اکسیداسیون جلوگیری می کند. مشابه همین نتایج را McDanial گزارش کردند و بیان نمودند که با افزایش دما به طور پیوسته پراکسید بادام زمینی افزایش پیدا کرده همچنین با افزایش زمان ماندگاری این مقدار بالاتر رفته است و خاطر نشان کرده است که میزان پراکسید در نمونه های سرخ شده بعد از نگهداری به مدت 12 هفته کاهش می پابد. این موضوع می تواند به دلیل تبدیل شدن ترکیبات اولیه تولید شده در طی اکسیداسیون به ترکیباتی دیگر و تغییر در میزان اندیس پراکسید می باشد. در حالی که این مقدار در نمونه های برشته شده در طی کل مدت نگهداری روندی افزایشی داشته است [18-20].


در نمونه B بیشتر از نمونه A بوده و نوع ماده ای خام اولیه بر روی کیفیت محصول پس از فرآوری تاثیرگذار می باشد.

**Table 1** Chemical properties of A and B raw Sunflower kernel

Type of Sample	A	B
Peroxide Value	1.6	2.06
Iodine Value	119.45	117.50
Saponification Value	192.97	193.52
Acid Value	0.49	1.38
Anisidine value	0	0

### -2-1-3- اندیس پراکسید

میانگین میزان پراکسید تیمارهای مورد بررسی، در فرآوری ها و درجه حرارت های مختلف در شکل 1 نشان داده شده است. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که با افزایش درجه حرارت از 150 تا 210 درجه سلسیوس، میزان پراکسید نمونه ها به طور معناداری افزایش یافته است ( $P<0.01$ ). نتایج مقایسه میانگین نوع نمونه و درجه حرارت های مختلف نشان داد که در هر دو نوع نمونه آفتتابگردان، با افزایش درجه حرارت، میزان پراکسید بطور معناداری افزایش پیدا کرده است ( $P<0.01$ ). همچنین بیشترین میزان پراکسید در نمونه نوع B و درجه حرارت 210 درجه سلسیوس حاصل شد. مقایسه میانگین انواع مختلف نمونه، فرآوری و درجه حرارت نشان داد که بالاترین میزان پراکسید در



**Fig 1** Peroxide value mean of Sunflower seed oil at Different Processes and Temperatures.  
Values with similar superscript letters represent no significant difference ( $p>0.01$ )


### -3-1-3- عدد یדי

بالا بودن تعداد پیوندهای دوگانه در یک ماده می باشد، و هرچه این اندیس بالاتر برود احتمال اکسیداسیون نیز افزایش پیدا

عدد یדי مقیاسی از تعداد پیوندهای غیر اشباع در اسیدهای چرب می باشد. هرچه میزان این اندیس بالاتر باشد، نشان دهنده

نمونه‌های بر شته شده می‌باشد [22,21]. به هنگام بر شته شدن نمونه B روند تغییرات در ان迪س یدی به این صورت بوده است که با افزایش درجه حرارت از 150 تا 195 درجه سلسیوس، میزان عدد یدی نمونه‌ها بطور معناداری افزایش یافت ( $P<0.01$ ) در حالی که با افزایش درجه حرارت از 195 تا 210 درجه سلسیوس، میزان عدد یدی به طور معنادار کاهش یافت ( $P<0.01$ ). این نتایج با داده‌های به دست آمده Maria giuffre و همکاران مطابقت داشته و خاطر نشان کرده‌اند که کاهش ان迪س یدی در دماهای بالا می‌تواند به دلیل شکل‌گیری ترکیبات فرار و تشکیل ترکیبات پلیمری از اسیدهای چرب دوگانه باشد. همچنین بیان کرده‌اند که افزایش ان迪س یدی با دانسته رابطه مستقیم داشته و با افزایش تا یک بازه ثابت هر دو افزایش پیدا می‌کند [23].

می‌کند. میانگین میزان عدد یدی تیمارهای مورد بررسی، در فرآوری‌ها و درجه حرارت‌های مختلف در شکل 2 نشان داده است. در نمونه بر شته شده با نام تجاری A با افزایش درجه حرارت، عدد یدی کاهش یافته است که بیانگر تجزیه باندهای دوگانه و کاهش میزان غیر اشباعیت است. همانطور که در شکل 2 نشان داده شده است کاهش عدد یدی در فرآیند سرخ کردن نسبت به فرآیند بر شته کردن کمتر تحت تأثیر قرار گرفته است زیرا در طی سرخ کردن و ترکیب روغن‌ها می‌تواند باعث بهبود پایداری دانه‌های روغنی در برابر اکسیداسیون شود. که این موضوع با با پژوهش Abd-elal و همکاران مطابقت دارد. از سوی دیگر در فرآیند سرخ کردن شده به دلیل پخته شدن یکنواخت و عدم حرارت اضافی نسبت به نمونه‌های بر شته شده، این ان迪س بالاتر بوده که نشان دهنده حرارت دیدن زیاد



**Fig 2** Iodine value mean of Sunflower seed oil at Different Processes and Temperatures.  
Values with similar superscript letters represent no significant difference ( $p>0.01$ )


نتایج مقایسه میانگین نشان داد که با افزایش درجه حرارت از 150 تا 195 درجه سلسیوس، تغییر معناداری در عدد صابونی مشاهده نشده است ( $P>0.01$ ). همچنین این نتایج حاکی از آن بود که بیشترین میزان عدد صابونی در نمونه A در حالت بر شته شدن و در نمونه B در دو حالت سرخ و بر شته شده حاصل شد. نتایج همچنین نشان داد که بالاترین عدد صابونی در حالت بر شته شدن و درجه حرارت 210 درجه سلسیوس حاصل شد. مقایسه میانگین انواع مختلف نمونه، فرآوری و درجه حرارت نشان داد که بالاترین میزان عدد صابونی در نمونه A و B. در حالت بر شته شدن و درجه حرارت 210 درجه سلسیوس حاصل شد. این داده‌های گردآوری شده با نتایج به دست آمده Fozia Anjam و همکاران که بر روی تأثیر فرآیند بر شته کردن بر

#### 4-1-3 - ان迪س صابونی

میانگین میزان ان迪س صابونی تیمارهای مورد بررسی، در فرآوری‌ها و درجه حرارت‌های مختلف در شکل 3 نشان داده است. طبق تعریف عدد صابونی عبارت است از مقدار پتانسیم هیدروکسید لازم بر حسب میلی‌گرم که جهت صابونی اسیدهای چرب حاصل از هیدرولیز یک گرم چربی لازم است. در واقع این ان迪س مقیاسی برای بازگو کردن میانگین وزن مولکولی اسیدهای چربی است که در ساختمان چربی به کار رفته‌اند. هر چه مقدار پتاس مصرفی بیشتر باشد پس به همان مقدار تعداد مولکول‌ها در هر گرم بیشتر بوده و در نتیجه بزرگی مولکول‌ها به طور متوسط به همان نسبت کوچکتر است [24].

که با افزایش زمان نگهداری از 2 تا 5 دقیقه اندیس صابونی کاهش پیدا کرده و در برشته کردن به روش معمولی و در مدت 15 دقیقه این مقدار افزایش پیدا کرده که با نتایج به دست آمده در این تحقیق هم راستا می باشد [25].

ساخترافیزیکوشیمیابی روغن دانه آفتابگردان تحقیقاتی انجام داده هم راستا بوده است. همچنان این محقق خاطر نشان کرده است که با طولانی تر کردن فرآیند برشته کردن این اندیس بزرگتر خواهد شد [24]. در تحقیقی دیگر Megahed و همکاران که بر روی برشته کردن بادام زمینی توسط امواج میکروویو نشان داده اند




**Fig 3** Saponification Value mean of Sunflower seed oil at Different Processes and Temperatures.  
Values with similar superscript letters represent no significant difference ( $p>0.01$ )

### 5-1-3-اندیس اسیدی

کردن اسیدهای چرب آزاد موجود در یک گرم ماده، نتایج این تحقیق با داده های به دست آمده توسط Maria Giuffre و همکاران هم راستا بوده و همان طور که بیان شده با افزایش دما و همچنان مدت زمان نگهداری در آن دما این مقدار افزایش پیدا کرده است و طبق نتایج به دست آمده این محقق تأثیر زمان تیمار از دما بیشتر بوده است [23]. همین طور Fozia Anjum در بررسی اثر برشته کردن بر روی بادام زمینی به این نتیجه دست یافته است که با افزایش دما مقدار اسیدیته نمونه ها به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده است [24].

همان طور که در شکل 4 مشاهده می شود نتایج مقایسه میانگین نشان داد که در هر دو نوع نمونه آفتابگردان، با افزایش درجه حرارت، اندیس اسیدی به طور معناداری افزایش یافت (P<0.01). همچنان بیشترین میزان در نمونه نوع B و درجه حرارت 210 درجه سلسیوس حاصل شد. مقایسه میانگین انواع مختلف نمونه، فرآوری و درجه حرارت نشان داد که بالاترین میزان اندیس اسیدی در نمونه B، در حالت برشته شدن و درجه حرارت های 195 و 210 درجه سلسیوس حاصل شد. اندیس اسیدی عبارت است از میلی گرم پتاں لازم برای خشی




**Fig 4** Acid number mean of Sunflower seed oil at Different Processes and Temperatures.  
Values with similar superscript letters represent no significant difference ( $p>0.01$ )

### اثر مثبت داشته‌اند [22].

تست آنیزیدین در واقع آزمونی جهت بررسی سطوح آلدئیدها و کتون‌های موجود در مواد چرب است که بر اساس واکنش پذیری گروه کربونیل و آلدئید با گروه‌های آمینی می‌باشد. مقدار این آندیس تا هنگامی در روغن یا ماده خوراکی کمتر از 10 باشد، آن ماده قابل قبول و قابل مصرف است. این تست در واقع مکمل تست پراکسید بوده که پراکسید مقدار محصولات اولیه تولید شده از اتوکسیداسیون شامل هیدروپراکسیدها یا وضعیت حال حاضر ماده غذایی را نشان می‌دهد، در حالیکه آنیزیدین نشان دهنده‌ی پیشرفت اکسیداسیون و محصولات تولید شده‌ای از قبیل آلدئید و کتون‌ها می‌باشد که جزء محصول ثانویه اکسیداسیون بوده و گذشته روغن را نشان می‌دهند [22].

### 6-1-3- آندیس آنیزیدین

همان‌طورکه در شکل 5 مشاهده می‌شود نتایج مقایسه میانگین نشان داد که در هر دو نوع نمونه آفتابگردان، با افزایش درجه حرارت، میزان آنیزیدین بطور معناداری افزایش یافت ( $P<0.01$ ). مقایسه میانگین انواع مختلف نمونه، فرآوری و درجه حرارت نشان داد که بالاترین میزان آنیزیدین در نمونه B، در حالت برشه شدن و درجه حرارت 210 درجه سلسیوس حاصل شد. نمونه‌ی این نتایج را Marco Capocasale و همکاران در آزمایش خود بیان کرده‌اند که با افزایش دما در فرآیند برشه کردن میزان آنیزیدین افزایش یافته و افزایش دما در بازه‌ی دمای 120 تا 180 درجه سلسیوس این مقدار را 108 برابر افزایش داده است. و هر دو پارامتر دما و زمان بر روی این مولفه



**Fig 5** Anisidine value mean of Sunflower seed oil at Different Processes and Temperatures.

Values with similar superscript letters represent no significant difference ( $p>0.01$ )


حرارت 210 درجه سلسیوس حاصل شد. مشابه این نتایج در تحقیقات Mariod و همکاران به چشم می‌خورد که با افزایش دما از 210 تا 240 درجه سلسیوس به طور چشم‌گیری آندیس توتوکس روغن افزایش پیدا کرده و همین طور خاطر نشان کرده است که در این مورد تاثیر دما مورد استفاده در آزمون از زمان تیمار تاثیرگذار تر بوده است. در این تحقیق انجام شده نمونه‌های سرخ شده از نظر کیفیت اکسیداتیو از مطلوبیت بالاتری برخوردار

### 7-1-3- آندیس توتوکس

همان‌طورکه در شکل 6 مشاهده می‌شود نتایج مقایسه میانگین نوع نمونه و درجه حرارت‌های مختلف نشان داد که در هر دو نوع نمونه آفتابگردان، با افزایش درجه حرارت، میزان توتوکس بطور معناداری افزایش یافت ( $P<0.01$ ). مقایسه میانگین انواع مختلف نمونه، فرآوری و درجه حرارت نشان داد که بالاترین میزان توتوکس در نمونه B، در حالت برشه شدن و درجه

و برابر با 8 حاصل شده است. در بازه دمایی ذکر شده به خصوص دمای 180 تا 210 درجه سلسیوس اندیس توتوكس در نتیجه افزایش اندیس آنزیبدین افزایش پیدا کرده است، زیرا درجه حرارت بالای مورد استفاده در این آزمایش باعث تجزیه خود به خودی هیدروپراکسیدها به ترکیبات فرار و کاهش اندیس پراکسید می شود.

بوده و کیفیت بالاتری دارند[26]. اندیس توتوكس فرآوردهای اولیه و ثانویه ناشی از اکسیداسیون را نشان می دهد و در مورد گذشته و حالت فعلی روغن اطلاعات می دهد. هرچه مقدار این اندیس پایین تر باشد نمونه ما از کیفیت بالاتری برخوردار خواهد بود[26]. نتایج به دست آمده از بررسی نمونه ها نشان می دهد که میزان اندیس توتوكس در نمونه های برشته شده به طور معناداری از نمونه های سرخ شده بیشتر بوده و بیشترین مقدار در نمونه B



**Fig 6** Totox value mean of Sunflower seed oil at Different Processes and Temperatures.

Values with similar superscript letters represent no significant difference ( $p>0.01$ )

### 2-3- نتایج آزمون حسی

#### 1-2-3- نتایج حاصل از ارزیابی طعم، تردی و مطلوبیت کلی نمونه های تیمار شده

نتایج بدست آمده از ارزیابی طعم، تردی و مطلوبیت کلی نمونه های تیمار شده نمونه های تخمه آفتتابگردان تیمار شده در دماهای مختلف در جدول 2 نشان شده است.

نتایج آزمون نشان داده است که بین نمونه های مختلف از نظر رویت ظاهری و طعم اختلاف معنی دار وجود داشته ( $P<0.01$ ). و بالاترین رویت ظاهری و طعم را مربوط به نمونه سرخ شده در دمای 165 درجه سلسیوس بوده است. سرخ کردن تغییراتی را در خواص فیزیکوشیمیایی اجزای اصلی ماده غذایی

(پروتئین، چربی و کربوهیدرات ها) به وجود می آورد که از آن جمله می توان به ژلاتینه و دهیدراته شدن نشاسته، دناتوره شدن پروتئین و تغییر در ساختار پروتئین، ایجاد واکنش های میلارد و کمک به بهبود رنگ و طعم غذاهای فرآوری شده، جذب روغن و کاهش هوای بین ذرهای که به جلوگیری از اکسیداسیون ماده غذایی در طول نگهداری کمک بسزایی می کند، اشاره کرد. هم چنین نتیجه به دست آمده از تحقیق Perren و همکاران نشان داده است که تغییرات رنگ و تردی محصول به طور قابل ملاحظه ای تحت تاثیر زمان و دمای فرآیند قرار می گیرد که در راستای پژوهش حاضر می باشد[27].

**Table 2** Sensory Properties of Sunflower seedSample at Different Processes and Temperatures

overall Acceptance	Average rating			Temperature	Processing	Sample	
	crispiness	Taste	Appearance				
31.5 <sup>b</sup>	28.5 <sup>b</sup>	32.5 <sup>c</sup>	35.5 <sup>b</sup>	150	Frying	A	
49.5 <sup>a</sup>	48.5 <sup>a</sup>	50.5 <sup>a</sup>	51.5 <sup>a</sup>	165			
18.5 <sup>c</sup>	19.5 <sup>c</sup>	18.5 <sup>d</sup>	18.5 <sup>c</sup>	180			
6.5 <sup>d</sup>	7.5 <sup>d</sup>	6.5 <sup>e</sup>	6.5 <sup>d</sup>	195			
6.5 <sup>d</sup>	7.5 <sup>d</sup>	6.5 <sup>e</sup>	6.5 <sup>d</sup>	210			
18.5 <sup>c</sup>	15.5 <sup>c</sup>	18.5 <sup>d</sup>	18.5 <sup>c</sup>	150	Roasting	B	
31.5 <sup>b</sup>	32.5 <sup>b</sup>	32.5 <sup>c</sup>	29.5 <sup>b</sup>	165			
43.5 <sup>a</sup>	48.5 <sup>a</sup>	35.5 <sup>b</sup>	35.5 <sup>b</sup>	180			
49.5 <sup>a</sup>	48.5 <sup>a</sup>	50.5 <sup>a</sup>	51.5 <sup>a</sup>	195			
49.5 <sup>a</sup>	48.5 <sup>a</sup>	51.5 <sup>a</sup>	51.5 <sup>a</sup>	210			
31.5 <sup>b</sup>	28.5 <sup>b</sup>	32.5 <sup>c</sup>	35.5 <sup>b</sup>	150	Roasting	A	
49.5 <sup>a</sup>	48.5 <sup>a</sup>	50.5 <sup>a</sup>	51.5 <sup>a</sup>	165			
18.5 <sup>c</sup>	19.5 <sup>c</sup>	18.5 <sup>d</sup>	18.5 <sup>c</sup>	180			
6.5 <sup>d</sup>	7.5 <sup>d</sup>	6.5 <sup>e</sup>	6.5 <sup>d</sup>	195			
6.5 <sup>d</sup>	7.5 <sup>d</sup>	6.5 <sup>e</sup>	6.5 <sup>d</sup>	210			
18.5 <sup>c</sup>	15.5 <sup>c</sup>	18.5 <sup>d</sup>	18.5 <sup>c</sup>	150	Roasting	C	
31.5 <sup>b</sup>	32.5 <sup>b</sup>	32.5 <sup>c</sup>	29.5 <sup>b</sup>	165			
43.5 <sup>a</sup>	48.5 <sup>a</sup>	38.5 <sup>b</sup>	35.5 <sup>b</sup>	180			
49.5 <sup>a</sup>	48.5 <sup>a</sup>	50.5 <sup>a</sup>	51.5 <sup>a</sup>	195			
49.5 <sup>a</sup>	48.5 <sup>a</sup>	50.5 <sup>a</sup>	51.5 <sup>a</sup>	210			
57.464	58.141	57.474	58.625		Chi-Square Test		
0.000	0.000	0.000	0.000		Meaningful level		

Values with similar superscript letters represent no significant difference ( $p>0.01$ )

سرخ شده مشاهده شد. بالاترین ان迪س اسیدی و ان迪س صابونی نیز در نمونه B برشته شده در دمای 210 درجه سلسیوس وجود داشت. ان迪س آنیزیدین و توتوکس در نمونه های B برشته شده در بالاترین مقدار خود بود. نمونه های سرخ شده در دمای 165 درجه سلسیوس از نظر ظاهر، تردی بافت و طعم و پذیرش کلی مناسب تر بوده اند همچنین برای هر دو نمونه A و B در حالت برشته شدن دو درجه حرارت 195 و 210 درجه سلسیوس برترین رتبه ها را نیز داشتند. با توجه به تفسیر داده ها و نتایج به دست آمده از این پژوهش مغز دانه نوع A برای تولید و نگهداری برای طولانی مدت از نوع B مناسب تر می باشد که از نظر ویژگی های شیمیایی در پایین ترین سطح اکسیداسیون و فساد شیمیایی قرار گرفت. همچنین با در نظر گرفتن ارزیابی حسی نمونه ها و ویژگی های شیمیایی، نمونه های سرخ شده نسبت به نمونه های برشته شده کیفیت بهتری داشتند. در نهایت بهترین تیمار از لحاظ حسی و کیفیت شیمیایی مغز تخمه نوع سرخ شده

#### 4- نتیجه گیری نهايی

درجه حرارت بالا و زمان حرارت دهنی به صورت منفی و به طور پیش رونده ای همه خواص فیزیکی و شیمیایی روغن و دانه آفتابگردان را تحت تاثیر قرار می دهد، با این وجود مقدار پراکسید، ان迪س اسیدی، آنیزیدین و ان迪س توتوکس نمونه ها کمتر از حد مجاز بود. با توجه به نتایج به دست آمده مناسب ترین دما برای تیمار نمونه های برشته و سرخ شده زیر 180 درجه سلسیوس بوده و در این دما نمونه های تخمه آفتابگردان می توانند زمان بیشتری تحت تیمار قرار گرفته و کیفیت خود را حفظ کنند. این تحقیق نشان می دهد که زمان و درجه حرارت و همچنین نوع دانه مورد استفاده برای تیمار نمونه ها می تواند به شدت بر کیفیت نهایی آنها تاثیر بگذارد و همیشه درجه حرارت پایین و مدت زمان کوتاه تیمار مناسب ترین راه برای به دست آوردن بهترین محصول نمی باشد. بیشترین مقدار پراکسید در نمونه های B برشته شده و بیشترین میزان غیر اشباعیت در نمونه های A

- [9] Hanlon, J. F., Kelsey, R. J., & Forcinio, H. (1998). Handbook of package engineering
- [10] Shi, X., Davis, J. P., Xia, Z., Sandeep, K., Sanders, T. H., & Dean, L. O. (2017). Characterization of peanuts after dry roasting, oil roasting, and blister frying. *LWT-Food Science and Technology*, 75, 520-528.
- [11] Marzocchi, S., Pasini, F., Verardo, V., Ciemniewska-Żytkiewicz, H., Caboni, M. F., & Romani, S. (2017). Effects of different roasting conditions on physical-chemical properties of Polish hazelnuts (*Corylus avellana* L. var. *Kataloński*). *LWT-Food Science and Technology*, 77, 440-448.
- [12] Schlörmann, W., Birringer, M., Böhm, V., Löber, K., Jahreis, G., Lorkowski, S. Glei, M. (2015). Influence of roasting conditions on health-related compounds in different nuts. *Food Chemistry*, 180, 77-85.
- [13] Institute of Standards and Industrial Research of Iran. Animal and vegetable fats and oils Determination of proxide value-Iodometric (visual) endpoint determination ISIRI.no4093. 2nd.Revision, Karaj: ISIRI; 2018[in Persian].
- [14] Institute of Standards and Industrial Research of Iran. Animal and vegetable fats and oils Determination of acid value and acidity – Test method ISIRI. no 4178. 1st.Revision, Karaj: ISIRI; 2012[in Persian].
- [15] Institute of Standards and Industrial Research of Iran. Animal and vegetable fats and oils –Determination of iodine value – Test method ISIRI. no 4888. 2nd.Revision, Karaj: ISIRI; 2016 [in Persian].
- [16] Institute of Standards and Industrial Research of Iran. Animal and vegetable fats and oils-Determination of saponification value-Test Method ISIRI. no 10501. 1st.Revision, Karaj: ISIRI; 2014 [in Persian].
- [18] Shi, X., Davis, J. P., Xia, Z., Sandeep, K., Sanders, T. H., & Dean, L. O. (2017). Characterization of peanuts after dry roasting, oil roasting, and blister frying. *LWT-Food Science and Technology*, 75, 520-528.
- [20] Lin, J.-T., Liu, S.-C., Hu, C.-C., Shyu, Y.-S., Hsu, C.-Y., & Yang, D.-J. (2016). Effects of roasting temperature and duration on fatty acid composition, phenolic composition, Maillard reaction degree and antioxidant

در دمای 165 درجه سلسیوس بود. البته شایان ذکر است که برترین نسبت به سخکردن دارای مزیت‌های زیادی از قبیل عدم استفاده از روغن‌های سرخکردنی و پایین تر بودن کالری محصول می‌باشد. بنابراین در صورتی که بتوان مشکل اکسیداسیون را در فرآیند برترین از راههای مختلف مانند استفاده از پوشش و آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی کاهش داد، می‌توان محصولی مناسب‌تر از نظر تغذیه‌ای تولید نمود.

## 5- منابع

- [1] Gupta, R., & Das, S. (1997). Physical properties of sunflower seeds. *Journal of Agricultural Engineering Research*, 66(1), 1-8
- [2] Seiler, G., & Gulya, T. (2015). Sunflower: Overview.
- [3] Labuza, T. P., Tannenbaum, S., & Karel, M. (1970). Water content and stability of low-moisture & intermediate-moisture foods. *Food technology*.
- [4] Martínez-Yusta, A., & Guillén, M. D. (2014). Deep-frying. A study of the influence of the frying medium and the food nature, on the lipidic composition of the fried food, using <sup>1</sup>H nuclear magnetic resonance. *Food research international*, 62, 998-1007.
- [5] Hojjati, M., Calín - Sánchez, Á., Razavi, S. H., & Carbonell - Barrachina, Á. A. (2013). Effect of roasting on colour and volatile composition of pistachios (*Pistacia vera* L.). *International journal of food science & technology*, 48(2), 437-443.
- [6] Pajin, B., Lazic, V., Jovanovic, O., & Gvozdenovic, J. (2006). Shelf - life of a dragee product based on sunflower kernel depending on packaging materials used. *International journal of food science & technology*, 41(6), 717-721.
- [7] Escobar, B., Estevez, A. M., & Guiñez, M. A. (2000). Storage of cereal bars with mesquite cotyledon (*Prosopis chilensis* (Mol) Stuntz). *Archivos latinoamericanos de nutricion*.
- [8] Baiano, A., & Del Nobile, M. A. (2005). Shelf life extension of almond paste pastries. *Journal of Food Engineering*, 66(4), 487-495.

- [24] Anjum, F., Anwar, F., Jamil, A., & Iqbal, M. (2006). Microwave roasting effects on the physico - chemical composition and oxidative stability of sunflower seed oil. *Journal of the American Oil Chemists' Society*, 83(9), 777-784.
- [25] Megahed, M. (2009). Microwave roasting of peanuts: Effects on oil characteristics and composition. *Food/Nahrung*, 45(4), 255-257.
- [26] Mariod, A., Matthäus, B., Eichner, K., & Hussein, I. H. (2006). Frying quality and oxidative stability of two unconventional oils. *Journal of the American Oil Chemists' Society*, 83(6), 529-538.
- [27] Perren, R., & Escher, F. (2013). Impact of roasting on nut quality Improving the safety and quality of nuts (pp. 173-197): Elsevier.
- attribute of almond (*Prunus dulcis*) kernel. *Food Chemistry*, 190, 520-528.
- [21] Abd-elal, M. H. and Karara, H. A. (1986): Changes in corn oil during deep frying of foods, *J. Lebens mittel-wiss-u-technol.* 17 (4): 232-235.
- [23] Giuffrè, A. M., Capocasale, M., Zappia, C., & Poiana, M. (2017). Influence of High Temperature and Duration of Heating on the Sunflower Seed Oil Properties for Food Use. *Journal of oleo science*, 66(11), 1193-1205.
- [23] Lee, Y., Kim, I., Chang, J., Rhee, Y., Oh, H., & Park, H. (2004). Chemical composition and oxidative stability of safflower oil prepared with expeller from safflower seeds roasted at different temperatures. *Journal of food science*, 69(1), FCT33-FCT38.

## Investigating the Effect of Raw Material and Temperature and Method of Process of Sunflower kernel on the Chemical, Sensory Properties and Shelf-life of Packaged kernel Sunflower

Daryaie, N.<sup>1</sup>, Jafarpour, A.<sup>2\*</sup>, Mansouripour, S.<sup>3</sup>

1. MSc Graduated of Food Science and Technology, Faculty of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2. Assistant Prof, Dept. of Food Science and Technology, Faculty of Paramedical, Islamic Azad University Garmsar Branch , Semnan, Iran.
3. Assistant Prof, Dept. of Food Science and Technology, Faculty of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences,Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

(Received: 2019/03/17 Accepted:2019/12/15)

The aim of this study was to investigate the influence of different process and temperature on the chemical and sensory properties of sunflower seeds. For this reason, two types of nuts varieties of sunflower seeds from different markets (A and B) were treated with two methods ( frying and roasting) at 150, 165, 180, 195 and 210 degrees Celsius. peroxide, Iodine, saponification, anisidine,totox value,acid number and also sensory evaluation was investigate. The result showed by increasing temperature, the amount of peroxide, acidic number, saponification, anisidine and toxox value were rised. Based on the result, the highest peroxide value and unsaturated fatty acid was the roast sample B and fried sample A,respectively. The highest acidic number and saponificatioin was also found in rosted sample B at 210 °C. Results from analysis of anisidine and totox value showed highest amount in rosted sample B. Furthermore, appearance, tender texture and flavor of fried samples at temperature 165 °C had the highest approval rating among the test panlist. According to results of chemical properties due to lower level oxidation and chemical degradation sample A has the higher rate than sample B. Also in consideration of the sensory evaluation of samples and chemical properties, fried samples have better quality than roasted samples. Finally, fried sample A in 165 ° C was introduced as the best treatment.

**Key words:** Sunflower kernel, Shelf life, Frying, Roasting

---

\* Corresponding Author E-Mail Address: Afjapo@Gmail.com