

بهینه سازی ویژگی های فیزیکو شیمیایی و حسی فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان (*Oncorhynchus mykiss*) با استفاده از پوشش کیتوزان حاوی عصاره پوست سیب

امیرحسین ابراهیمی^۱، سید ابراهیم حسینی^{۲*}، ژاله خوشخو^۳

۱- کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

۲- دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

۳- دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

(تاریخ دریافت: ۹۷/۰۹/۱۲ تاریخ پذیرش: ۹۸/۰۳/۲۶)

چکیده

استفاده از افزودنی های طبیعی به عنوان ترکیبات ضد میکروبی (نظیر عصاره های گیاهی) و به کارگیری پوشش های خوراکی راه حلی مناسب جهت کنترل میکروارگانیسم های بیماری زا و افزایش مدت ماندگاری مواد غذایی فرآوری شده می باشد که می تواند باعث کاهش خطرات بهداشتی و ضررهای اقتصادی ناشی از رشد میکروب هایی با منشاء غذایی شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر پوشش کیتوزان همراه با عصاره پوست سیب بر کیفیت فیله ماهی قزل آلا بود به طوری که عصاره های آبی و الکلی 3% و 5% درصد به همراه محلول 2% کیتوزان با روش غوطه وری بر سطح نمونه ها قرار گرفت و بررسی تغییرات pH، TBA، TVN و آنتی اکسیدان به روش DPPH و ارزیابی حسی به روش هدونیک طی روزهای اول، سوم و ششم نگهداری مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی از میانگین، واریانس و انحراف استاندارد استفاده شد و همچنین در بخش آمار استنباطی از تحلیل واریانس و آزمون کروسکال والیس و آزمون فریدمن استفاده شد. همچنین در خصوص خواص pH اولیه فیله های ماهی قزل آلا رنگین کمان در این تحقیق در تمامی تیمارها تقریباً برابر 6.85 ± 0.02 بود. روند تغییرات pH طی 6 روز نگهداری فیله های قزل آلا به دست آمد. بالاترین میزان pH در روز سوم و در تیمار حاوی عصاره الکلی 3% درصد می باشد و کمترین میزان pH در روز ششم می باشد. میزان TBA فیله های ماهی قزل آلا رنگین کمان در این تحقیق در تمامی تیمارها تقریباً برابر 0.037 ± 0.002 بود. بهترین نتیجه در آزمایش فعالیت آنتی اکسیدان به روش DPPH برای تیمار حاوی عصاره آبی 3% پوست سیب در روز سوم حاصل شد و در اندازه گیری TVN نمونه حاوی محلول کیتوزان 2% در روز سوم بالاترین نتیجه به دست آمد.

کلید واژگان: ماهی قزل آلا، کیتوزان، عصاره پوست سیب قرمز

*مسئول مکاتبات: ebhoseini@yahoo.com

مواد فعال، مواد ضد میکروبی، آنتیاکسیدانها، مواد مغذی، طعم دهنده ها، آنزیم ها و رنگ ها در محصولات غذایی مختلف مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا تحقیقات قابل توجهی در توسعه و کاربرد بیopolymerهای استخراج شده از فراورده های طبیعی مختلف و یا ضایعات صنایع تولیدات غذایی انجام گرفته است و بیopolymerهایی از قبیل نشاسته، مشتقات سلولز، کیتین، کیتوzan، پروتئین ها (با منشاء حیوانی یا گیاهی) و چربی ها جهت تهیه فیلم ها و پوشش های نازک بر پوشاندن غذاهای تازه یا پرورسی شده به منظور افزایش مدت ماندگاری آن ها مورد استفاده قرار می گیرند. استفاده از پوشش های خوراکی که به عنوان تکنولوژی مدرن علاوه برداشتن فوایدی مانند قابلیت خوردن، ساختمان ظاهری زیبا، سازگاری با محیط، غیرسمی و ارزان بودن، مواد غذایی را از آسیب های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی حفظ می کند و مانند سدی در برابر تبادل گازها، رطوبت و میکرووار گانیسم ها عمل نموده و کیفیت و ماندگاری مواد غذایی را در فاصله تولید و رسیدن به دست مصرف کننده حفظ مینماید.[۲]

۱-۱- ماهی قزل آلای رنگین کمان

ماهی قزل آلای رنگین کمانی (*Oncorhynchus mykiss*) یکی از عمده ترین گونه های ماهی پرورشی در سراسر جهان است. آزاد ماهیان عمدتاً در آبهای سرد، زلال و سرشار از اکسیژن زندگی می کنند. از لحاظ ظاهری ماهی قزل آلای رنگین کمان دارای بدن کشیده ای است که دارای فلس های^۱ ریزی درسطح بدن می باشد. وجود یک بالچه چربی حد فاصل باله دمی و باله پشتی و همچنین قوس و قزح رنگین که در درون طرف بدن کشیده شده است از خصوصیات بارز این گونه می باشد. ماهی قزل آلای رنگین کمان در مقابل تغییرات درجه حرارت آب واکسیژن زیاد حساس نبوده و سازش خوبی با شرایط پرورش متراکم دارد همچنین در انتخاب غذا زیاد سختگیر نیست و از سرعت رشد مناسبی نیز برخوردار می باشد.[۳].

پوشش های خوراکی از پروتئین یا پلی ساکارید ساخته می شوند و به تنهایی و یا ترکیب با مواد بیولوژیکی یا غیربیولوژیکی (پلی ساکارید PVC، ژلاتین، پروتئین ها)، به عنوان یک آترناتیو معتبر هستند و برای افزایش ماندگاری ماهی به کار می روند[۴].

۱- مقدمه

امروزه با توجه به دیدگاه نامطلوب مصرف کنندگان در خصوص افزودنیهای شیمیایی و مضرات آنها در مواد غذایی، گرایش به سمت استفاده از افزودنیهای طبیعی است با این حال بهدلیل آزاد شدن این ترکیبات مانند عصاره ها به صورت کترول نشده در ماده غذایی و ایجاد بوها و طعم های تند و یا غیرفعال شدن قسمتی از این ترکیبات فعال به دلیل واکنش با مواد غذایی، عملکرد آنها کاهش می یابد بنا بر این میتوان با استفاده از پوششهای خوراکی حاوی ترکیبات ضد میکروبی که به صورت کنترل سبب آزادسازی این ترکیبات به داخل گوشت میشنوند و سبب حفظ غلاظتهای بالاتر ترکیبات ضد میکروبی در سطح گوشت میشود کارایی این روش را افزایش داد فیلمهای زیست تخریبپذیر و با قابلیت خوراکی مختلف با منشا پلی ساکارید، پروتئین و چربی برای افزایش زمان ماندگاری انواع مختلفی از مواد غذایی استفاده میشنوند. کیتوzan به عنوان یک بیopolymer غیر سمی و زیست تخریب پذیر که از کیتین موجود در پوسته خارجی سخت پوستان بهدلیل میآید در صنایع غذایی مورد مصرف میباشد. در مطالعات گذشته اثرات ضد باکتریایی، ضد سرطانی و کاهش دهنده کلسترول توسط کیتوzan گزارش شده است. خاصیت ضد باکتریایی کیتوzan مربوط به وجود بار مثبت مولکولهای آن و تیجه ی واکنش با ملکولهای با بار منفی غشای سلول باکتری میدانند با این حال کاهش خاصیت آنتیاکتریایی کیتوzan هنگام استفاده از آن به شکل پوشش و یا فیلم اشاره کرده اند. از آن جایی که فیله ماهی ها محصولاتی هستند که سریع فاسد می شوند، توسعه روش های نگهداری برای گسترش ماندگاری آنها، مطلوب خواهد بود. ماهی قزل آلای رنگین کمانی نیز در برابر فساد به شدت حساس است. قزل آلا یکی از مهمترین منابع با کیفیت از نظر تغذیه ای برای انسان هاست، اما، نسبت به فساد میکروبی و شیمیایی بسیار حساس است. گوشت خصوصاً گوشت ماهی ها و آبزیان مستعد فساد شیمیایی و میکروبی است[۱]. بنابراین استفاده از نگهدارنده هایی با خصوصیت آنتیاکسیدانی و ضد میکروبی ضروری می باشد. پوشش کیتوzan نوعی از بسته بندی فعال برای حفظ کیفیت و افزایش ماندگاری فیله ماهی قزل آلا را فراهم می کند. امروزه استفاده از پوشش های طبیعی مختلف به تنهایی و یا با عنوان حامل

پوشش‌های خوراکی لایه‌های از مواد خوراکی هستند که به وسیله غوطه‌وری، اسپری کردن، برس‌زنی به طور مستقیم در سطح غذا به کار برده می‌شود^[۶].

۳-۲- روش غوطه وری

یکی مرسوم ترین شیوه های پوشش دهنده روش غوطه وری است محصول بین ۵ تا ۳۰ ثانیه در محلول غوطه ور می‌شود و سپس خارج در معرض هوا یا خشک کن حلال اضافی تبخیر و لایه نازکی از پوشش اطراف محصول را فرا می‌گیرد. روش غوطه وری روش مناسبی برای تولید محصولاتی یکنواخت و با کیفیت بالا می‌باشد با این حال نیاز به کنترل دقیق و محیط پاکیزه نیاز دارد^[۷].

۳- آنالیز آماری

نتایج به صورت میانگین \pm انحراف استاندارد (SD) بیانمی شود. آنالیز آماری شامل متغیرهای مورد اندازه گیری برای گروه های شاهد و تیمار و مقایسه نتایج با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه (one-way ANOVA) در سطح معنی داری $P < 0.05$ در صورت توزیع نرمال داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۲۱ انجام شد. تفاوت های معنی دار آماری بین مقادیر میانگین ها (در مواردی که اثر کلی تیمارها معنی دار باشد) با آزمون تعقیبی چند دامنه ای دانکن تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل آماری ارزیابی حسی نیز از روش ناپارامتری کروسکال والیس برای مقایسه تیمارها در یک زمان مشخص نگهداری و از روش ناپارامتری فریدمن برای مقایسه یک تیمار در طی زمان نگهداری استفاده شد.

۴- روش انجام آزمایش ها

۴-۱- آزمایش فعالیت آنتی اکسیدان به روش

DPPH

یک میلی گرم در بالن ۱۰۰ ریخته و ۰،۲ میلی مول نمونه ها در اتانول قرار داده و ۵ گرم نمونه در بالن ۵۰ قرار داده شد. برای آماده سازی و خواندن اسپکتروفوتومتر از هر نمونه ۰/۳ میلی لیتر برداشته در لوله ی آزمایش ریخته و به آن ۰/۲ میلی لیتر اتانول و ۲/۵ سی سی DPPH اضافه شد تا به حجم ۳ میلی لیتر بر سرد سپس به مدت ۳۰ دقیقه در تاریکی قرار داده و جذب نمونه ها را در طول موج ۵۱۶ نانومتر خوانده شد. سپس از

۱-۲- تعریف کیتوزان

کیتوزان، پلی‌ساقارید کیتین که از (۴و۱) دی‌اکسی-β-D-گلوکان تشکیل شده و ۲ آمینو دی‌اکسی-β-D-گلوکان تشکیل شده از جنس کیتین است که توسط اداره دارو و غذا آمریکا (USFDA) (به عنوان افزودنی ایمن غذایی (GARS)، تایید شده است. علاوه بر آن کیتوزان به عنوان یک بیوپلیمر ایده‌آل برای تولید فیلم‌ها و پوشش‌های خوراکی فعال است که با توجه به ماهیت غیررسمی، سازگاری با محیط زیست، زیست تخریب‌پذیری و توانایی پوشش دهنده انتخاب شده است^[۵].

۲- مواد و روش ها

۲-۱- آماده سازی نمونه

ماهی قرلآلای رنگین‌کمان‌تازه بین ۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم، از بازار خریداری شد و به آزمایشگاه منتقل شد. بعد از تخلیه امعاء و احشاء و شستشو و پس از جدا کردن سر و استخوان، دو فیله از هر ماهی به دست آمد. نمونه‌های فیله به طور تصادفی در ۴ گروه تقسیم شدند و در آب مقطر (شاهد بدون پوشش) (تیمار یک) ۲ درصد محلول کیتوزان (شاهد ۲) و عصاره آبی و الکلی عصاره پوست سیب قرمز ۳ و ۵ درصد (تیمار ۲ و ۳). و عصاره آبی و الکلی عصاره پوست سیب قرمز (تیمار ۴ و ۵) و برای ۲۰ دقیقه قرار داده شدند، محلول پوشش نیز از ۰/۵٪ گالیسرول به عنوان پلاستی سایزر یا نرم کننده تشکیل شد. همه فیله‌ها در یک ظرف استریل شده قرار گرفتند تا پوشش‌های خوراکی واحد در دمای ۴ ذخیره شوند. آنالیزهای حسی و فیزیکوشیمیایی در وقفه های زمانی سه روزه (زمان های صفر، ۳، ۶) قرار گرفت و کیفیت کلی ماهی تعیین گردید. هر بار باسه تکرار و میانگین ها برای تخمین کیفیت کلی ماهی انجام شد.

شاهد: آب مقطر

تیمار ۱: کیتوزان ۲ درصد

تیمار ۲: عصاره آبی ۳ درصد

تیمار ۳: عصاره الکلی ۳ درصد

تیمار ۴: عصاره آبی ۵ درصد

تیمار ۵: عصاره الکلی ۵ درصد

۲-۲- روش های استفاده از پوشش های خوراکی

۷۶ گرم پوست خشک حاصل شد. پوست خشک حاصل شده به مدت ۱۸ ساعت در داخل آون قرار گرفت. برای به دست آوردن عصاره های آبی و الکلی در غاظت های سه درصد ۶ گرم پودر سیب را به حجم ۲۰۰ سی سی در داخل آب مقطر رساندیم و برای عصاره سه درصد الکلی ۶ گرم پودر سیب را به حجم ۲۰۰ سی سی در داخل اتانول خالص رساندیم. برای عصاره های آبی و الکلی پنج درصد، ۱۰ گرم از پودر سیب مورد نظر را به حجم ۲۰۰ سی سی در آب مقطر و اتانول خالص رساندیم. محلول به دست آمده به مدت دو هفته در حلال باقی ماند تا عصاره به طور کامل خارج شود. سیب قرمز به دلیل وجود رنگدانه هایی مانند فلاونوئید، آنتوسیانین و رنگدانه های آنتی اکسیدانی و ویتامین ها، انتخاب ما برای انجام آزمایشات مورد نظر بود.

۲ ارلن به حجم ۲۰۰ سی سی دارای عصاره های آبی ۳ و ۵ درصد و ۲ ارلن به حجم ۲۰۰ سی سی دارای عصاره های الکلی استریل به دست آمد. برای حصول نتایج دقیق از روش تندالیزاسیون برای پودر سیب مورد نظر استفاده گردید.

۴-۷- تهیه محلول کیتوزان ۲ درصد

۱۰ گرم کیتوزان به وسیله‌ی ترازوی الکتریکی توزین شد و سپس به داخل بالن ۵۰۰ رویخته و در اسید استیک یک درصد حل شد و مقدار ۰,۵ درصد گلیسرول به عنوان نرم کننده اضافه شد و روی هیتر قرار گرفت سپس مگنت در داخل محلول رویخته شد و کیتوزان مورد نظر به دست آمد. به مدت ۳۰ دقیقه محلول کیتوزان ثابت ماند تا محلول به دمای ثابت رسید و خنک شد.[۷]

۵- نتایج آزمایشات شیمیایی در طول دوره نگهداری

pH تغییرات pH فیله‌های ماهی قزل آلای رنگین کمان و تفاوت pH، طی زمان در تیمارهای مختلف نگهداری در جدول زیر آورده شده است. همانطور که در داده‌های جدول مشاهده می‌شود. میزان pH فیله ماهیان در کلیه تیمارها در زمان های صفر، سه و شش تفاوت معنی داری باهم نداشته و بین سایر تیمارها تا این زمان اختلاف معنی داری مشاهده نشد ($P < 0.05$).

فرمول مورد نظر درصد جذب به دست آمد[۸].

%جذب = جذب سمپل - جذب اتانول / جذب اتانول *

$$RSA(\%) = \frac{Abs_{control} - Abs_{sample}}{Abs_{control}} \times 100$$

۴-۲- اندازه گیری pH

اندازه گیری pH های تیمار ها به فاصله ۲ ساعت برای هر نمونه و در هر سه تکرار صورت گرفت[۸].

۴-۳- اندازه گیری TVN

۱۰ گرم از نمونه مورد نظر آماده شد با دقت ۰/۰۱ گرم توزین شد و به داخل بالن قرار داده شد به بالن مورد نظر ۲ گرم اکسید منیزیوم و حدود ۳۰۰ میلی لیتر آب و ۲,۵ میلی لیتر اسید بوریک و چند قطره معرف (متیل) اضافه شد سپس محلول مورد نظر را در داخل یک ارلن رویخته و در انتهای حرارت و تغطیر صورت گرفت و محتويات به جوش آمد. محلول در روش تیتر با اسید سولفوریک ۱٪ نرمال تیتر شد. نتیجه از فرمول مورد نظر حاصل شد. تمامی آزمایش ها با یک نتیجه اصلی و سه تکرار صورت گرفت.[۸].

۴-۴- روش اندازه گیری TBA

۲/۵ میلی گرم از نمونه در داخل بالن ۵۰ رویخته سپس تری کلرو استیک اسید ۱۰٪ به حجم رسانده شد و به مدت ۳۰ دقیقه مخلوط شد سپس از صافی رد شد و مقدار ۲ CC از آن در ۲ میلی لیتر آب روی هیتر به مدت ۴۵ دقیقه حل شد سپس در لوله‌ی آزمایش رویخته در انتهای جذب مورد نظر در طول موج ۵۳۳ نانومتر اندازه گیری شد. کلیه‌ی گراف های دستگاه اسپکتروفوتومتر در طول موج بین ۴۵۰-۵۵۰ نانومتر بود[۸].

۴-۵- روش ارزیابی حسی

ارزیابی حسی نمونه ها به روش هدونیک ۵ نقطه ایی صورت گرفت. ارزیاب ها از گروه سنی بین ۲۰ تا ۴۰ سال از هر دو جنس به تعداد ۳۰ نفر انتخاب شدند. روش تهیه نمونه ها به روش سرخ کردن می باشد. ارزیابی حسی : شامل رنگ- چافت- طعم- مزه هنگام جویدن- پذیرش کلی. در شرایط کاملاً یکسان برای هر یک از ویژگی حسی، عدد ۵ برای ویژگی بسیار مطلوب و ۱ بسیار غیر قابل قبول در نظر گرفته شد[۸].


۴-۶- روش عصاره گیری پوست سیب

از ۶ کیلوگرم سیب مورد نظر ۳۳ عدد سیب به دست آمده که

Table 1 Different treatments pH in trout fish fillet in preservation temperature $4 \pm 1^{\circ}\text{C}$

pH	1 st day	3 rd day	6 th day
control	0/04 ^a ±6/39	0/01 ^f ±6/45	0/01 ^c ±6/57
2% chitosan	0/04 ^b ±6/39	0/00 ^e ±6/46	0/05 ^f ±5/65
3% Aqueous extract	0/04 ^b ±6/39	0/00 ^d ±6/59	0/00 ^a ±6/35
3% alcoholic extract	0/04 ^b ±6/39	0/00 ^a ±6/90	0/00 ^b ±6/62
5% Aqueous extract	0/04 ^b ±6/39	0/00 ^b ±6/88	0/00 ^e ±6/07
5% alcoholic extract	0/04 ^b ±6/39	0/00 ^c ±6/83	0/00 ^a ±6/70

mean± standard deviation from average (frequency N=3)

* different letter indicates significant difference in a column ($p \geq 0.01$).**capital letters indicate significant difference in a row ($p \geq 0.01$).**Fig 1** examining trout fish samples pHDifferent letters indicate significant difference ($p \geq 0.01$).

TVN در فیله ماهی ها در کلیه تیمارها در زمان های صفر و سه و شش دارای تفاوت معنی دار می باشد ($P < 0.05$). چنان چه مشاهد می شود مقادیر TVN در روز سوم و در تیمار داری پوشش کیتوزان ۲ درصد به بیشترین میزان خود رسید.


۱-۵-تغییرات TVN

فیله های ماهی قزل آلای رنگین کمان و تفاوت TVN، طی زمان در تیمارهای مختلف نگهداری در جدول زیر آورده شده است. همانطور که در داده های جدول مشاهده می شود میزان

Table 2 TVN of different treatments in trout fish fillet in preservation temperature $4 \pm 1^{\circ}\text{C}$

TVN	1 st day	3 rd day	6 th day
control	17/77±0/02 ^a	20/35±0/05 ^b	12/25±0/05 ^c
2% chitosan	17/77±0/02 ^b	22/78±0/01 ^a	18/06±0/10 ^a
3% Aqueous extract	17/77±0/02 ^b	18/20±0/10 ^{cd}	18/64±0/01 ^a
3% alcoholic extract	17/77±0/02 ^b	17/92±0/01 ^d	14/90±0/00 ^b
5% Aqueous extract	17/77±0/02 ^b	17/92±0/01 ^d	14/97±0/00 ^b
5% alcoholic extract	17/77±0/02 ^b	18/36±0/49 ^c	13/40±0/00 ^b

mean ± standard deviation from average (frequency N=3)

* different letter indicates significant difference in a column ($p \geq 0.01$).**capital letters indicate significant difference in a row ($p \geq 0.01$).**Fig 2** examining TVN of trout fish samples
Different letters indicate significant difference ($p \geq 0.01$).

فیله های ماهی ها در کلیه تیمارها در زمان های صفر، سه و شش تفاوت معنی داری با هم داشت و بین سایر تیمارها در زمان های مختلف اختلاف معنی داری مشاهده شد.
 $(P < 0.05)$

۵-۲-تغییرات TBA

فیله های ماهی قزل آلا رنگین کمان و تفاوت TBA، طی زمان در تیمارهای مختلف نگهداری در جدول زیر آورده شده است. همانطور که در داده های جدول مشاهده می شود میزان

Table 3 TBA of different treatments in trout fish fillet in preservation temperature $4 \pm 1^\circ\text{C}$

TBA	1 st day	3 rd day	6 th day
control	$0/032 \pm 0/10^{\text{a}}$	$0/028 \pm 0/00^{\text{a}}$	$0/00 \pm 0/10^{\text{a}}$
2% chitosan	$0/032 \pm 0/10^{\text{b}}$	$0/037 \pm 0/00^{\text{d}}$	$0/00 \pm 0/00^{\text{a}}$
3% Aqueous extract	$0/032 \pm 0/10^{\text{b}}$	$0/069 \pm 0/00^{\text{a}}$	$0/00 \pm 0/00^{\text{a}}$
3% alcoholic extract	$0/032 \pm 0/10^{\text{b}}$	$0/050 \pm 0/00^{\text{c}}$	$0/00 \pm 0/00^{\text{a}}$
5% Aqueous extract	$0/032 \pm 0/10^{\text{b}}$	$0/020 \pm 0/00^{\text{f}}$	$0/00 \pm 0/00^{\text{a}}$
5% alcoholic extract	$0/032 \pm 0/10^{\text{b}}$	$0/062 \pm 0/00^{\text{b}}$	$0/00 \pm 0/00^{\text{a}}$

mean \pm standard deviation from average (frequency N=3)

* different letter indicates significant difference in a column ($p \geq 0.01$).

**capital letters indicate significant difference in a row ($p \geq 0.01$).




Fig 3 examining TBA of trout fish samples
Different letters indicate significant difference ($p \geq 0.01$).

تغییرات آنتی اکسیدان به روشن DPPH در کلیه تیمارها در زمان های صفر، سه و شش دارای تفاوت معنی دار می باشد($P < 0.05$) و بین سایر تیمارها تا این زمان اختلاف معنی داری مشاهده نشد.

فیله های ماهی قزل آلا رنگین کمان و تفاوت DPPH، طی زمان در تیمارهای مختلف نگهداری در جدول آورده شده است. همانطور که در داده های جدول مشاهده می شود میزان

۵-۳-تغییرات DPPH

Table 4 antioxidant measurement of different treatments in trout fish fillet in preservation temperature $4 \pm 1^\circ\text{C}$ using DPPH method

TBA	1 st day	3 rd day	6 th day
control	$17.40 \pm 0.10^{\text{a}}$	$23.55 \pm 0.05^{\text{b}}$	$55/00 \pm 1.00^{\text{d}}$
2% chitosan	$17.40 \pm 0.10^{\text{b}}$	$23.25 \pm 0.05^{\text{c}}$	$32/65 \pm 0.05^{\text{f}}$
3% Aqueous extract	$17.40 \pm 0.10^{\text{b}}$	$24.60 \pm 0.00^{\text{a}}$	$86/30 \pm 0.10^{\text{a}}$
3% alcoholic extract	$17.40 \pm 0.10^{\text{b}}$	$18.65 \pm 0.05^{\text{e}}$	$58.70 \pm 0.10^{\text{c}}$
5% Aqueous extract	$17.40 \pm 0.10^{\text{b}}$	$19.25 \pm 0.00^{\text{d}}$	$62.85 \pm 0.05^{\text{b}}$
5% alcoholic extract	$17.40 \pm 0.10^{\text{b}}$	$18.60 \pm 0.00^{\text{e}}$	$49.65 \pm 0.05^{\text{e}}$

mean \pm standard deviation from average (frequency N=3)

* different letter indicates significant difference in a column ($p \geq 0.01$).

**capital letters indicate significant difference in a row ($p \geq 0.01$).




Fig 4 examining trout fish samples using DPPH
Different letters indicate significant difference ($p \geq 0.01$).

نتیجه گرفت که پوشش کیتوزان حاوی عصاره پوست سبب باعث افزایش عمر ماندگاری و ویژگیهای کیفی فیله ماهی خواهد شد.

مطابق جدول بالا مقایسه‌ی گروه‌ها و تیمارها در سه بازه زمانی در F گروه در سطح 0.01 معنادار است ($<P=0.01$)، به عبارت دیگر بین نمرات پس آزمون گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنادار وجود دارد. پس می‌توان

۶- ارزیابی حسی

Table 5 examining color points of trout fish

variable	Treatment and day	N	Mean rank	Significance level
Color points	Control 3 rd day	30	316.62 ^a	0.001
	Control 3 rd day	30	158.83 ^h	
	Chitosan 3 rd day	30	208.45 ^e	
	3% alcoholic 3 rd day	30	215.52 ^d	
	5% alcoholic 3 rd day	30	196.35 ^f	
	3% Aqueous 3 rd day	30	242.68 ^c	
	5% Aqueous 3 rd day	30	254.28 ^b	
	Control 6 th day	30	140.90 ^k	
	Chitosan 6 th day	30	156.75 ⁱ	
	3% Aqueous 6 th day	30	149.38 ^j	
	5% Aqueous 6 th day	30	171.88 ^g	
	3% alcoholic 6 th day	30	141.85 ^k	
	5% alcoholic 6 th day	30	141.85 ^k	




Fig 5 examining color points of trout fish samples
Different letters indicate significant difference ($p \geq 0.01$).

با توجه به آزمون کروسکال والیس می‌توان نتیجه گرفت که بین گروه‌ها و تیمار در هر روز تفاوت معنادار وجود دارد. و از لحاظ رنگ


با توجه به آزمون کروسکال والیس می‌توان نتیجه گرفت که بین گروه‌ها و تیمار در هر روز تفاوت معنادار وجود دارد. و از لحاظ رنگ

رنگ شد و بهترین نتیجه در رنگ بعد از نمونه شاهد در تیمار حاوی عصاره آبی ۵٪ می باشد.

ماهی قزل آلا می توان گفت با گروه شاهد توانسته بهترین رنگ به خود اختصاص دهد. البته نگهداری فیله ماهی قزل آلا در پوشش کیتوزان و عصاره آبی پوست سبب بهبود

Table 6 examining total acceptability points of trout fish

variable	Treatment and day	N	Mean rank	Significance level
total acceptability points	Control 3 rd day	30	237.00 ^c	0.001
	Control 3 rd day	30	136.20 ^k	
	Chitosan 3 rd day	30	155.75 ^h	
	3% alcoholic 3 rd day	30	167.87 ^g	
	5% alcoholic 3 rd day	30	145.67 ⁱ	
	3% Aqueous 3 rd day	30	212.93 ^e	
	5% Aqueous 3 rd day	30	217.68 ^d	
	Control 6 th day	30	132.50 ^l	
	Chitosan 6 th day	30	141.73 ^j	
	3% Aqueous 6 th day	30	301.28 ^b	
	5% Aqueous 6 th day	30	326.43 ^a	
	3% alcoholic 6 th day	30	205.77 ^f	

**Fig 6** examining total acceptability points of trout fish samples
Different letters indicate significant difference ($p \geq 0.01$).


کلی با توجه به آزمون کروسکال والیس تیمار حاوی عصاره آبی ۵٪ و عصاره آبی ۳٪ در روز ششم توانسته بهترین نتایج را در منظر پذیرش کلی به دست آورد.

با توجه به آزمون کروسکال والیس می توان نتیجه گرفت که بین گروه ها در هر تیمار با توجه به سطح معناداری کمتر از $p < 0.001$ می باشد پس می توان گفت که بین گروه ها و تیمار در هر روز تفاوت معنادار وجود دارد و از لحاظ پذیرش

۶-۱-جدول تغییر بافت

Table 7 examining texture of trout fish

variable	Treatment and day	N	Mean rank	Significance level
texture points	Control 3 rd day	30	281.87 ^b	0.001
	Chitosanl 3 rd day	30	112.5 ^k	
	Chitosan 3 rd day	30	177.37 ^e	
	3% alcoholic 3 rd day	30	161.38 ^f	
	5% alcoholic 3 rd day	30	134.32 ⁱ	
	3% Aqueous 3 rd day	30	251.85 ^d	
	5% Aqueous 3 rd day	30	273.6 ^c	
	Control 6 th day	30	98.77 ^l	
	Chitosan 6 th day	30	146.75 ^h	
	3% Aqueous 6 th day	30	282.15 ^b	
	5% Aqueous 6 th day	30	290.62 ^a	
	3% alcoholic 6 th day	30	157.03 ^g	



**Fig 7 examining texture points of trout fish samples
Different letters indicate significant difference ($p \geq 0.01$).**


توجه به آزمون کروسکال والیس می توان نتیجه گرفت که آبی ۵٪ و ۳٪ به ترتیب در روز ششم توانست بهترین نتایج را در آنالیز بافت به دست آورد.

با توجه به آزمون کروسکال والیس می توان نتیجه گرفت که بین گروه ها در هر تیمار با توجه به سطح معناداری کمتر از $p < 0.001$ می باشد پس می توان گفت که بین گروه ها و تیمار در هر روز تفاوت معنادار وجود دارد و از لحاظ بافت با

۶-۲-جدول تغیرات طعم

Table 8 examining flavor

variable	Treatment and day	N	Mean rank	Significance level
flavor points	Control 3 rd day	30	319.35 ^a	0.001
	Chitosan 3 rd day	30	189.98 ^f	
	Chitosan 3 rd day	30	223.40 ^{cd}	
	3% alcoholic 3 rd day	30	221.991 ^d	
	5% alcoholic 3 rd day	30	219.68 ^e	
	3% Aqueous 3 rd day	30	242.23 ^b	
	5% Aqueous 3 rd day	30	224.40 ^c	
	Control 6 th day	30	155.17 ^g	
	Chitosan 6 th day	30	140.69 ⁱ	
	3% Aqueous 6 th day	30	138.32 ^j	



**Fig 8 examining flavor of trout fish samples
Different letters indicate significant difference ($p \geq 0.01$).**

تیمار حاوی عصاره ی آبی ۳ درصد در روز سوم می باشد و به مرور زمان در روز ششم شاخص کیفیت طعم به طور قابل ملاحظه ای افت کرد.

۶-۳-جدول تغییرات بو

با توجه به آزمون کروسکال والیس می توان نتیجه گرفت که بین گروه ها در هر تیمار با توجه به سطح معناداری کمتر از $p<0.001$ می باشد پس می توان گفت که بین گروه ها و تیمار در هر روز تفاوت معنادار وجود دارد و از لحاظ طعم تیمارها تا روز ۳ توانست مطلوب باشد و بهترین نتیجه برای

Table 9 examining trout fish odor

variable	Treatment and day	N	Mean rank	Significance level
odor points	Control 3 rd day	30	308.2 ^a	0.001
	Chitosan 1 3 rd day	30	181.72 ^f	
	Chitosan 3 rd day	30	292.68 ^b	
	3% alcoholic 3 rd day	30	164.4 ^h	
	5% alcoholic 3 rd day	30	156.2 ⁱ	
	3% Aqueous 3 rd day	30	249.22 ^d	
	5% Aqueous 3 rd day	30	254 ^c	
	Control 6 th day	30	148.43 ^j	
	Chitosan 6 th day	30	162.65 ^h	
	3% Aqueous 6 th day	30	170.08 ^g	
	5% Aqueous 6 th day	30	195.67 ^e	
	3% alcoholic 6 th day	30	138.78 ^k	
	5% alcoholic 6 th day	30	75.07 ^l	




Fig 9 examining odor of trout fish samples
Different letters indicate significant difference ($p \geq 0.01$).

نمونه شاهد دارای بالاترین رتبه در میان تیمارها است. البته تیمار حاوی کیتوزان ۲ درصد در روز سوم هم توانسته نتیجه ای خوبی به دست آورد.

۶-۴-آزمون فریدمن

با توجه به آزمون کروسکال والیس می توان نتیجه گرفت که بین گروه ها در هر تیمار با توجه به سطح معناداری کمتر از $p<0.001$ می باشد پس می توان گفت که بین گروه ها و تیمار در هر روز تفاوت معنادار وجود دارد و از لحاظ بو

Table 10 ranking sensory evaluation based on daily treatments

sensory evaluation	mean	rank	Significance level
color	2.91	3	0.001
texture	3.20	2	0.001
flavor	2.80	5	0.001
odor	2.83	4	0.001
Total acceptability	3.25	1	0.001

قزل آلا به دست آمد. بالاترین میزان pH در روز سوم و در تیمار حاوی عصاره الکلی ۳ درصد میباشد و کمترین میزان pH در روز ششم میباشد.

میزان pH پس از مرگ ماهی بر اثر تولید اسید لاکتیک حاصل از گلیکولیز مقدار pH کاهش مییابد و با افزایش مدت نگهداری به دلیل عملکرد آنزیم‌های پروتئولیتیک میزان آمین‌های آزاد افزایش مییابد که سبب افزایش میزان در نمونه‌ها می‌گردد در تحقیقات بر روی ماهی ازوونبرون، قره‌برون و آنجوی مشخص گردید با نگهداری فیله‌ها میزان pH کاهش مییابد pH در فرآورده‌های شیلاتی به عنوان شاخص فساد مییابد که بالاتر از ۷ در فیله ماهیان نشان‌دهنده فساد است که در این تحقیق در نمونه‌های فیله ماهیان pH بالاتر از ۷ مشاهده نشد.

میزان TBA فیله‌های ماهی قزل آلای رنگین کمان در این تحقیق در تمامی تیمارها تقریباً برابر 0.037 ± 0.002 بود که با نتایج سایر محققین بر روی میزان TBA ماهی قزل آلای رنگین اولیه تقریباً برابر می‌باشد مه با تحقیقات Jasour و همکاران، ۲۰۱۱ و Chytiri و همکاران، ۲۰۰۴؛ ذوقفاری و همکاران، ۱۳۹۰؛ Ojagh و همکاران، ۲۰۱۰ همسو میباشد. با توجه به ارجحیت نتایج عصاره آبی ۵ درصد در این تحقیق برای پوشش ماهی قزل آلا پیشنهاد میشود از این عصاره استفاده شود.

البته استفاده از پوشش کیتوزان ۲٪ در بهبود ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی فیله‌ی قزل آلا موثر است.

۸- منابع

- [1] Ghaly, A. E., Dave, D., Budge, S., & Brooks, M. S. (2010). Fish spoilage mechanisms and preservation techniques: review. *American Journal of Applied Sciences*, 7(7), 846-864.
- [2] Manso, S., Pezo, D., Gomez-Lus, R., & Nerin, C. (2014). Diminution of aflatoxin B1 production caused by an active packaging containing cinnamon essential oil. *Food Control*, 45, 101–108.
- [3] Arashisar, S., Hisar, O., Kaya, M., & Yanik, T. (2004). Effects of modified atmosphere and vacuum packaging on microbiological and chemical properties of rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) fillets. *International Journal of Food Microbiology*,

۷- بحث و نتیجه‌گیری

بر اساس نتایج به دست آمده و تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از ارزیابی حسی طی شش روز نگهداری در سرخانه ۴ درجه سلسیوس با افزایش زمان نگهداری امتیاز کیفی فاکتورهای حسی شامل رنگ، بو، طعم و مزه، بافت و پذیرش کلی در نمونه آزمایشی کاهش یافت؛ اما نسبت به نمونه شاهد (عصاره‌آبی ۵ درصد ۳ درصد) از لحاظ رنگ، بو و طعم و مزه، بافت و پذیرش کلی از کیفیت بهتری برخوردار بود. نتایج به دست آمده از این تحقیق با نتایج به دست آمده توسط ایزسی و همکاران، ۲۰۱۱ و تاسکایا و همکاراش در سال ۲۰۰۳ مطابقت دارد.

و در کل با توجه به آزمون کر و سکالوالیس میتوان نتیجه گرفت که بین گروهها در هر تیمار با توجه به سطح معناداری کمتر از $P < 0.01$ میباشد پس میتوان گفت که بین گروهها و تیمارها در هر روز تفاوت معنادار وجود دارد. و از لحاظ رنگ ماهی قزل آلا میتوان گفت با گروه شاهد توانسته بهترین رنگ به خود اختصاص دهد و بهترین نتیجه در ارزیابی رنگ بعد از نمونه شاهد در تیمار حاوی عصاره‌ی آبی ۵٪ روز سوم میباشد. از لحاظ طعم تیمارها تا روز سوم توانست برای مصرف کننده مطلوب باشد و بهترین نتیجه در بین تیمارها در تیمار حاوی عصاره‌ی آبی ۳ درصد روز سوم میباشد و به مرور زمان شاخص کیفیت طعم به طور قابل ملاحظه‌ای افت کرد. از لحاظ شاخص بویین گروهها و تیمارها دارای تفاوت معنی دار بود. دریبتیمارهای نمونه حاوی کیتوزان در روز سوم دارای بالاترین رتبه و سپس عصاره‌ی آبی ۵٪ روز سوم بهترین تیمار بوده است. از منظر پذیرش کلی تیمار حاوی عصاره‌ی آبی ۵٪ پوست سیب و تیمار حاوی عصاره‌ی آبی ۳٪ پوست سیب در روز ششم توانسته بهترین منابع را در آنالیز پذیرش کلی به دست آورد.

در آنالیز بافت هم با توجه به آزمون کروسکالوالیس که تیمارها دارای تفاوت معنی دار بودند عصاره‌های آبی ۵٪ و ۳٪ به ترتیب در روز ششم بهترین نتایج را گرفتند.

همچنین در خصوص خواص pH اولیه فیله‌های قزل آلای رنگین کمان در این تحقیق در تمامی تیمارها تقریباً برابر ۶/۸۵ بود که با نتایج سایر محققین بر روی میزان pH ماهی قزل آلای رنگین کمان اولیه فیله تقریباً همخوانی دارد. در این تحقیق روند تغییرات pH طی ۶ روز نگهداری فیله‌های

- interactions in edible films and coatings. Food/ Nahrung, 44(3), 148–151.
- [7] Ojagh, S.M., Rezai, M., Razari, S. H., & Hosseini , S. M. H. (2010). Effeet of chilosan cautirys enriched with cimamon oil on the quilty of refrigerates rainbow traout food chemistry, 120(1), 193-198
- [8] Ramezani, z., zarei, M., & Raminne jad, N. (2015). Comparing the effectivencess of chitosan and nanochitosan coatings on the quality of refrigerated silrer carp fillets. Food control, 51, 43-48.
- 97(2), 209-214.
- [4] Gomez_Estaca, J. (2007). Tratamiento scombinados de alta presion,_ antioxidantes naturales yenvasadoactivo para preservar la calidad del pescado ahumadoenfrío (Ph.D. thesis) (p. 419). Universidad Complutense de Madrid.
- [5] Dutta, P. K., Tripathi, S., Mehrotra, G. K., & Dutta, J. (2009). Perspectives for chitosan based antimicrobial films in food applications. Food Chemistry, 114(4), 1173–1182.
- [6] McHugh, T. H. (2000). Protein-lipid

Physicochemical, and sensory optimization of Trout fish fillet(*Oncorhynchus mykis*) containing apple peel extract and chitosan edible coating

Ebrahimi, A. H. ¹, Hosseini, S. E. ^{2*}, Khoshkhoo, ZH. ³

1. M.Sc. Student of Food Science and Technology, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2. Associate prof faculty of Food Science and Technology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3. Associate prof faculty of Food Science and Technology, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

(Received: 2018/12/03 Accepted: 2019/06/16)

The use of natural additives as antimicrobial agents (such as herbal extracts) and the use of oral coatings is an appropriate way to control pathogenic bacteria and increase the shelf-life of processed foods, which can reduce the health risks and economic losses caused by microbial growths of the origin Eat food .The aim of this study was to investigate the effect of chitosan and apple extracts on trout microbial quality, so that the aqueous and alcoholic extracts of 3 and 5% with 2% chitin were subjected to dipping method on the surface of the samples. Changes in pH , TVN, TBA and DPPH and sensory were investigated during the first, third and sixth days of storage. In order to analyze the data in the descriptive statistics section, mean, standard variance and standard deviation were used. Also, inferential statistics, analysis of variance, Crocaselville analysis and Friedman's test were used . Results showed the best result in color evaluation after the control sample was in the treatment containing 5% extracts. The taste of the treatments was favorable for the consumer until the third day, and the best result was observed in treatments containing a 3% aqueous extract of the third day, and over time the taste quality index dropped significantly. There was a significant difference between groups and treatments in terms of B-index. Among the treatments, the sample containing chitosan was the highest on the third day and then the 5% extract was the best treatment. From the perspective of the overall acceptance of a 5% apple aqueous extract and an apple aqueous extract of 3%, on the 6th day, the best results were obtained in the overall acceptance analysis. In the tissue analysis, according to Kruskal Wallis test, the treatments showed a significant difference, 5% and 3% water extract was the best on the sixth day, respectively. Regarding the basic pH properties of rainbow trout fillets in this study, in all treatments, it was approximately 6.85%. The process of pH changes during 6 days of storage of trout fillets was obtained. The highest pH was observed on day 3 and in the treatment containing alcoholic extract was 3% and the lowest pH was on the sixth day. The TBA of rainbow trout fillets in this study was almost 0.03 0.02 0.02 for all treatments.

Key words: Trout, Chitosan, Apple skin Extract

* Corresponding Author E-Mail Address: ebhoseini@yahoo.com