

مجله علوم و صنایع غذایی ایران

سایت مجله: www.fsct.modares.ac.ir



مقاله علمی پژوهشی

مطالعه اثر عصاره زردچوبه (*Curcuma Longa*) بر محتوای آکریل آمید و خصوصیات کیفی

سیب زمینی سرخ شده

آمنه سروش فرد^۱، لیلا روفه گری نژاد^{۲*}، میترا صوفی^۳

۱- دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران.

۲- دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران.

۳- دانش آموخته دکتری تخصصی علوم و صنایع غذایی، واحد تحقیق و توسعه شرکت آسیا شور، تبریز، ایران.

چکیده

اطلاعات مقاله

تاریخ های مقاله :

تاریخ دریافت: ۹۹/۱۰/۱۱

تاریخ پذیرش: ۹۹/۱۲/۰۲

کلمات کلیدی:

آکریل آمید،

سیب زمینی سرخ شده،

عصاره زردچوبه.

آکریل آمید به عنوان یک ماده سمی برای انسان‌ها، در محصولات غذایی حرارت دیده، به خصوص در سیب زمینی سرخ کرده در مقادیر بالا یافت می‌شود. پیشگیری از تشکیل آکریل آمید در مواد غذایی می‌تواند خطر قوارگیری در معرض این ماده و در نتیجه خطوات سلامتی آن را بر انسان به حداقل برساند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر عصاره زردچوبه بر محتوای آکریل آمید و خصوصیات کیفی سیب زمینی سرخ شده می‌باشد. بدین منظور برش‌های سیب زمینی آنزیم بری شده، در عصاره زردچوبه (۰، ۵ و ۱۰ درصد وزنی / وزنی) به مدت ۱۵ دقیقه غوطه‌ور شده و سپس در روغن سرخ شدند. میزان رطوبت، جذب روغن، چروکیدگی، رنگ (L*, a*, b*), محتوای آکریل آمید و ویژگی‌های حسی اندازه‌گیری شده و با نمونه شاهد مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که با افزایش غلظت عصاره، درصد رطوبت نمونه‌ها افزایش و محتوای چربی و چروکیدگی کاهش یافت. همچنین با افزایش غلظت عصاره زردچوبه، روشی (L*) و قرمزی (a*) سیب زمینی‌ها کاهش و زردی (b*) نمونه‌ها افزایش یافت. افزایش غلظت زردچوبه تا ۱۰ درصد سبب کاهش ۴۷ درصد در میزان آکریل آمید نسبت به نمونه شاهد شده و ویژگی‌های حسی به استثنای طعم در غلظت ۱۰ درصد عصاره زردچوبه، با افزایش غلظت عصاره زردچوبه، بهبود یافت. نتایج کلی نشان داد که استفاده از ۱۰ درصد عصاره زردچوبه در کنار بهبود خواص کیفی و حسی، منجر به کاهش قابل توجه تشکیل آکریل آمید در سیب زمینی سرخ کرده شده و می‌تواند به عنوان روشی در جهت کاهش تشکیل این ترکیب سمی پیشنهاد گردد.

DOI: 10.52547/fsct.18.05.14

* مسئول مکاتبات:

l.roufegari@iaut.ac.ir

واکنش آسپارازین آزاد با قندهای احیاکننده در دماهای بالا در نتیجه واکنش میلارد و همچنین به وقوع واکنش هیدرولیز حرارتی روغن‌ها طی سرخ کردن عمیق مربوط می‌دانند. گلیسرول آزاد شده در جریان هیدرولیز حرارتی روغن‌ها، در نتیجه آبگیری به آکرولئین تبدیل شده و ضمن ایفای نقش کربونیل فعل در حضور آسپارازین، آکریل آمید را تولید می‌نماید. علاوه بر آن، اسید آکریلیک ناشی از اکسید شدن آکرولئین می‌تواند با آمونیاک به تشکیل آکریل آمید متهمی می‌شود [۱۰]. به این دلیل بهینه کردن میزان آسپارازین و قندهای احیاکننده در ماده اولیه مورد استفاده، همراه با کنترل‌های لازم در زمان و درجه حرارت سرخ کردن، مقدار رطوبت و مقدار روغن مورد استفاده برای سرخ کردن از راهکارهای مطرح شده برای تحت کنترل قرار دادن تشکیل این ترکیب نامطلوب می‌باشد [۱۱]. با توجه به اهمیت سلامت و اینمی مصرف-کنندگان، پژوهش‌های متعددی در زمینه کاهش جذب روغن و تشکیل آکریل آمید در موادغذایی سرخ شده از جمله سیب‌زمینی صورت گرفته است که می‌توان به غوطه‌وری تکه‌های سیب‌زمینی در آب [۶,۱۲]، آنزیم‌بری با محلول کلرید کلسیم [۱۳]، پوشش‌دهی با صمغ‌های مختلف [۸, ۱۰, ۱۱]، آنزیم‌بری تحت خلاء [۲] و اثر افزودن برخی ویتامین‌ها و اسیدهای آمینه بر محتوای آکریل آمید اشاره نمود [۸,۱۴]. امروزه تقاضای روزافزون برای گسترش و توسعه ترکیبات طبیعی در تولید موادغذایی، توجه به عصاره‌های گیاهی برای تولید موادی نظیر آنتی‌اسیدان‌ها را افزایش داده است. در سال‌های اخیر با اثبات آثار سوء آنتی‌اسیدان‌های سنتزی، تحقیقات بسیاری پیرامون جایگزین کردن این ترکیبات با آنتی‌اسیدان‌های طبیعی صورت گرفته است. از منابع عمدۀ آنتی‌اسیدان‌های طبیعی می‌توان به زردچوبه اشاره نمود؛ زردچوبه (*Curcuma longa L.*) متعلق به تیره زنجیبلیان است که به‌طور متداول تحت عنوان تورمریک شناخته شده و به عنوان یک افزودنی غذایی نیز مورد مصرف روزانه قرار می‌گیرد. ترکیب فعل زردچوبه کورکومین می‌باشد که ترکیب پلی‌فلنلی بوده و ظرفیت آنتی‌اسیدانی بالای دارد [۱۵]. در همین راستا، هدف کلی از تحقیق حاضر، بهره‌گیری از عصاره زردچوبه به عنوان منبع غنی از ترکیبات آنتی‌اسیدان و مطالعه اثر آن در غلظت‌های مختلف بر محتوای آکریل آمید و خصوصیات کیفی سیب‌زمینی‌های سرخ شده می‌باشد.

۱- مقدمه

اثر مستقیم تغذیه بر سلامت از دیرباز شناخته شده است و انسان از سده‌های پیشین با تجربه و آزمایش بی‌برده که با تغذیه صحیح از زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری برخوردار خواهد شد. امروزه مصرف غذای سالم و اینمی از اهمیت بسیار بالای در سلامت انسان برخوردار است و با صنعتی شدن مسیر تولید موادغذایی و مصرف انبوه موادغذایی صنعتی، احتیاج به بهبود کیفیت این محصولات افزایش یافته است [۱]. سیب‌زمینی سرخ شده در میان غذاهای میان‌وعده، سهم بازار قابل توجهی در بین مصرف‌کنندگان به‌ویژه کودکان و نوجوانان، به خود اختصاص داده است [۲]. یکی از قدیمی‌ترین فرایندهای پخت انواع موادغذایی از جمله سیب‌زمینی، سرخ کردن عمیق می‌باشد؛ که اساس آن غوطه‌ور نمودن قطعات ماده‌غذایی در روغن یا چربی خوارکی داغ است [۳,۴]. علاوه‌بر تامین اسیدهای چرب ضروری و ویتامین‌های محلول در چربی، بالابودن مصرف محصولات سرخ شده به دلیل میزان بالای روغن جذب شده، خطر ابتلاء به بیماری‌های قلبی عروقی، فشار خون، دیابت و برخی از انواع سرطان‌ها به خصوص سلطان روده‌ی بزرگ را افزایش می‌دهد [۵]. علیرغم کالری بالای محصولات سرخ شده، ایجاد واکنش‌های محربی چون اکسایش حرارتی، پلیری شدن و هیدرولیز در روغن‌ها طی سرخ کردن عمیق به‌دلیل حضور اکسیژن و آب ناشی از ماده‌غذایی، ممکن است سلامتی مصرف‌کنندگان را به خطر اندازند و همچنین سبب بروز بیماری‌های قلبی-عروقی گردد [۶,۷]. آکریل آمید یکی از ترکیبات نامطلوب ایجاد شده در موادغذایی در طی حرارت دهنده در دماهای بالای ۱۲۰ درجه سلسیوس می‌باشد که مقدار آن در فرآوردهای سیب‌زمینی سرخ شده بیشتر از دیگر غذاهای فرآوری شده است [۸]. این ترکیب یک ماده سلطان‌زا می‌باشد؛ به‌طوری‌که سازمان بهداشت جهانی، یک سوم از سلطان‌های مرتبط با تغذیه، را به دلیل وجود آکریل آمید در موادغذایی عنوان نموده است. مطالعات و تحقیقات مختلف، نیز توموزایی این ماده در غده تیروئید، پانکراس، کلیه، روده بزرگ، رحم و پستان را در موش و انسان تصدیق نموده و ایجاد اختلالات در سیستم عصبی توسط آکریل آمید نیز به اثبات رسیده است [۹]. مسیرهای متعددی برای تشکیل آکریل آمید در مواد غذایی بیان شده است اما تشکیل آن در فرآورده‌های سرخ شده سبب زمینی را بیشتر به

آون کنوکسیونی در دمای 105 ± 1 درجه سلسیوس تا رسیدن نمونه‌ها به وزن ثابت استفاده گردید و بحسب درصد (گرم رطوبت در صد گرم خلال) گزارش شد [۱۹]. چروکیدگی، حجم ظاهری نمونه‌ها قبل از سرخ کردن و سپس حجم ظاهری ثانویه بعد از سرخ کردن با بکارگیری تکنیک جابه‌جایی خلال (تولوئن) تعیین شد [۲۰].

۴-۲- آزمون رنگ

شاخص‌های رنگی با استفاده از روش پردازش تصویر تعیین شد. بعد از عکس‌برداری از نمونه‌ها و کارت‌های استاندارد RAL با استفاده از دوربین عکاسی (سامسونگ، کره) در محفظه‌ای معین با شدت نور D65 و فاصله لنز ثابت تا نمونه L^* (درجه)، منحنی استاندارد برای هر یک از فاکتورهای a^* و b^* رسم و معادله مناسب برآش شد. با قرار دادن میانگین اعداد در این معادله، مقادیر L^* , a^* و b^* واقعی تعیین شد. همچنین ΔE شاخص میزان تغییر رنگ نسبت به نمونه شاهد نیز به صورت زیر محاسبه شد [۲۱]:

$$\Delta E = \sqrt{(L_0^* - L_i^*)^2 + (a_0^* - a_i^*)^2 + (b_0^* - b_i^*)^2}$$

L_0^* : میزان روشنایی در نمونه شاهد، L_i^* : میزان روشنایی در نمونه سرخ شده به مدت t ثانیه، a_0^* : میزان سبز تا قرمزی در نمونه شاهد، a_i^* : میزان سبز تا قرمزی در نمونه سرخ شده به مدت t ثانیه، b_0^* : میزان آبی تا زرد در نمونه شاهد و b_i^* : میزان آبی تا زرد در نمونه سرخ شده به مدت t ثانیه.

۵-۲- اندازه گیری آکریل آمید

یک گرم از نمونه خرد و همگن شده با 10 میلی‌لیتر محلول 10 درصد اسید فرمیک در آب به مدت 20 دقیقه مخلوط شد و سپس در دمای 5 درجه سلسیوس به مدت 15 دقیقه با سرعت 4000 دور در دقیقه سانتریفیوژ گردید. قسمت رویی توسط فیلتر 0.45 میکرونی فیلتر شده و برای خالص سازی از کارتريج استخراج فاز جامد عبور داده شد. کارتريج ابتدا توسط $1/5$ میلی‌لیتر آب و سپس با 2 میلی‌لیتر استون شستشو و یک میکرو لیتر از خروجی کارتريج به دستگاه کروماتوگرافی گازی با آشکارساز یونی شعله‌ای (GC-FID) (مدل ۶۸-۲۰، شرکت Agilent، امریکا) مجهز به ستون مویین (HP5) به طول 30 متر، قطر 0.25 میلی‌متر و ضخامت فیلم 0.25 میکرومتر تزریق شد. دمای محفظه تزریق و آشکارساز به ترتیب 230 و 260 درجه سلسیوس تنظیم گردید. گاز هلیوم

۲- مواد و روش‌ها

۲-۱- مواد مورد استفاده

در این تحقیق، از سیب‌زمینی رقم آگریا (نگهداری شده در دمای 10 درجه سلسیوس)، روغن مایع آفتتابگردان مخصوص سرخ کردنی (شرکت بهار، ایران)، عصاره زردچوبه $98-99$ درصد (شرکت عطر و طعم مگنولیا، ایران)، تولوئن (شرکت مرک، آلمان)، پترولیوم اتر (شرکت مرک، آلمان)، اسید فرمیک (شرکت مرک، آلمان) و استون (شرکت مرک، آلمان) استفاده گردید.

۲-۲- روش تولید

سیب‌زمینی‌ها پس از شستشو و پوست‌گیری، توسط کاتر به قطعاتی با ابعاد $6\times 0.5\times 0.5$ cm برش خورده و به منظور حذف نشاسته سطحی به مدت 1 دقیقه در آب مقطر شستشو و خیسانده شدند. بعد از آنزیم‌بری سیب‌زمینی‌ها 85 درجه سلسیوس به مدت 6 دقیقه، غوطه‌وری در غلطه‌های مختلف عصاره (تیمار T_0 : نمونه کنترل بدون اضافه کردن عصاره، T_1 و T_2 به ترتیب غوطه‌وری در محلول 5 و 10 درصد وزنی/وزنی عصاره) به مدت 15 دقیقه انجام شد. پس از آماده سازی نمونه‌ها، ابتدا سرخ کن (مولینکس فرانسه با ظرفیت $2/2$ لیتر روغن و مجهر به سیستم تنظیم دما در محدوده 150 تا 190 درجه سلسیوس) با $1/5$ لیتر روغن پر شد و بعد از تنظیم دما و زمان سرخ کردن مورد نظر، سرخ کن بر روی حالت اتوماتیک قرار داده شد؛ به طوری که پس از رسیدن دمای سرخ کن به دمای $200-180$ درجه سلسیوس، نمونه‌های سیب زمینی به میزان 50 گرم در داخل سبد مشبك سرخ کن قرار داده شدند و سپس سبد حاوی نمونه‌ها به طور اتوماتیک در روغن غوطه‌ور شد. پس از سرخ شدن نمونه‌ها به مدت 5 دقیقه و پس از خارج شدن روغن سطحی، نمونه‌ها مورد ارزیابی کیفی قرار گرفتند. آماده‌سازی تیمارها نیز در سه تکرار انجام گرفت [۱۶].

۳-۲- آزمون‌های شیمیایی

محتوای روغن نمونه‌های سرخ و خشک شده با استفاده از روش سوکسله بر مبنای استخراج با حلal پترولیوم اتر به مدت 10 ساعت انجام شد و بر حسب درصد (گرم روغن در صد گرم ماده خشک) گزارش شد [۱۷, ۱۸]. برای تعیین محتوای رطوبت نمونه‌های سرخ شده، از روش خشک کردن آنها در

جدول ۱ نشان داده شده است. طبق نتایج حاصل، بین تیمارهای مورد بررسی از نظر میزان جذب روغن در سیبزمینی‌های غوطهور شده در غلاظت‌های مختلف عصاره زردچوبه اختلاف معنی‌داری ($p < 0.05$) وجود داشت. به‌طوری‌که نمونه‌ی غوطهور شده در عصاره ۱۰ درصد زردچوبه، کمترین میزان جذب روغن (100 ± 100) و نمونه شاهد بیشترین میزان جذب روغن (51 ± 101) را داشت. همانطور که در جدول ۱ مشاهده می‌گردد برخلاف نتایج حاصل از نظر تغییرات محتوای روغن نمونه‌ها، نمونه شاهد دارای کمترین میزان رطوبت (38 ± 17) و نمونه غوطهور شده در عصاره ۱۰ درصد زردچوبه با محتوای رطوبت 70 ± 80 از بیشترین میزان محتوای رطوبت در بین نمونه‌های مورد آزمون برخوردار بودند. نتایج به دست آمده طبق جدول ۱، نشانگر اثر مثبت عصاره زردچوبه بر میزان جذب روغن و محتوای رطوبتی نمونه‌های سیبزمینی سرخ شده بود. دلیل این امر می‌تواند پوشش یافتن سطح برش‌های سیبزمینی غوطهور شده در عصاره زردچوبه با این محلول باشد که با ایجاد لایه محافظ از انتقال چربی و رطوبت بین نمونه و محیط سرخ کردن جلوگیری نموده و بدین ترتیب جذب روغن و محتوای رطوبت در نمونه‌های غوطهور شده در عصاره زردچوبه به ترتیب کاهش و افزایش یافته است. نتایج به دست آمده در رابطه با میزان جذب روغن سیبزمینی‌های سرخ شده با نتایج گزارش شده توسط علیپور و همکاران (۲۰۰۹)، در رابطه با بررسی تاثیر کاراگینان، دمای روغن و مدت زمان سرخ کردن بر میزان جذب روغن در سیبزمینی‌های سرخ شده و جوکار و همکاران (۲۰۰۶)، در رابطه با مطالعه تولید چیپس سیبزمینی کم‌چرب، پوشش داده شده با هیدروکلولئیدها و اثر افزایش غلاظت پوشش در کاهش میزان جذب روغن نمونه‌های چیپس سیبزمینی مطابقت داشت [۲۳، ۱۷]. در رابطه با میزان چروکیدگی نمونه‌ها نیز روند مشابهی مشاهده گردید؛ به‌طوری‌که نمونه‌ی غوطهور شده در عصاره ۱۰ درصد زردچوبه دارای کمترین مقدار چروکیدگی (11 ± 0.1) و نمونه شاهد دارای بیشترین مقدار چروکیدگی (50 ± 10) بود. با این حال بین نمونه‌های غوطهور شده در ۵ و ۱۰ درصد عصاره زردچوبه از نظر میزان چروکیدگی اختلاف معنی‌داری مشاهده نگردید ($p > 0.05$). چروکیدگی یکی دیگر از معایب سرخ کردن می‌باشد که عبارت است از کاهش حجم ظاهری

به عنوان گاز حامل با فشار ثابت ۰/۷ مگا پاسکال با سرعت خطی $1/4$ میلی لیتر در دقیقه از داخل ستون عبور داده شد [۲]. مقادیر آکریل آمید نمونه‌ها از طریق منحنی کالیبراسیون حاصل از تزریق نمونه‌های استاندارد آکریل آمید محاسبه گردید (شکل ۱).




Fig 1 Calibration curve of acrylamide

۶-۲- ارزیابی حسی

مقبولیت ویژگی‌های حسی توسط ۲۰ نفر ارزیاب آموخته شدیده مورد مطالعه قرار گرفت. ارزیابی حسی با استفاده از آزمون هدوانیک ۵ نقطه‌ای انجام شد، به‌طوری‌که برای هر ویژگی امتیاز ۱، نشان‌دهنده پایین‌ترین کیفیت و امتیاز ۵ نماینده بهترین کیفیت بود. شاخص‌های بافت، رنگ، طعم و مزه توسط ارزیابان مورد بررسی قرار گرفت [۵].

۷-۲- تجزیه و تحلیل آماری

تأثیر غلاظت عصاره زردچوبه بر میزان جذب روغن، رطوبت، چروکیدگی، شاخص‌های رنگی، محتوای آکریل آمید و همچنین خواص حسی قطعات سیبزمینی سرخ شده بر مبنای طرح کاملاً تصادفی (CRD) با استفاده از نرم افزار آماری MINITAB 16 انجام شد. آزمون توکی در سطح اطمینان ۵٪ ($p < 0.05$) برای تأیید وجود اختلاف میانگین‌ها بین تیمارها مورد استفاده قرار گرفت. تمام آزمون‌ها در سه تکرار انجام شد و نمودارها توسط نرم افزار Prism9، ۲۰۱۹ ترسیم گردید.

۳- نتایج و بحث

۳-۱- تغییرات ویژگی‌های شیمیایی

نتایج مربوط به تغییرات پارامترهای شیمیایی مورد آزمون در

داشت. لذا غوطه‌وری سیب‌زمینی در محلول عصاره زردچوبه باعث کاهش چروکیدگی سیب‌زمینی سرخ شده نسبت به نمونه شاهد شد.

Table1. Effect of different concentrations of turmeric extract on chemical properties of fried potatoes

Treatment	Moisture content (%)	Oil uptake (%)	Shrinkage
T ₀ (control)	22.17±0.38 ^a	36.05±1.01 ^b	0.13±0.05 ^b
T ₁	23.97±0.71 ^b	34.33±2.08 ^{ab}	0.11±0.01 ^a
T ₂	24.80±0.70 ^b	31.00±1.00 ^a	0.11±0.03 ^a

Data are expressed as mean ± standard deviation (n=3), and different letters show significant differences at the 5% level in Tukey's test (p < 0.05).

شاهد به ۱۷/۰ ± ۲/۳۳ (میکروگرم بر کیلوگرم) در نمونه حاوی ۱۰ درصد عصاره زردچوبه رسید و حدود ۴۷ درصد کاهش یافت. این درحالی است که این کاهش در نمونه غوطه‌ور شده در عصاره ۵ درصد زردچوبه (۴۲/۳۳ ± ۲/۲۳ /۱۳) میکروگرم بر کیلوگرم) نسبت به نمونه شاهد ۱۸ درصد بود (شکل ۳). بدین ترتیب حداقل غلظت عصاره زردچوبه مورد نیاز برای کاهش معنی دار میزان آکریل آمید در سیب‌زمینی سرخ شده، ۱۰ درصد تعیین گردید.

محصول نهایی، که به علت تغییرات ساختاری ایجاد شده طی سرخ کردن رخ می‌دهد. طبق نتایج حاصل، هرچه میزان آب موجود در ماده‌غذایی کاهش یافت، چروکیدگی روند افزایش

۲-۳- تغییرات محتوای آکریل آمید

تعیین محتوای آکریل آمید از طریق کروماتوگرافی گازی انجام شد که کروماتوگرام های بدست آمده برای محتوای آکریل آمید در سیب زمینی سرخ شده در شکل ۲ آورده شده است. طبق نتایج بدست آمده، بین تیمارهای مورد بررسی از نظر میزان آکریل آمید در سیب‌زمینی های سرخ شده اختلاف معنی داری (p < 0.05) وجود داشت. به طوری که با افزایش غلظت عصاره زردچوبه در محلول غوطه‌وری، میزان آکریل آمید کاهش یافت و از ۵۹۵/۰۰ ± ۲۰/۹۵ (میکروگرم بر کیلوگرم) در نمونه




Fig 2 Chromatograms of control samples (a), treated with 5% curcumin extract (b), treated with 10% curcumin extract (c), dotted circle indicate to acrylamide peak.

که یکی دیگر از عوامل موثر بر کاهش میزان آکریل آمید در سبیززمینی سرخ شده بود. به طوری که در مطالعات قبلی انجام شده در این رابطه گزارش شد که با کاهش محتوای قند توسط آنزیم بری می توان محتوای آکریل آمید را به مقدار ۶۰ درصد کاهش داد [۶]. از دیگر دلایل کاهش آکریل آمید در نمونه های سبیززمینی سرخ شده، کاهش جاذب روغن توسط نمونه های تیمار شده با عصاره زردچوبه بود؛ به طوری که کاهش روغن در سبیززمینی سرخ شده سبب کاهش انتقال حرارت و در نهایت کاهش میزان آکریل آمید گردید [۲۷]. به طور کلی تیمار غوطه وری در عصاره زردچوبه همراه با پیش تیمارهای آنزیم بری و شستشو در آب سرد با غیرفعال کردن مکانیسم های تشکیل آکریل آمید از طریق واکنش میلارد و نیز تشکیل آکریل آمید در اثر هیدرولیز روغن سبب کاهش میزان این ماده سمی در محصول سرخ شده گردید.




Fig 3 Effect of different concentrations of turmeric extract on acrylamide content of fried potato (Data are expressed as mean \pm standard deviation ($n=3$) and different letters show significant difference at the 5% level in Tukey's test ($p < 0.05$))

۳-۳- تغییرات رنگ

رنگ یکی از خصوصیات کیفی است که توسط مصرف کننده مورد ارزیابی قرار می گیرد. در طول فرآیند سرخ کردن انتقال همزمان جرم و حرارت باعث ایجاد تغییرات فیزیکی و شیمیایی در محصول سرخ شده می شود که در این حالت، رنگ محصول نیز تحت تاثیر قرار می گیرد [۲۸]. نتایج حاصل از ارزیابی پارامترهای رنگی (L^* , a^* و b^*) در جدول ۲ نمایش داده شده است. طبق داده های این جدول، غوطه وری در عصاره زردچوبه با غلظت ۵ درصد، منجر به افزایش شاخص L^*

کاهش ۴۷ درصدی میزان آکریل آمید با غوطه وری نمونه های سبیززمینی در عصاره زردچوبه با غلظت ۱۰ درصد را می توان به وجود کورکومین در عصاره زردچوبه که دارای فعالیت آنتی اکسیدانی قوی بوده و به عنوان نگهدارنده در مقابل اکسیداسیون عمل می نماید نسبت داد؛ به طوری که کورکومینوئیدها، با به دام انداختن عوامل موثر در اکسیداسیون مانند رادیکال های آزاد و انواع اکسیژن فعال نظیر رادیکال های هیدروکسیل و رادیکال های سوپراکسید منجر به کاهش تشکیل آکریل آمید شده اند [۲۴]. این نتایج مطابق با یافته های اشکی و همکاران (۲۰۱۳) و کاقاریگی و همکاران (۲۰۱۲) در رابطه با اثر افزودن یک ترکیب فلاونوئیدی نظیر ادویه ها بر کاهش میزان آکریل آمید در محصول بود [۲۴, ۲۵]. روند مشابهی نیز در مطالعه باسونی و عرفات (۲۰۱۳) در رابطه با کاهش تشکیل آکریل آمید و جذب روغن اسلامیس های سبیززمینی تیمار شده با عصاره برگ زیتون در طول سرخ کردن، گزارش گردید [۲۶]. اکسیداسیون چربی مهم ترین مسیر تشکیل آکریل آمید در غذاهای غنی از روغن نظیر سبیز زمینی های سرشار از اسیدهای لیتوئیک و لیتوئنیک، آکرولئین به میزان قابل توجهی تشکیل می شود که می تواند طی اکسید شدن و واکنش با آمونیاک به تشکیل آکریل آمید متهمی گردد. از سوی دیگر متیل لینولئات که یک لیپید غیر اکسیده می باشد، در حضور گلوکز می تواند توسط رادیکال های آزاد به ترکیبات کربنیل دو غیر اشباعی اکسیده شده و درگیر واکنش کربونیل - آسپاراژین و تولید آکریل آمید شود. ترکیبات پلی فنلی با مهار کردن رادیکال های آزاد ضمن تبدیل شدن به رادیکال های فنوکسیل، به عنوان یک ترکیب آنتی اکسیدان زنجیر شکن محسوب شده و مانع از اکسیداسیون چربی ها می شوند. مهار اکسیداسیون چربی ها و به دنبال آن کاهش تشکیل آکریل آمید در بررسی بسیاری از ترکیبات فنلی نتیجه شده است و کارایی این اثر به غلظت ترکیب پلی فنلی و ساختار آن ها ارتباط داده شده است. به طوری که گفته می شود تاثیر اورتو دی فنل ها به مراتب بیشتر از منوفنل ها می باشد [۱۶, ۶]. علاوه بر این، پیش تیمار آنزیم بری تکه های سبیززمینی در دمای ۸۵ درجه سلسیوس به مدت ۶ دقیقه و همچنین غوطه وری تکه های سبیززمینی در محلول عصاره زردچوبه، محتوای قند های احیا کننده و آسپاراژین تکه های سبیززمینی را قبل از سرخ کردن کاهش داد

نمونه شاهد شد. تغییرات پارامترهای رنگ L^* ، a^* و b^* می‌تواند به دلیل تاثیر عصاره زردچوبه در کاهش واکنش‌های مخرب و قهقهه‌ای شدن آنزیمی (مايلارد) در نمونه‌ها باشد. به طوری که، فالگوئرا و همکاران (۲۰۱۱)، در نتیجه پوشش‌دهی خلال‌های سبیزه‌مینی توسط کربوکسی‌متیل‌سولولز نتایج مشابهی را گزارش کردند. تغییرات رنگی سبیزه‌مینی سرخ شده تحت تاثیر میزان قند‌های احیاکننده نیز می‌باشد که کاهش آن‌ها موجب کترل واکنش‌های قهقهه‌ای شدن و تا حدودی بهبود رنگ فرآورده‌های سبیزه‌مینی می‌گردد و به عنوان مهم‌ترین شاخص کیفی فرآورده‌های سرخ شده سبیزه‌مینی محسوب می‌شود. در این تحقیق انجام پیش‌تیمار آنژیم‌بری در دمای ۸۵ درجه سلسیوس به مدت ۶ دقیقه و خیساندن قطعات سبیزه‌مینی در محلول عصاره زردچوبه، با کاهش محتوای قند احیاکننده منجر به کاهش پیش‌سازه‌های واکنش مايلارد و جلوگیری از قهقهه‌ای شدن غیرآنژیمی شده و در نهایت باعث بهبود رنگ سبیزه‌مینی سرخ شده گردید [۲۸]. نتایج مشابهی نیز توسط پدرسچی و همکاران (۲۰۰۷)، در رابطه با کاهش محتوای گلوکز تکه‌های سبیزه‌مینی با افزایش مدت زمان خیساندن در آب به علت استخراج این ماده توسط آب گزارش گردید [۶].

Table 2 Effect of different concentrations of turmeric extract on color properties of fried potatoes

Treatment	L^*	a^*	b^*	ΔE
T_0 (control)	51.67 ± 1.50^{ab}	-6.07 ± 0.12^b	38.67 ± 0.31^c	0.00 ± 0.00^c
T_1	53.73 ± 0.92^a	-6.13 ± 0.12^b	47.47 ± 0.31^b	9.15 ± 0.49^b
T_2	49.27 ± 0.64^b	-5.40 ± 0.20^a	49.80 ± 0.40^a	11.48 ± 0.18^a

Data are expressed as mean \pm standard deviation ($n=3$), and different letters show significant differences at the 5% level in Tukey's test ($p < 0.05$).

زردچوبه از نظر طعم و مزه امتیاز پایین‌تری را نسبت به سایر نمونه‌ها از سوی ارزیاب‌ها دریافت نمود. اگرچه این تغییرات از نظر آماری نسبت به نمونه شاهد معنی‌دار نبود؛ ولی دلیل این امر احتمالاً به غلظت بالاتر عصاره زردچوبه در نمونه‌های سرخ شده مربوط بود که در نتیجه حرارت‌دهی سبیزه‌مینی باعث تغییر طعم آن گشت. این یافته‌ها با نتایج گزارش شده توسط ژنگ و ژنگ (۲۰۰۷)، در رابطه با کاهش آکریل‌آمید در تکه‌های نان سرخ شده با افزودن برگ بامبو و عصاره چای سبز و اثر آن بر ویژگی‌های حسی این محصول مطابقت داشت [۲۹]. همچنین غوطه‌وری در غلظت‌های مختلف عصاره زردچوبه در هر دو سطح ۵ و ۱۰ درصد، بر رنگ ظاهری سبیزه‌مینی سرخ شده تاثیر مثبت داشته و اثر آن با افزایش غلظت عصاره مورد استفاده از روند افزایشی برخوردار بود.

(۵۳/۷۳ \pm ۰/۹۲) گردید. این در حالی است که غوطه‌وری در عصاره زردچوبه با غلظت ۱۰ درصد، به تضعیف رنگ و کاهش شاخص L^* (۴۹/۲۷ \pm ۰/۶۴) در مقایسه با نمونه شاهد منجر شد. در رابطه با شاخص a^* نیز مشاهده شد که با افزایش غلظت عصاره زردچوبه، میزان پارامتر a^* کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش میزان قرمزی در نمونه‌ها بوده است. در خصوص شاخص‌های a^* و L^* بین تیمارهای مورد بررسی اختلاف معنی‌داری در سطح احتمال ۰/۰۱ و در مورد a^* وجود داشت. بهترین تیمار از جهت شاخص‌های b^* و a^* تیمار غوطه‌ور شده در عصاره زردچوبه با غلظت ۱۰ درصد و بهترین تیمار از نظر شاخص L^* تیمار غوطه‌ور شده در عصاره زردچوبه با غلظت ۵ درصد بود که از نظر آماری با نمونه شاهد نیز تفاوت معنی‌داری نداشت ($p > 0.05$). بررسی نتایج مربوط به ΔE نیز که شاخص میزان تغییر رنگ نسبت به نمونه شاهد می‌باشد، تفاوت معنی‌داری ($p < 0.05$) بین نمونه‌های مورد آزمون نشان داد. به طوری که افزایش غلظت عصاره زردچوبه، منجر به افزایش مقدار ΔE و تغییر معنی‌دار رنگ نمونه‌های غوطه‌ور شده در عصاره زردچوبه نسبت به

۴-۴- ارزیابی حسی

شکل ۲ نشان دهنده اثر غوطه‌وری در غلظت‌های مختلف ۵ و ۱۰ درصد عصاره زردچوبه بر ویژگی‌های حسی (رنگ ظاهری، طعم، بافت) سبیزه‌مینی سرخ شده می‌باشد. طبق نتایج به دست آمده، غوطه‌وری در غلظت‌های مختلف عصاره زردچوبه منجر به بهبود طعم و رنگ سبیزه‌مینی سرخ شده گردید و از نظر آماری بین بافت نمونه‌های غوطه‌ور شده در عصاره زردچوبه با نمونه شاهد تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. با این حال، اثر غوطه‌وری در غلظت‌های مختلف عصاره زردچوبه بر روی طعم سبیزه‌مینی سرخ شده معنی‌دار بود ($p < 0.05$)؛ به طوری که غوطه‌وری در غلظت ۵ درصد عصاره زردچوبه اثر مثبت بر طعم سبیزه‌مینی سرخ شده داشت؛ در حالی که غوطه‌ور شده در محلول ۱۰ درصد عصاره

- Alizadeh A. Effect of Blanching under Vacuum and Coating on Quality Characteristics and Acrylamide Content in Fried Potato Strips. *Iran J FOOD Sci Technol.* 2018;15(78):15–24.
- [3] Dana D, Saguy IS. Review: Mechanism of oil uptake during deep-fat frying and the surfactant effect-theory and myth. *Adv Colloid Interface Sci.* 2006;128–130:267–72.
- [4] Krokida MK, Oreopoulou V, Maroulis ZB. Effect of frying conditions on shrinkage and porosity of fried potatoes. *J Food Eng.* 2000;43(3):147–54.
- [5] Arias-Mendez A, Warning A, Datta AK, Balsa-Canto E. Quality and safety driven optimal operation of deep-fat frying of potato chips. *J Food Eng.* 2013;119(1):125–34.
- [6] Pedreschi F, Kaack K, Granby K, Troncoso E. Acrylamide reduction under different pre-treatments in French fries. *J Food Eng.* 2007;79(4):1287–94.
- [7] Bunger A, Moyano P, Rioseco V. NaCl soaking treatment for improving the quality of french-fried potatoes. *Food Res Int.* 2003;36(2):161–6.
- [8] Zeng X, Cheng KW, Jiang Y, Lin ZX, Shi JJ, Ou SY, et al. Inhibition of acrylamide formation by vitamins in model reactions and fried potato strips. *Food Chem.* 2009;116(1):34–9.
- [9] Timilsena YP, Khanal JS, Anal AK. Acrylamide: Thermally Induced Toxicant in Foods and Its Control Measures. *J Food Sci Technol Nepal.* 2013;6:19–30.
- [10] Pedreschi F, Zuñiga RN. Acrylamide and Oil Reduction in Fried Potatoes : A Review. *Glob Sci Books.* 2009;82–92.
- [11] Knol JJ. Kinetic modeling of acrylamide formation in aqueous reaction systems and potato crisps. 2014. 1–50 p.
- [12] Morales F, Capuano E, Fogliano V. Mitigation strategies to reduce acrylamide formation in fried potato products. *Ann N Y Acad Sci.* 2008;1126:89–100.
- [13] Gökmen V, Şenyuva HZ. Acrylamide formation is prevented by divalent cations during the Maillard reaction. *Food Chem.* 2007;103(1):196–203.
- [14] Kim CT, Hwang E-S, Lee HJ. Reducing Acrylamide in Fried Snack Products by Adding Amino Acids. *J Food Sci.* 2005;70(5):C354–8.
- [15] Rezaei M, , Pezeshk, S. , Hosseini, H., Eskandari S. Effect of antioxidant activity of




Fig 2 Effect of different concentrations of turmeric extract on organoleptic properties of fried potatoes (Data are expressed as mean \pm standard deviation ($n=3$), and different letters show significant difference at the 5% level in Tukey's test ($p < 0.05$))

۴-نتیجه‌گیری کلی

طبق نتایج به دست آمده؛ غوطه‌وری نمونه‌های سیب‌زمینی در محلول‌های عصاره زردچوبه باعث افزایش محتوای رطوبت در سیب‌زمینی‌های سرخ شده گشت که این امر باعث حفظ بافت و کاهش چروکیدگی با افزایش غلظت عصاره زردچوبه گردید. همچنین استفاده از عصاره زردچوبه در غلظت‌های مختلف باعث کاهش مقدار جذب روغن توسط نمونه‌ها شد که این امر با افزایش رطوبت موجود قابل توجیه بود. غوطه‌وری در محلول‌های عصاره زردچوبه منجر به کاهش محتوای آکریل آمید در سیب زمینی سرخ کرده شد که این کاهش تحت تاثیر غلظت مورد استفاده قرار گرفت. به طور کلی نمونه سیب‌زمینی سرخ شده با استفاده از غوطه‌وری در محلول عصاره زردچوبه ۱۰ درصد از نظر حفظ ویژگی‌های کیفی (جذب روغن، میزان رطوبت و چروکیدگی)، رنگ، بافت و امتیاز ویژگی‌های حسی ارزیابی شده توسط ارزیاب‌ها به عنوان بهترین نمونه معرفی گردید.

۵- منابع

- [1] Garmakhany AD, Mirzaei HO, Maghsoudlou Y, Kashaninejad M, Jafari SM. Influence of partial drying on oil uptake & quality attributes of french fries. *J Agric Sci Technol.* 2010;4(1):31–6 .
- [2] Tabibiazar, M, Roufegari-nejad, L,

- Hosseini F, Bulurian S. Comparison of Turmeric Curcumin Antioxidant Efficacy with Natural And synthesis Antioxidants in the food model system (soybean oil). *J Innov Food Sci Technol.* 2013;5(1):13–22 .
- [23] Qaghbarbeigi P, Kamkar A, Jannat B, Haj Hosseini Babaei A. Inhibitory effects of rosemary extract and vitamins niacin (B3) and pyridoxine (B6) on acrylamide formation in potato chips. *Iran J Nutr Sci Food Technol.* 2012;7(2):67–74 .
- [24] Basuny AMM, Arafat SM. Reduction of acrylamide formation, polymer compounds and oil uptake in potato slices during frying. *Curr Res Microbiol Biotechnol.* 2013;1(3):111–8 .
- [25] Rahbar Imani T, Roufegari-Nejad L. Reduction of acrylamide under different pretreatments in French fries. *J Food Hyg.* 2016;21(1):1–15 .
- [26] Andreadis I. A color coordinate normalizer chip. *J Intell Robot Syst.* 2000;28(1–2):181–96 .
- [27] Fellows PJ. Food processing technology: principles and practice. Woodhead Publishing; 2000. 6008 p .
- [28] Falguera V, Quintero JP, Jiménez A, Muñoz JA, Ibarz A. Edible films and coatings: Structures, active functions and trends in their use. *Trends Food Sci Technol.* 2011;22(6):292–303 .
- [29] Zhang Y, Zhang Y. Study on reduction of acrylamide in fried bread sticks by addition of antioxidant of bamboo leaves and extract of green tea. *Asia Pac J Clin Nutr.* 2007;16(SUPPL.1):131–6 .
- shallot extract (*Allium ascalonicum*), turmeric extract and their composition on changes of lipids in rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) vacuum packaged. *Iran J FOOD Sci Technol.* 2011;8(28):47–56 .
- [16] Mohammad Ali Nejad S, Dehgannia J, Jalali S. The Effect of Integrated Frequencies and Time of Ultrasonic Application on Oil Absorption during Frying Potatoes. *Iran J Biosyst Eng.* 2018;49(1):35–47 .
- [17] Alipore M, Kashani Nezhad M, Maghsudlo Y, Jafari M. Effect of carrageenan, oil temperature and frying time on oil absorption in fried potato products. *Iran Food Sci Technol Res J.* 2009;5(1):21–7 .
- [18] Cunniff P. Association of Official Analytical Chemists.(1995). Off methods Anal AOAC Int (Washington, DC Assoc Off Anal Chem .
- [19] Mousavi Kalajahi SE, Asefi N, Soofi M. Optimization of different pretreatments including blanching, soaking in different concentration of sodium chloride solution and vacuum drying on oil uptake and quality features of deepfried eggplant. *Iran J Food Sci Technol.* 2019;16(89):71–84 .
- [20] Ziaifar AM, Courtois F, Trystram G. Porosity development and its effect on oil uptake during frying process. *J Food Process Eng.* 2010;33(2):191–212 .
- [21] Suárez RB, Campañone LA, García MA, Zaritzky NE. Comparison of the deep frying process in coated and uncoated dough systems. *J Food Eng.* 2008;84(3):383–93 .
- [22] Eshgi N, Hadad Khodaparast MH,

Iranian Journal of Food Science and Technology

Homepage:www.fsct.modares.ir



Scientific Research

Effect of turmeric extract (*Curcuma Longa L.*) on acrylamide content and quality characteristics of fried potatoes

Soroushfard, A.¹, Rufegarinejad, L.^{2*}, Soofi, M.³

1. M.Sc in Food Science and Technology, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz, Iran.
2. Associate Prof, Dept. of Food Science and Technology, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz, Iran.
3. Ph.D in Food Science and Technology, Research and Development Department, AsiaShoor Company, Tabriz, Iran.

ARTICIE INFO

ABSTRACT

Article History:

Received 2020/12/31
Accepted 2021/02/20

Keywords:

Acrylamide,
Curcumin extract,
Fried potato.

DOI: [10.52547/fsct.18.05.14](https://doi.org/10.52547/fsct.18.05.14)

*Corresponding Author E-Mail:
l.roufegari@iaut.ac.ir

Due to the progressive consumption of fried food products in the country, the increase of quality and oil uptake reduction is necessary. As a potent human toxicant, acrylamide is present in different heated food products, with unexpectedly high levels in potato products such as french fries. Prevention of acrylamide formation in food could minimize its dietary exposure and decrease its potential health risks to humans. For this purpose, blanched potato slices were immersed in curcumin extracts (0, 5, and 10% w/w) for 15 minutes, followed by frying in oil. Water content, oil uptake, shrinkage, color (L*, a*, b*), acrylamide content, and sensory properties were analyzed. The results showed that increasing curcumin concentration increased the water content and decreased the oil uptake and shrinkage in all samples. Color parameters indicated that L* and a* of the potatoes decreased by increasing curcumin extract concentrations, but b* was increased. The immersion in a solution of curcumin extract reduced the content of acrylamide in french fries significantly. As the increasing concentration of curcumin up to 10%, the amount of acrylamide decreased by 47% compared to the control sample. Sensory characteristics (appearance, smell, taste) except flavor at a concentration of 10% curcumin extract improved with increasing extract concentration. Using curcumin extract and improving the quality and sensory properties led to a significant reduction in fried potatoes' acrylamide formation. They could be suggested as a method to reduce the construction of this toxic compound.