

علمی پژوهشی

بررسی اثر بسته بندی اتمسفر اصلاح شده بر روی ماندگاری نان تافتون

^۳ معصومه شفیعی^۱، محمد سعید یارمند^{۲*}، محمد علی ابراهیم زاده موسوی^۳

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد پردازی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

۲- دانشیار پردازش کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

۳- استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

(تاریخ دریافت: ۹۸/۰۵/۰۷ - تاریخ پذیرش: ۹۸/۰۷/۰۱)

حکیمہ

در این تحقیق چهار آتمسفر CO_2 (۱۰۰٪)، $\text{N}_2\text{-}\text{CO}_2$ (۳۰٪-۷۰٪) و آتمسفر معمولی و شرایط نگهداری در سفره به عنوان شاهد جهت بررسی روند بیاتی و رتوگرادسیون نشاسته، مانندگاری و رشد کپکها در نان تأثیرات استفاده شدند. نتایج نشان داد که زمان مانندگاری نانها تا حداقل هفده روز با استفاده از بسته‌بندی آتمسفر اصلاح شده با غاظتهای بالای دی‌اکسید کربن و بسته‌های با نفوذ ناپذیری بالا به دست آمد. اختلاف معنی‌داری در سفتی نان‌های نگهداری شده در سفره با سایر تیمارها به دست آمد. به علاوه افزایش سفتی نان‌های بسته‌بندی شده در آتمسفر معمولی در مقایسه با نان‌های بسته‌بندی شده در آتمسفر اصلاح شده بیشتر بود. اختلاف معنی‌داری بین نمونه‌های بسته‌بندی شده تحت تیمارهای اول، دوم و سوم وجود نداشت.

آتمسفر اصلاح شده را بالا برد و از رشد کپکها جلوگیری نمود.

کلید واژگان: بسته‌بندی آتمسفر اصلاح شده، نان‌های مسطح، نانتافتون، پیاتوی

* مسئول مکاتبات: myarmand@ut.ac.ir

رشد ارگانیسم‌های هوایی خاص می‌شود [۴]. به همین دلیل یک افزایش تقاضا برای نگهداری نان در آتمسفرهای اصلاح شده، که غالباً ترکیبی از دی اکسید کربن تنها یا مخلوط‌هایی از دی اکسید کربن و نیتروژن است، وجود دارد. دی اکسید کربن نسبت به نیتروژن اثر بازدارنده‌گی بیشتری روی کپک‌ها نشان داده است. بهر حال اثر MAP روی تغییرات کیفیت فیزیکو-شیمیایی اتفاق افتاده در طی انبارمانی نان سوال برانگیز است [۵]. محققین نشان دادند که سفتی مغز نان سفید یا نان حاصل از آرد کامل انبار شده در دی اکسید کربن برای ۱۴ روز کمتر از نان انبار شده در نیتروژن یا در آتمسفر هوا بود [۶]. نتایج مشابهی توسط محققین دیگر به دست آمد که دریافتند سفتی مغز نان‌قالبی سفید انبار شده در CO₂ برای ۱۰ روز در مقایسه با نان انبار شده در آتمسفر هوا کمتر بود [۲] و [۷]. برخلاف این یافته‌ها، Black *et al.*, (۱۹۹۳) هیچ تفاوتی در نرخ سفت شدن نان پیتای انبار شده در CO₂ یا هوای آتمسفری برای ۱۴ روز نیافت [۴] و [۸].

Rasmussen *et al.*, (۲۰۰۰) بسته‌بندی آتمسفر اصلاح شده در طی انبار نان بری هفت روز در درجه سانتی‌گراد در مقایسه با نان شاهد نیافتند. مکانیسم سفت شدن نان پیچیده است و به خوبی درک نشده است. Platt و همکاران وی در سال ۱۹۴۰ یک همبستگی شدید بین نرخ بیاتی نان و محتوای رطوبت دریافتند [۸]. همچنین محققین دیگر نتیجه گرفتند که نان با محتوی رطوبت بالاتر به طور قابل توجهی تازه‌تر از نان با محتوی پائین‌تر بود [۳]. Fernandez و همکاران (۲۰۰۶) بکار بردن آتمسفر اصلاح شده را دلیل اشکاری برای بالا بردن زمان ماندگاری نان سویا دانستند [۹].

همتیان سورکی و همکاران وی در سال ۲۰۱۰ بیاتی و کیفیت نان مسطح ایرانی را بررسی کردند که در آتمسفر اصلاح شده نگهداری شده و بسته بندی‌های متفاوتی داشته و تاثیر آتمسفر اصلاح شده را روی روند بیاتی و کیفیت نان‌های ایرانی بسیار مطلوب گزارش کردند و بدینوسیله قابلیت ماندگاری را از ۴ روز به ۲۱ روز رساندند [۱۰]. Degirmencioglu و همکاران (۲۰۱۶) اثر آتمسفر اصلاح شده و سوربات پاتسیم را بر روی ویژگی‌های میکروبی نان ورقه شده یا اسلامیس شده مطالعه کردند. در بین ترکیب گازها، صد درصد گاز CO₂ بهترین تاثیر را در ممانعت کردن رشد باکتری داشت [۱۱]. مطالعاتی بر روی

۱- مقدمه

نان همواره در رژیم غذایی روزانه جایگاه ویژه‌ای داشته است با توجه به گرایش جامعه به مصرف نان تازه بهبود کیفیت آن اهمیت خاصی پیدا می‌کند. نان‌های مسطح احتمالاً قدیمی‌ترین متنوع‌ترین و رایج‌ترین تولیدات نان در جهان هستند و عمده نان‌های مصرف کشور ما نیز نان‌های مسطح هستند که سهم مهمی از غذای روزانه را در بر می‌گیرند. مشکل کیفیت پایین و ضایعات نان مسطح از مسائلی است که اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست و سالیانه مبالغه هنگفتی از درآمد ملی کشور به دلیل ضایعات گندم و نان هدر می‌رود البته سیاست یارانه‌ها به میزان کمی از ضایعات کاسته است ولی باز هم در اثر تولید غیر اصولی و نگهداری نادرست این محصول، سالیانه درصد بالایی از می‌رود [۱]. زمان ماندگاری نان به طور کلی توسط دو فاکتور اصلی فساد میکروبی و بیاتی محدود می‌شود. نان بعد از پخت عاری از کپک‌ها و باکتری‌های زنده است، اما به دلیل داشتن رطوبت و pH مناسب، محیط مستعدی برای رشد کپک‌هاست. پس از پخت تغییرات فیزیکو-شیمیایی مختلفی در نان اتفاق می‌افتد که منجر به بروز تغییرات در پوسته و بافت داخلی نان می‌شود که اصطلاحاً به آن بیاتی می‌گویند. طی بیاتی ویژگی‌های کیفی نان از قبیل بو، طعم و مزه و قابلیت جویاند محصول تغییر می‌کند. کپک‌زدگی و بیاتی نان منجر به کاهش قابلیت قبول نان توسط مصرف کننده و افزایش افت اقتصادی می‌شوند [۲]. یکی از جدیدترین روش‌های بسته‌بندی در دسترس که امروزه به طور وسیعی در بسیاری از انواع محصولات غذایی استفاده می‌شود، به عنوان بسته‌بندی آتمسفر اصلاح شده (MAP)^۱ شناخته شده است. این تکنیک بسته‌بندی از طریق تغییر و اصلاح مقادیر گازهای آتمسفری احاطه کننده ماده غذایی قادر به گسترش قابل توجه زمان ماندگاری محصولات می‌شود [۳].

بسته‌بندی آتمسفر اصلاح شده (MAP) نان برای افزایش قابلیت ماندگاری میکروبی شناخته شده است. اگرچه دی اکسید کربن برای میکرووارگانیسم‌ها کشنده و مهلك شناخته نشده است، هر دوی خصوصیات ضد باکتریاییو^۲ ضد قارچیرا نشان داده و مانع

1. Modified Atmosphere Packaging

2. Bacteriostatic

3. Fungistatic

برای بسته‌بندی نان از فیلم پلیمری مرکب از جنس پلی آمید-پلی اتیلن با ضخامت ۵۰ میکرون استفاده شد.

۳-۲- گازهای موجود در فضای خالی بسته‌بندی

گازهای مورد استفاده در آتمسفرهای اصلاح شده بسته‌بندی نان تأثیر نداشتند.

تأثیر نداشتند.

۱۰۰٪ CO₂ (تیمار۱)، ۷۰٪ N₂-۳۰٪ CO₂ (تیمار۲)، ۷۰٪ N₂-۳۰٪ CO₂ (تیمار۳) و آتمسفر معمولی (تیمار۴) بود و از شرایط سفره برای نگهداری نمونه‌های شاهد استفاده شد.

۴- تهیه و بسته‌بندی نان

نان تأثیر نداشتند.

نمونه‌ها به اندازه کافی خنک شدند و به آزمایشگاه بسته‌بندی برده شدند و در ابعاد ۱۵×۱۰ cm برش خوردن، سپس در کيسه‌های Turbovac بسته‌بندی قرار گرفتند و توسط دستگاه بسته‌بندی Turbovac مدل A200، برنامه‌ریزی شده برای تشکیل و تزریق گازهای headspace در کيسه‌های بسته‌بندی قرار داده شدند.

۵-۲- تعیین میزان رطوبت

این آزمون در دو مرحله بر اساس استاندارد AACC به شماره ۱۵-۴۴ صورت گرفت.

۶- آزمون‌های رئولوژی خمیر

برای آزمون‌های رئولوژی از فارینوگراف برابندر و اکستنسوگراف برابندر ساخت کشور آلمان استفاده شد.

۷-۲- تعیین سفتی نان

تغییرات ناشی از بیانی در بافت نان تأثیر نداشتند.

برشی (Shear Value) انجام گرفت. اثر دستگاه آنالیز کننده بافت مدل Testometric M350-10CT جهت اندازه‌گیری نیروی موردنیاز برای برش نمونه‌های نان استفاده شد.

آزمون تعیین نیروی برشی با فک Warner Bratzler با Load cell 500 Top speed 300 انجام گرفت.

با توجه به ضخامت کم نان تأثیر نداشتند.

آنچه انجام آزمون قابلیت نفوذ میسر نبود.

۸- آزمون گرماسنج روبشی تفاضلی (DSC)

در این پژوهش نظر به این که تیمارهای دیگر نتیجه چندان قابل اطمینان نداشتند لذا تیمار ۲ (۷۰٪ N₂-۳۰٪ CO₂) و نمونه شاهد

اثرات نوع بسته‌بندی و آتمسفر اصلاح شده بر روی خصوصیات نان گندم غنی شده با آرد سویا توسط دیگر محققین انجام گردید (۲۰۱۹)، افزایش کیفیت نان گندم و بالا رفتن زمان ماندگاری از نتایج این تحقیق بود [۱۲].

Avital و دستیار وی اثر آتمسفر اصلاح شده را بر روی نان پیتا به عنوان نان مسطح مورد بررسی قرار دادند و قابلت ماندگاری بهتری را دریافتند [۱۳] و همکاران نیز بر روی طول عمر نگهداری نان پیتا از طریق بکار گیری آتمسفر اصلاح شده مطالعاتی انجام دادند و نتایج رضابتهایی بدست آوردند [۱۴].

هدف مطالعه در این پژوهش ارزیابی اثر بسته‌بندی آتمسفر اصلاح شده روی بیانی و زمان ماندگاری میکروبی نان تأثیر نداشتند.

نخ بیانی نان بوسیله تغییرات در سفتی و رتروگراداسیون نشاسته و کترول رشد میکروبی به صورت مشاهده ظاهری کم ارزیابی شد. برای دستیابی به این هدف، مطالعات زمان ماندگاری یک دوره نگهداری ۱۷ روزه در نظر گرفته شد.

نوع بسته‌بندی انتخاب شده و درصد های مختلف گاز به کار رفته جهت آتمسفر اصلاح شده از مزایای این تحقیق به شمار می‌آیند.

ناگفته نماند که در کنار نان سفتی، نان صنعتی جایگاه خود را پیدا کرده است. لذا روز بروز مسئله بسته بندی نان صنعتی بیشتر مطرح می‌شود.

۲- مواد و روش‌ها

۲-۱- مواد

آرد کامل گندم برای تهیه نان تأثیر نداشتند.

تغییرات ناشی از بیانی در بافت نان تأثیر نداشتند.

برشی (Shear Value) انجام گرفت. اثر دستگاه آنالیز کننده بافت مدل Testometric M350-10CT جهت اندازه‌گیری نیروی موردنیاز برای برش نمونه‌های نان استفاده شد.

آزمون تعیین نیروی برشی با فک Warner Bratzler با Load cell 500 Top speed 300 انجام گرفت.

با توجه به ضخامت کم نان تأثیر نداشتند.

آنچه انجام آزمون قابلیت نفوذ میسر نبود.

شرکت‌های مشهور تهیه شدند.

۲-۲- مواد بسته بندی

نتایج ارزیابی ویژگی‌های مکانیکی و شیمیایی نان‌ها در سه تکرار استفاده شد و در صورت معنی دار بودن نتایج آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) برای مقایسه میانگین‌ها آزمون دانکن در سطح اطمینان ۹۵ درصد انجام شد. برای آنالیز اطلاعات به دست آمده نرم افزار (V.13) SPSS به کار رفت.

۱۱-۲ رشد میکروبی

نان‌های بسته‌بندی شده و شاهد طی روزهای نگهداری بصورت ظاهری از نظر رشد کپک بررسی شدند. Shelf life میکروبی به صورت دوره زمانی از روز بسته‌بندی تا روز مشاهده‌ی رشد میکروبی ملاحظه شد^[۹]. زمانی که نان علائم مشهودی از کپک‌زدگی نشان می‌داد، غیر قابل قبول محسوب می‌شد. شمارش میکروبیکشت خالص به دو دلیل انجام نمی‌شد: اول اینکه، در طی فاز هموژنیزاسیون، میسلاً نیز می‌شکند، و واحدهای تشکیل کلنی (cfu) به تعداد زیادی افزایش می‌یابد^[۱۲ و ۹]. دوم اینکه، از آنجایی که ورقه‌های نان بطور یکنواخت آلوده‌نمی‌شوند، برآورده شمارش میکروبی میانگین بین‌گر آلودگی میکروبی محلی نخواهد بود. در واقع روش استفاده شده در این پژوهش برای تعیین فساد میکروبی نان به استنباط مصرف‌کننده از کیفیت نان بسیار نزدیک است^[۹].

۳- نتایج و بحث

۱-۳ نتایج آزمونهای آرد

آنالیز تقریبی نمونه آرد نشان میدهد که میزان رطوبت در آرد مورد مصرف برای تهیه نان تأثیرنداز ۰.۱۲ درصد می‌باشد. میزان پروتئین ۱۱.۶۵ درصد و میزان چربی ۲.۸ درصد و میزان خاکستر بدست آمده ۱.۶ درصد بود (جدول ۱).

در روزهای اول و نهم برای انجام آزمون DSC انتخاب شدند. دمای نمونه‌ها از صفر تا ۱۸۰ درجه سانتی‌گراد با سرعت ۱۰ درجه در دقیقه افزایش یافت.

۴-۹ ارزیابی حسی

به منظور تجزیه حسی نمونه نان دو روش آزمون مقایسه چندگانه و آزمون اختصاص امتیاز استفاده شدند. در این رابطه از حداقل ۱۶ تا ۱۹ نفر اعضای پانل کمک گرفته شد و با به کار بردن آزمون مقایسه چندگانه خصوصیاتی مانند شکل ظاهری، عطر و بو، بافت، قابلیت جویدن و طعم و مزه نان به طور همزمان تحت بررسی قرار گرفتند و آزمون اختصاص امتیاز برای تعیین میزان بیاتی نان در روزهای ۱، ۳، ۶، ۹ و ۱۳ و بعد از بسته‌بندی مورد استفاده قرار گرفت. در آزمون مقایسه چندگانه، تعدادی نان با کدهای مشخص به اعضای گروه ارزیابی حسی داده شد و از آنها خواسته شد تا نان‌های کددار را با نان شاهد مقایسه نموده و به سوالات مندرج در پرسشنامه‌ها پاسخ دهند. پاسخنامه‌های مزبور از یک سری واژه‌های توصیفی استفاده گردید که پس از انجام آزمون، بر حسب قرارداد به هر یک از آنها امتیازی تعلق می‌گیرد. در این آزمون نحوه امتیاز دادن بدین ترتیب است که در صورت وجود تشابه بین نمونه مورد آزمایش، نمونه شاهد امتیاز ۵ و در صورت بهتر بودن بر حسب میزان تفاوت، امتیازهای ۶ تا ۹ و در صورت بهتر نبودن، امتیازهای ۱ تا ۴ به نمونه‌ها تعلق می‌گیرد. در آزمون اختصاص امتیاز که برای ارزیابی بیاتی نان انجام پذیرفت، امتیازاتی در نظر گرفته شدند که هر یک مشخص کننده درجه‌ای از بیاتی نان بودند و داوران با انتخاب آنها میزان بیات شدن را در پرسشنامه مخصوص آن معکوس می‌سازند این روش نخستین بار توسط Bechtel و Meisner در سال ۱۹۵۴ مورد استفاده قرار گرفت^[۳].

۱۰-۲ آنالیزهای آماری

در این تحقیق از طرح فاکتوریال کاملاً تصادفی به منظور مقایسه


Table 1 Chemical components of flour (%)

fat	protein	ash	moisture	sample
2.8	11.65	1.6	12.5	Complete flour


Table 2 Results of farinograph for evaluation of dough rheological characteristics

FQN (mm)	Degree of softening after 20 min	Degree of softening after 10 min	Dough stability (min)	Dough development (time (min))	Water absorption (%)	sample
56	65	30	9	0	66.5	Complete flour

از بررسی نتایج آزمون فارینوگراف آرد کامل مشخص شد که آرد کامل بدلیل داشتن مقدار جذب آب $66/5$ درصد و ارزش والوریمتری بیشتر (۶۱) نسبت به آردهای دیگر قوی تر است و میزان پروتئین آرد در این رابطه نقش مهمی بازی می‌کند. یعنی هر چه میزان پروتئین و سبوس آرد بیشتر باشد میزان جذب آب $66/5$ درصد آرد بیشتر و درنتیجه آرد قوی تر و بهتر ارزیابی می‌شود. فاکتورهای ارائه شده بوسیله فارینوگراف در مرحله تهیه خمیر مشخص کننده ویژگی‌های رئولوژیکی خمیر هستند (جدول ۲). زمان گسترش خمیر ۵ دقیقه و زمان مقاومت خمیر ۹ دقیقه بدست آمده است که زمان‌های بدست آمده دلالت بر قوی بودن آرد مورد استفاده در نان تافتون دارد (شکل ۱).

**Fig 1** Farinogram of complete flour**Table 3** Results of Extensograph for dough (135 min for time of fermentation)

S (cm ²)	Ratio of dough resistance to extension to dough extension	Dough extension ability (mm)	Dough resistance to extension (BU)	sample
46	1.64	140	230	Complete flour

**Fig 2** Extensogram of complete flour

نتایج آزمون اکستنسوگراف آرد نان تافتون نشان می‌دهد که آرد کامل دارای مقاومت به کشش بیشتر و قابلیت کشش کمتری است. سطح زیر منحنی برای آرد کامل ۴۶ سانتیمتر مربع بدست آمد که معرف میزان انرژی بالای بکار رفته در اکستنسوگراف است. قابلیت کشش خمیر ۱۴۰ میلیمتر و مقاومت به کشش خمیر آن واحد برابر بدست آمد. با توجه به این یافته‌ها و همچنین با توجه به اکستنسوگرام‌های بدست آمده برای آرد می‌توان گفت که آرد کامل، از نظر رئولوژیکی آرد قوی محسوب می‌شود (جدول ۳ و شکل ۲).

دسترس آمیلوپکتین و بلوکه شدن آن و در نتیجه کاهش پیوند هیدروژنی بین ساخته های آمیلوپکتین عنوان کردند و بدین ترتیب CO_2 را عاملی برای به تاخیر انداختن بیاتی نان معرفی نمودند.

۳-۳- تعیین سفتی نان

جهت بررسی سفتی و خصوصیات مکانیکی نان تافتون ویژگی هایی نظیر نیروی برشی و نیروی کششی اندازه گیری گردید.

۴-۳- نیروی برشی

نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری بین تیمارها در روز های مختلف نگهداری در سطح احتمال ۵ درصد وجود ندارد. در روز اول نگهداری تفاوت معنی داری بین نمونه شاهد و تیمارها ملاحظه نشد. در روز سوم نگهداری تفاوت کمی مشاهده شد اما از روز ششم بعد تا روز هفدهم روند افزایشی سریعی در نمونه شاهد و هم در تیمار های مختلف مشاهده گردید که این روند به مراتب در شاهد بیشتر از تیمارها بود. ولی با وجود این، روند افزایشی در بین تیمارهای مختلف بطرز یکسانی انجام پذیرفت.

نمونه نان شاهد بدلیل اینکه نان مورد استفاده بوده و در سفره و به همان روش سنتی پوشش داده شده، لذا دارای افت سریع رطوبت شده که نهایتا منجر به سفتی و بیاتی نان تافتون شده است. اما در تیمار های بکار رفته چون نوع پوشش نان به طریق صنعتی و مجهز به اتمسفر اصلاح شده بوده، نان کمتر سفت شده یا به عبارت دیگر کمتر بیات شده و از نیروی برش کمتری برای آن استفاده شده است.




Fig 4 Applied cuttingforces for Taftoon during storage

۲-۳- افت رطوبت

در روز اول و سوم نگهداری نان، افت رطوبت تفاوت چندانی بین نمونه شاهد و تیمارها از خود نشان نداد. در روز ششم نگهداری درصد رطوبت نان شاهد به ۱۷/۶٪ درصد می‌رسد در حالی که درصدهای رطوبت نمونه‌های تیمارهای مختلف به بالاتر از آن می‌رسد که نشان می‌دهد تیمارها رطوبت بیشتری را حفظ کرده و از این نظر قابلیت ماندگاری نان را به افزایش است. در روز نهم نگهداری درصد رطوبت نان به ۱۵/۴٪ درصد می‌رسد ولی در تیمارهای ۱ و ۲ و ۳ به بالای ۱۷ درصد می‌یابد و در تیمار چهارم به ۱۶/۶٪ درصد می‌رسد. حفظ رطوبت بالا نتیجه خوبی است که از این تحقیق جهت قابلیت ماندگاری بهتر به دست آمده در روز سیزدهم باز هم نمونه شاهد افت رطوبت بیشتری پیدا کرده و به ۱۳/۴٪ درصد می‌رسد و حال آنکه تیمارهای ۲، ۳ و ۴ به بالای ۱۵٪ می‌رسند حتی تیمار ۴ به ۱۴/۷٪ درصد بررسد.

از آنجا که افت رطوبت یکی از دلایل بارز بیاتی نان محسوب می‌شود تیمارهای به کار رفته نشان داده که می‌تواند روند افت یا کاهش رطوبت را نسبت به نمونه شاهد کند نماید و همین مسئله بیاتی نان تافتون را به تاخیر انداخته و اهمیت زیادی از نظر تکنولوژی نگهداری و بسته بندی نان تافتون دارد.




Fig 4 Moisture reduction for different treatments during storage

نتایج مشابهی توسط Avital و همکاران در سال ۱۹۹۰ بدست آمد [۲]. در این تحقیق ظرفیت نگهداری آب و درصد رطوبت نان بسته بندی شده در آتمسفر CO_2 بیشتر از نان بسته بندی شده در شرایط معمولی بود. دلیل آن را ترکیب CO_2 با مکان های قابل

۶-۳- آزمون گرماسنج روبشی تفاضلی (DSC)

نتایج آنتالپی مربوط به رتروگراداسیون حاصل از آزمایش نان تافتون شاهد و نان های بسته بندی شده تحت تیمار $70\text{CO}_2\%/\text{N}_2\%/\text{O}_2\%$ ، به وسیله دستگاه DSC به صورت جدول ۴ می باشد.

Table 4 Enthalpy of Taftoon bread at first and ninth days

Ninth day	First day	
370.499	215.749	Treatment 2
236.714	245.653	control

به طور کلی نتایج نشان می دهد که تغییر آنتالپی در مدت نگهداری نان تافتون روال منظم و قابل استنادی ندارد و در روز اول مقدار جزئی کمتر از نمونه شاهد است ولی در روز نهم به میزان مشخصی افزایش یافته است. مقدادر بدست آمده به دلیل ضخامت کم و دمای زیاد تنور، ناشی از کاهش رطوبت نمونه ها می باشد آنچه مسلم است رتروگراداسیون نشاسته بافت نان تافتون در نتایج بدست آمده روز نهم تاثیر داشته است (شکل ۷). پژوهش پاتل و همکارانش این نتایج را تایید می کند. آنها تاثیر اندازه خمیر، درجه حرارت و مدت زمان پخت را بر روی مقدار آنتالپی مورد بررسی قرار دادند و اثبات کردند که گرانول های نشاسته کیفیت نان و مغز آن را تعیین می کند. به طوریکه افزایش حرارت دهی موجب کاهش بیشتر رطوبت، کریستالیزاسیون آیلوپکتین و کیفیت نان می شود [۹].




Fig 7 Enthalpy of Taftoon bread

۵-۳- نیروی کششی

نتایج تجزیه واریانس آنالیز حداقل نیروی مورد نیاز جهت کشیدن یک نوار از نان تافتون به ابعاد $10 \times 2 \text{ cm}$ بین دو فک مخصوصاً تا زمان پاره شدن نمونه های نان تافتون نشان داد که اختلاف معنی داری بین تیمارها در روزهای مختلف نگهداری در سطح احتمال ۵ درصد وجود دارد. نتایج مقایسه میانگین تیمارهای نان تافتون نشان می دهد که در روز اول نگهداری بین تیمارهای اختلاف معنی داری در مقدار نیروی بکار رفته وجود ندارد. از روز سوم نگهداری تا پایان دوره انبارمانی، نمونه شاهد بیشترین مقدار نیرو را داشت بطوریکه در روز ششم نمونه شاهد $3/83$ نیوتون و تیمارهای دیگر بطور متوسط $2/66$ نیوتون را نشان دادند. و روز نهم نگهداری نمونه شاهد $4/56$ نیوتون و میانگین نیروی کششی سایر تیمار ها $13/3$ نیوتون بود. در روز سیزدهم نیروی کششی برای شاهد به $4/99$ و برای سایر تیمارها به $3/5$ و $3/84$ نیوتون میرسد. و در آخر دوره نگهداری یعنی روز هفدهم برای شاهد به $5/58$ و برای بقیه تیمارها بطور متوسط به $4/23$ می رسد (شکل ۵).

نتایج آشکار می سازد که آتمسفرهای مورد استفاده در حفظ تازگی نان و نرمی بافت نان پس از گذشت زمان موثر بوده ولی نان شاهدرond بیاتی سریعی داشته و بافت سفتی بدست آورده است.




Fig 5 Applied tension forces for Taftoon during storage




Fig 8 Staling scores for preservation of Taftoon during 17 days

۲-۷-۳- ارزیابی حسی ارگانولپتیک

تیمار های مختلف نان تافتون با نمونه های شاهد در طی دوره نگهداری نشان داد که اثر بسته بندی با آتمسفر اصلاح شده بر روی شکل ظاهری نان تافتون در طی روز های اول، سوم و ششم نگهداری مشابه نمونه شاهد بودند. و در روز نهم کم تفاوت داشتند ولی در روز های سیزدهم و هفدهم شکل ظاهری تیمار های ۱ و ۲ به مراتب بهتر از نمونه شاهد بودند.

از نظر عطر و بوی نان تافتون تیمارها در روز اول، سوم و ششم کمی بهتر از نمونه شاهد بودند ولی در روز های نهم و سیزدهم و هفدهم تیمار های ۱ و ۲ به مراتب بهتر از شاهد بودند. از نظر بافت تیمارها در روز اول و سوم مشابه نمونه شاهد بودند. در روز ششم تیمار ۱ و ۲ بهتر از نمونه شاهد بودند. در روز های نهم و سیزدهم بهتر از نمونه شاهد نداشتند. اما از روز سوم تا هفدهم روند افزایشی را پیدا کردند. از نظر طعم و مزه تیمار ها در روز اول مشابه شاهد بودند و از روز سوم تا هفدهم روند افزایشی مشابه قابل جویدن داشتند البته در مورد تیمار ۴ پس از روز نهم روند کاهشی مشاهده شد. طعم و مزه در روز اول گاهی طعم ترشیدگی داشت که علت آن استفاده از مقادیر بالای دی اکسید کربن در فضای خالی بسته بود. زیرا این گاز در فاز آبی نان حل شده و تبدیل به اسید کربنیک می شود و به این صورت ایجاد طعم ترش در نان می شود.

نتایج حاصل از این قسمت پژوهش میان وقوع یک پدیده گرمگیر در نان های ایرانی است اما انتالپی نان های ایرانی طی مدت نگهداری مشابه انواع نان های حجم افزایش نیافت علت آنرا می توان تفاوت نان های مسطح و حجمی دانست. این دو نوع نان از نظر مواد اولیه، فرمولاسیون، مراحل تولید و به ویژه شکل و ضخامت با یکدیگر فرق می کنند. لذا مدل تغییرات آنها طی مدت نگهداری یکسان نیست. کریستالیزاسیون آمیلوپیکتین پدیده ای آشکار در مدت نگهداری نان های حجمی است در صورتیکه این واکنش در نان های مسطح ایرانی مشاهده نشد. با افزایش ضخامت نان، نشاسته کمتر در معرض دمای پخت قرار می گیرد و در حین نگهداری به شدت کریستالت شود. به عبارت دیگر با زیاد شدن ضخامت نان مقدار انتالپی آن نیز افزایش می یابد. در نان های مورد بررسی در این پژوهش نسبت پوسته به غز بسیار بیشتر از نان های حجمی است. این سطح زیاد خروج رطوبت را سرعت می بخشد و تغییرات بوجود آمده بیشتر تحت تاثیر کاهش رطوبت قرار می گیرد.

۲-۷-۳- ارزیابی حسی

۲-۷-۳-۱- ارزیابی حسی بیاتی

اثر بسته بندی با آتمسفر اصلاح شده بر روی بیاتی نان تافتون نشان داد که در روز اول نگهداری میزان کمی بیاتی نسبت به شاهد صورت گرفته است و هنوز نان تازگی خود را حفظ کرده است. در روز سوم نمونه شاهد به میزان زیادی بیات شده در حالیکه تیمار ها کمتر بیات شده اند و روند کاهشی جزیی بین تیمار ها وجود دارد. در روز ششم و هفدهم نگهداری نمونه شاهد باز هم بیشتر بیات شده اند و تیمار ها مشابهی در این دو روز قرار دارند. در روز های سیزدهم و هفدهم نمونه شاهد باز هم بیشتر بیات شده نسبت به تیمار ها و بطور کلی تیمار ها با روند کاهنده ملایم و بطرز مشابهی با یکدیگر بیات شده اند (شکل ۸).

با توجه به این نتایج می توان اظهار داشت که استفاده از کیسه های پلی اتیلن - پلی آمید توانسته بیاتی نان ها را به تأخیر بیندازد. علاوه بر این استفاده از تیمارهای گازی بکار رفته تا حدودی سبب کاهش سرعت بیاتی در نمونه های نان ها شده است.

نمونه های بسته بندی شده تحت تیمار ۴ در روز سوم و روز هفتم نگهداری آثار رشد کپک نمایان گردید در حالیکه در نمونه شاهد در روز هفتم آثار کپک مشاهده گردید (جدول ۵).

۴- رشد میکروبی

در نمونه های نان تافتون بسته بندی شده تحت تیمارهای ۱، ۲ و ۳ تا پایان دوره انبار هیچگونه رشد میکروبی مشاهده نشد. در

Table 5 Evaluation of Taftoon for appearance growth of molds

Seventeen day	Thirteen day	Ninth day	Sixth day	Third day	First day	
-	-	-	-	-	-	treatment 1
-	-	-	-	-	-	Treatment2
-	-	-	-	-	-	Treatment 3
+	+	-	-	-	-	Treatment 4
+	-	-	-	-	-	Control

بررسی ظاهری کپک زدگی نان ها نیز مشاهده شد که در نان های بسته بندی شده در غلظت های بالای دی اکسید کربن تا حداقل ۱۷ روز کپک ها رشد نکردن در صورتیکه نان های بسته بندی شده تحت اتمسفر هوای معمولی همزمان با نمونه های شاهد کپک زدند. بعلاوه، نتایج حاصل از آزمون های مکانیکی انجام شده بوسیله دستگاه اینستران نشان داد که بسته بندی اتمسفر اصلاح شده توانسته است بیاتی نان را به تأخیر بیندازد که علت این امر احتمالاً ترکیب CO_2 با مکان های قابل دسترس آمیلوپکتین و بلوکه شدن آن و در نتیجه کاهش پیوند هیدروژنی بین شاخه های آمیلوپکتین می باشد.

آنچه مسلم است بکار بردن ترکیب گازهای مختلف در این خصوص می تواند زمینه تحقیقات دیگری را برای نگهداری و قابلیت ماندگاری نان تافتون فراهم سازد.

۶- منابع

- [1] Moassesi et al. (1994) Chemical composition, nutritional value and quality parameters of Iranian traditional breads, Research center for bread and cereals, Tehran, Iran.
- [2] Avital, Y., Mannheim, C.H., Miltz, J (1990): Effect of carbon dioxideatmosphere on staling and water relations in bread .Journal of FoodScience .55(2), 413-416.
- [3] Bechtel, W.G., & Meisner, D.F. (1954): Staling studies of bread made with flour fractions .III .Effect of crumb moisture and starch .Cereal Chemistry .31: 176.

و Knorr (1985) Tomlins CO₂ از رشد کپک جلوگیری می کند [۵]. نتایج مشابهی توسط Black et al (1993)، et al Conic (1996)، et al Leushner (1999)، et al Hansen (2000) گزارش شد که همه نشان دهنده خاصیت ممانعت کنندگی دی اکسید کربن از رشد کپک بودند. [۱۵][۱۶][۱۷]. Valsek نیز در تحقیق خود اثر ممانعت کنندگی رشد کپک را بدست آورد [۱۷].

۵- نتیجه گیری کلی

در این پژوهش سعی بر این بود تا از طریق بسته بندی قابلیت ماندگاریکی از نان های پر مصرف ایرانی را افزایش داد و مشخص گردید که استفاده از فیلم های مرکب با نفوذ ناپذیری بالا از جمله کوپلیمر پلی آمید / پلی اتیلن به میزان زیادی می تواند مانع از دست رفتن رطوبت و توسعه بیاتی نان شود که مقایسه های میانگین نتایج آزمون درصد رطوبت نان های بسته بندی شده و نان نگهداری شده در سفره (نمونه شاهد) این اظهارات را تأیید می کند اما نکته ای که در زمینه نگهداری نان در فیلم های نفوذناپذیر مطرح می شود، تقطیر رطوبت داخل بسته ها روی محصول است که این امر زمینه ای رشد بیشتر کپک ها را فراهم می کند. به همین علت به همراه فیلم های نفوذ ناپذیر، استفاده و اضافه کردن گاز CO_2 و ترکیبی از گازهای CO_2 و N_2 به میزان کافی جهت جلوگیری از رشد کپک ها روش بسیار مناسبی برای نگهداری نان در طولانی مدت می باشد به طوری که در نتایج

- packaging and potassium sorbate on microbiological characteristics of sliced bread. *J Food Sci Technol*, 48(2): 236–241.
- [12] Kurek. M.A, Wyrwisz. J, Karp. S, Wierzbicka. A. (2019) Effect of modified atmosphere packaging on the quality of wheat bread fortified with soy flour and oat fibre. *Journal Food measurments and characterization*. Vol.13, pages : 1864 - 1872.
- [13] Avital. Y and Mannheim. C. H (1988) Modified atmosphere packaging of pita (pocket) bread. *Packaging Technology and Science. An intenational journal*. Vol.1. pages:17-23.
- [14] Hasan S. M, Al Naje. S, and Abosalloum. S.(2014) Shelf life extension of pita bread by modified atmosphere packaging. *J. Food and Dairy Science*. Vol 5(2) : 55-62.
- [15] Conic .L, Bressa F, Mdalla R,(1996) .Influence of modified atmosphere on bread staling during storage .*Italian Food & Beverage Technology*, 7, 20-24.
- [16] Leuschner, R .Ocullaghan G.K, and Avendte .E.K,(1999) .Moisture distribution and microbial quality of part baked breads as relation storage and rebaking conditiions .*Journal of Food Science*, 64.3: 543-54.
- [17] Valsek.V, Longova. J, Stencl. J(2013) Effect of modified atmosphere packaging on stability of three kinds of bread. *Acta universitatis agriculturae et silviculturae mendelianae.Brunensis*, LXI, no.6,pp, 1881-1887.
- [4] Black, R .G., Quail, K .J., Reyes, V., Kuzyk, M. and Ruddick, L.(1993): Shelf-life extension of pita bread by modified atmospherepackaging .*Food Australia* 45: 387-391.
- [5] Knorr, D .and Tomlins, R .I .(1985): Effect of carbon dioxide modifiedatmosphere on the compressibility of stored baked goods .*Journal ofFood Science* .50: 1172-1176.
- [6] Brody, A., Strupinsky, E .R., and Kline L .R. (2001): Active packagingfor food applications. CRC Press,Boca Raton, Fla
- [7] Rasmussen, P .H., Hansen, A .(2000): Staling of wheat bread stored inmodified atmosphere .*Lebensmittel-Wissenschaft & Technologie* .34:487-491.
- [8] Platt, W., & Powers, R. (1940). Compressibility of bread crumb .*Cereal Chemistry* .17: 601.
- [9] Fernandez. U, Vodovat z, Countney, P. Pascall. M. A. (2006) Extended shelf life of soy bread using modified atmosphere packaging. *J. Food Prot.* 69 (3) 693-8.
- [10] Hematian Sourki. A, Tabatabaei Yazdi. F, Ghiafeh Davoodi. M, Mortazavi. S.A, Karimi. M,Razavizadegan Jahromi. S.H, Pourfarzad. A. (2010) Staling and Quality of Iranian Flat Bread Stored at Modified Atmosphere in Different Packaging. *World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Nutrition and Food Engineering* Vol:4, No:5.
- [11] Degirmencioglu. N, Göcmen. D, Neslihan Inkaya .A, Aydin. E, Guldas. M, and Gonenc .S. (2011)Influence of modified atmosphere

Effect of Modified Athmospher Packaging on the shelf life of Iranian flat bread (Taftoon)

Shafie, M. ¹, Yarmand, M. S. ^{2*}, Ebrahimzadeh Mousavi, M. A. ³

1. graduate student, Department of Food Science & Technology, Faculty of Agriculture, Tehran University
2. Associate Professor, Department of Food Science & Technology, Faculty of Agriculture, Tehran University
3. Professor, Department of Food Science & Technology, Faculty of Agriculture, Tehran University

(Received: 2019/07/29 Accepted: 2019/09/23)

In this study investigated the use of modified atmosphere packaging (MAP) to extend the shelf life of Iranian flat bread (Taftoon).Four treatments of atmospheres including 100% CO₂, 70% CO₂ – 30% N₂, 30% CO₂ – 70% N₂ , normal air and a covered samples as a control were used .The bread samples were packaged in pouches of polyamid / polyethilen (PA/PE).Results showed that it is possible to prolong the shelf life of breads to about 17 days by using modified atmosphere packaging with high carbon dioxide concentration and high-barrier laminated .However, significant differences ($P<0.05$) were obtained in the firmness of control bread compared to another treatment.In addition, firmness rate of breaniversityds packaged in normal air during storage was more than that compared to the samples stored in MAP, but there were not significant differences between samples packaged under atmospheres 100% CO₂, 70% CO₂ – 30% N₂ and 30% CO₂ – 70% N₂.Modified atmosphere packaging extends shelf life of Taftoon as a flat bread and avoids mold growth in it.

Key words: Modified Atmosphere Packaging, Flat bread, Taftoon bread, Staling.

* Corresponding Author E-Mail Address: myarmand@ut.ac.ir