

مجله علوم و صنایع غذایی ایران

سایت مجله: www.fsct.modares.ac.ir



مقاله علمی-پژوهشی

تأثیر افزودن آرد کینوا و آرد گندم جوانه‌زده بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی کیک اسفنجی

نگین جواهری پور^۱، لیدا شاهسونی مجرد^{۲*}، شادی مهدیخانی^۳، یاسر اینانلو^۴

۱-دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

۲-استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

۳-استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

۴-کارشناسی ارشد، مدرس دانشگاه علمی کاربردی کارخانه قند کرج، کرج، ایران.

اطلاعات مقاله

تاریخ های مقاله :

تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۱۰/۲۱

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۱۲/۱۸

كلمات کلیدی:

کیک اسفنجی،

کینوا،

آرد گندم،

جوانه زنی.

DOI: [10.52547/fsct.18.119.375](https://doi.org/10.52547/fsct.18.119.375)

* مسئول مکاتبات:

Shahsavani.l@gmail.com

لینولیک و اسید لینولنیک تشکیل شده است)، املاح و ویتامین‌ها که شامل کاروتون، ویتامین E، B₁، B₆، فولیک اسید و پتوتینیک اسید می‌باشد [۱۰]. جوانه‌های غلات نسبت به دانه‌های غلات مواد مغذی بیشتری دارند. این مواد مغذی شامل ویتامین‌ها و عناصر آلی می‌باشد که پس از جوانه‌زنی افزایش می‌یابند در حالی که رافینوز و استاکیوز که موجب نفع شکم می‌شوند، کاهش می‌یابند. اضافه کردن غلات جوانه‌زده به غذا می‌تواند بافت و طعم آن را تغییر دهد. جوانه‌ها غلات ممکن است به عنوان منبع بالقوه مواد غذایی یا اجزا مغذی تلقی گردند. افزایش مواد عمل‌گرایی مثل بتاگلوکان و گاما-آمینوبوتیریک اسید^۱ (GABA) پس از جوانه‌زنی جو و همچنین ضریب قابلیت هضم مواد مانند پروتئین، فسفر و کلسیم افزایش می‌یابد. به طور کلی ارزش تغذیه‌ای گندم و جو جوانه‌زده بسیار بالاتر از حالت معمولی آن‌ها است [۱۱، ۱۲]. جوانه‌زنی میزان چربی، پروتئین و فiber خام را افزایش می‌دهد. در طی پژوهش‌های محققان مختلف، مواد ضد اکسایشی و ضد میکروبی غلات در حین جوانه زدن افزایش می‌یابند که در نهایت، موجب افزایش عمر ماندگاری غلات می‌شود [۱۳]. از مهم‌ترین خواص درمانی آرد جوانه گندم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: تقویت سیستم عصبی، ناتوانی جنسی، جلوگیری از پیری زودرس، بندآورنده خونریزی، طبیعت گرم و مدربوده و سبوس آن رفع کننده یبوست و کاهش دهنده غلظت کلسترول خون می‌باشد [۱۴]. امروزه به دلیل توجه مصرف‌کنندگان به ویژگی‌های تغذیه‌ای مواد غذایی، استفاده از غذاهای عملکرگار و سودمند افزایش یافته است. بی‌تردید تولید و عرضه محصولات غذایی سالم در حفظ سلامت جامعه مؤثر خواهد بود [۳]. در سال‌های اخیر مطالعات نشان داده است که مصرف فراورده‌های غذایی فراسودمند می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از بسیاری بیماری‌ها نظیر بیماری‌های قلبی عروقی، سرطان، دیابت و نیز پیری زودرس داشته باشد. غذاهای فراسودمند به فراورده‌ها و یا افزودنی‌های غذایی اطلاق می‌شود که علاوه بر ارزش تغذیه‌ای خود، در سلامت و بهبود عملکرد فیزیکی و ذهنی بدن به طور قابل توجهی تأثیرگذار هستند [۱۵]. Jan و همکاران [۲۰۱۷] به بررسی ویژگی‌های بافتی، حسی و آشی اکسیدانی کوکی‌های تهیه شده با استفاده از مخلوط آرد‌های گندم و کینوا پرداختند. در این مطالعه آرد گندم با

۱- مقدمه

در میان منابع پروتئینی و غلات، پروتئین گندم از نظر دارا بودن خصوصیات لازم برای درست کردن کیک منحصر بفرد است، اما به علت کیفیت تغذیه پایین‌تر نسبت به پروتئین حیوانی (کمبود اسیدهای آمینه ضروری لیزین و ترئونین) در درجه پایین‌تری از اهمیت قرار دارد. برای مثال گندم فاقد لیزین در حد مناسب است [۱]. جهت غنی سازی فرآورده‌های بر پایه آرد گندم، می‌توان از دیگر پروتئین‌های گیاهی بهره برد [۲]. ارزش غذایی بسیار بالای دانه یا بذر آن موجب مقایسه‌ی آن توسعه سازمان خاروبار جهانی (FAO) با شیر خشک گردیده است [۳]. مقدار پروتئین کینوا به واریته آن بستگی داشته و محدوده آن از ۱۰/۴ تا ۱۷ درصد پروتئین متغیر است [۴]. کینوا منع غنی پروتئین (آمینواسیدهای ضروری و غیرضروری لیزین، متیونین، سیستئین و ترئونین) مینیزیم، فiber، ویتامین ب، پاتاسیم و دیگر مواد معدنی مانند آهن است. کینوا سرشار از کربوهیدرات‌ها است. دانه کینوا دارای نشاسته کمتری نسبت به سایر غلات (گندم، جو، ذرت و برنج) است غنی از آنتی اکسیدان‌ها مثل پلی‌فنول می‌باشد [۵]. بنابراین از کینوا برای تولید محصولاتی با ارزش تغذیه‌ای بالا مانند پاستا، نان، کیک و غذای کودک و همچنین برای تولید آرد و محصولات غنی‌شده نانوایی فاقد گلوتن استفاده شده است [۶]. کینوا به عنوان پروتئین گیاهی علاوه بر کمک به رشد ارگانیسم‌های بدن، گرما و انرژی‌های بدن را حفظ کرده و یک رژیم غذایی کامل و متعادل برای همه به خصوص گیاهخواران فراهم می‌کند و همچنین به دلیل فیتواستروژن از ایجاد سرطان، بیماری‌های قلبی و عروقی و پوکی استخوان جلوگیری می‌کند [۷]. میزان فiber رژیمی کینوا در مقایسه با سایر غلات بسیار بالاتر است. حدود ۸۰ درصد فiber آن نامحلول می‌باشد [۸]. به دلیل فاقد گلوتن بودن کینوا اخیراً به عنوان جایگزینی برای غلات رایج، برای افراد مبتلا به بیماری سلیاک استفاده می‌شود [۹]. گندم جوانه‌زده منع طبیعی و بسیار خوبی جهت افزایش خواص تغذیه‌ای محصولات غذایی به شمار می‌آید. منظور از آرد گندم جوانه‌زده، دانه‌های گندم جوانه‌زده، خشک و آسیاب شده است. آرد گندم جوانه‌زده به عنوان یک مکمل غذایی با ارزش در دنیا شناخته شده است. جوانه غلات به ویژه جوانه گندم حاوی مواد مختلفی مانند پروتئین، قندهای محلول، چربی (اسیدهای چرب جوانه گندم غالباً از اسید

1. Gama Amino Butiric Acid

۲-۲- مواد آزمایشگاهی

کلیه مواد شیمیایی مورد استفاده با درجه آنالیتیکال و از شرکت مرک آلمان تهیه شد.

۳-۲- روش تهیه آرد کینوا و آرد گندم جوانه زده

۳-۱- تهیه آرد کینوا

برای تولید آرد کینوا، دانه های کینوا با هدف برطرف شدن طعم خامی، تفت داده شدن و سپس آسیاب و الک شد.

۳-۲- تهیه آرد گندم جوانه زده

با هدف تولید آرد گندم جوانه زده، دانه های گندم به مدت یک روز در آب خیسانده شده و با افزایش رطوبت تا حدود ۴۲٪ در شرایط مطلوب به مدت ۸ تا ۹ روز گندم جوانه زنی انجام شد. سپس دانه های جوانه زده خشک و آسیاب شدند [۱۸].

۳-۳- روش تهیه کیک اسفنجی

در تحقیق حاضر ابتدا آزمون های شیمیایی لازم بر روی آرد جوانه گندم و آرد کینوا مصرفی انجام گردید. برای تهیه خمیر کیک اسفنجی، ابتدا سفیده تخم مرغ به مدت ۲ دقیقه در مخلوط کن هم زده شد، سپس شکر افزوده شد و با سرعت مشخص به مدت ۳۰ ثانیه مخلوط گردید. پس از آن زرده تخم مرغ به مخلوط اضافه گردید و به مدت ۱ دقیقه هم زده شد. سپس آرد گندم، بکینگ پودر و آرد جوانه گندم و آرد کینوا در سطوح مختلف (جدول ۱) افزوده و هم زده شدن و سپس آب به مقدار لازم اضافه گردید.

آرد کینوا جایگزین شده و برای تولید کوکی مورد استفاده قرار گرفت. این محققین عنوان نمودند که افزایش درصد آرد کینوا در فرمولاسیون موجب بهبود ویژگی های بافتی نمونه های کوکی گردید. همچنین این محققین عنوان نمودند که افزودن آرد کینوا تا ۳۵ درصد تاثیر معنی دار منفی بر ویژگی های حسی کوکی ها نداشت [۱۶]. Gawlik-Dziki و همکاران (۲۰۱۵) غنی سازی نان با آرد کینوا را در سطح ۲۰-درصد انجام دادند. نتایج آنها نشان داد که میزان گارلیک اسید، آنتی اکسیدان ها و اسیدهای آمینه ضروری بسیار بالاتر از نان با آرد کامل گندم می باشد [۱۷]. اگرچه تاکنون تحقیقات زیادی بر روی غنی سازی فرآورده های آردی انجام شده است، اما همچنان کیفیت و خواص غذایی ای بهتر مورد توجه می باشد. از این رو در تحقیق حاضر از اثر آرد کینوا و آرد گندم جوانه زده به منظور بالا بردن خواص غذایی ای کیک اسفنجی مورد توجه و بررسی قرار گرفت.

۲- مواد و روش ها

۱-۲- مواد اولیه

دانه کینوا از شرکت OAB (آلمان)، آرد گندم جوانه زده از شرکت ترژین (ایران)، وانیل از شرکت Bell (آلمان)، بکینگ پودر از شرکت برتر (ایران)، ژل کیک از شرکت گلنان پوراتوس (ایران)، روغن مایع از شرکت لادن (ایران)، شکر از شرکت ایرانشهر (ایران)، تهیه گردید.

Table 1 Different amounts of Germinated Wheat Flour and Quinoa Flour in sponge cake samples

| Treatments | Milk powder | Sorbitol | Gel cake | Vanilla | Baking Powder | Glucose | Germinated Wheat Flour | Quinoa Flour | Sugar | Oil | Egg | Flour | Water |
|------------|-------------|----------|----------|---------|---------------|---------|------------------------|--------------|-------|-----|-----|-------|-------|
| T1 | 3 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 2.5 | 0 | 0 | 22 | 5 | 30 | 5 | 30 |
| T2 | 3 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 22 | 5 | 30 | 5 | 27 |
| T3 | 3 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 22 | 5 | 30 | 5 | 21 |
| T4 | 3 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 2.5 | 7.5 | 7.5 | 22 | 5 | 30 | 5 | 15 |
| T5 | 3 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 2.5 | 10.5 | 10.5 | 22 | 5 | 30 | 5 | 9 |
| T6 | 3 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 2.5 | 15 | 15 | 22 | 5 | 30 | 5 | 0 |
| T7 | 3 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 2.5 | 0 | 15 | 22 | 5 | 30 | 5 | 15 |
| T8 | 3 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 2.5 | 15 | 0 | 22 | 5 | 30 | 5 | 15 |

مدت ۲۵ دقیقه انجام گردید [۱۹]. در ادامه پس از خنک شدن نمونه های کیک اسفنجی در دمای محیطی، کلیه کیک های تولیدی تحت آزمون های مختلف قرار گرفتند.

در نهایت خمیر کیک در قالب های گالوانیزه با ابعاد 20×30 قرار داده شده و عملیات پخت در فر کابیتی و در دمای 160°C به

فاکتورهای مربوط به بافت کیک‌ها (چسبندگی، سختی، انرژی تا نقطه شکست، شکنندگی، قابلیت ارجاع، نخی شدن، ماکریم نیروی فشاری، ماکریم نیروی کششی) طبق پیوست الف (منحنی های Instron) مورد بررسی قرار گرفت.

۵-۲-ارزیابی حسی

نمونه‌های کیک با کدهای سه رقمی به طور تصادفی شماره گذاری شد و همراه با پرسشنامه در اختیار ۷ ارزیاب تعلیم دیده موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کرج قرار گرفت. ارزیاب‌ها در گروه سنی ۴۷-۲۰ سال که آموزش‌های لازم را در این زمینه دیده بودند، قرار گرفت. از آن‌ها خواسته شد که ویژگی‌های کیفی رنگ ظاهری، طعم، شکل ظاهری، بافت و پذیرش کلی را از عدد ۱ تا ۵ رتبه بندی نمایند (روش رتبه بندی^۳). برای بهترین کیفیت عدد ۵ و نازل ترین کیفیت عدد ۱ در نظر گرفته شد. همچنین از آن‌ها خواسته شد که در پرسشنامه دیگری کیفیت نهایی و پذیرش کلی نمونه‌ها بر اساس آزمون هدونیک ۵ نقطه ای از کیفیت بسیار مطلوب (عالی) تا کیفیت بسیار نامطلوب (بد) مورد ارزیابی قرار دهند.^[۲۲]

۶-روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها، از طرح بلوك‌های کاملاً تصادفی استفاده گردید. هم چنین به منظور مقایسه میانگین‌ها داده‌ها از آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح احتمال ≤ 0.05 و نرم افزار SPSS نسخه ۲۰ استفاده شد. به علاوه رسم نمودارها با استفاده از نرم افزار Excel 2013 انجام گردید.

۳-نتایج و بحث

۱-۳-نتایج آزمون شیمیایی آرد گندم جوانه زده و آرد کینوا

نتایج بررسی ویژگی‌های شیمیایی آرد جوانه گندم و آرد کینوا در جدول ۲ ارائه شده است. نتایج نشان داد که میزان پروتئین، خاکستر و pH آرد کینوا به طور معنی داری بالاتر از آرد جوانه گندم بود ($p \leq 0.05$) و از طرفی میزان اسیدیته و عدد فالینگ آرد جوانه گندم بالاتر از آرد کینوا بود ($p \leq 0.05$).

۴-آزمون‌ها

۱-۴-۱-آرزیابی برخی ویژگی‌های آرد کینوا و آرد گندم جوانه زده

جهت تعیین برخی از ویژگی‌های آرد‌های کینوا و آرد گندم جوانه زده مورد استفاده، بلافضله پس از تهیه، میزان رطوبت خاکستر، پروتئین، اسیدیته، pH، و گلوتن مرتبط آنها اندازه گیری شد.^[۲۰، ۲۱]

۲-۴-۲-آزمون‌های انجام شده بر روی نمونه‌های کیک اسفنجی

۲-۴-۲-۱-آزمون‌های شیمیایی رطوبت مطابق روش AACC شماره ۶۴-۴۴، خاکستر مطابق روش AACC شماره ۰۸-۰۱، پروتئین مطابق روش AACC شماره ۶۴-۱۲، چربی مطابق روش AACC شماره ۲۵-۳۰ توسط روش سوکسله، اندیس پراکسید چربی استخراجی به روش تیتراسیون مطابق با استاندارد ملی شماره ۳۷ عمل شد.^[۲۲، ۲۳]

۲-۴-۲-۲-ارزیابی شاخص‌های رنگ سنجی

آزمون رنگ سنجی نمونه‌های کیک اسفنجی توسط دستگاه هانترلب ۲ مطابق با روش استاندارد AACC شماره ۹۰-۱۰ انجام پذیرفت.^[۲۲] با مشخص کردن شاخص‌های رنگی a^* , b^* , L^* پارامترهای رنگ کیک تعیین گردید. شاخص رنگ L^* بیانگر روشی و تیرگی نمونه‌ها است. شاخص رنگ a^* بیانگر قرمز یا سبز بودن نمونه‌ها و شاخص رنگ b^* بیانگر زرد یا آبی بودن نمونه‌ها می‌باشد.

۲-۴-۳-بررسی خصوصیات بافتی

جهت تعیین خصوصیات بافت کیک از دستگاه بافت سنج بروکفیلد مدل Tact Pro و طبق روش استاندارد AACC شماره ۷۴-۳۰ استفاده شد.^[۲۲] در این روش ابتدا یک سانتی متر از بالای کیک جدا شد تا سطح رویی کیک یکنواخت شود و سپس کیک در زیر پروب صفحه ای با ابعاد $40 \times 40 \times 5$ میلی متر قرار گرفت و آزمون فشاری دو مرحله ای بر روی آن انجام شد. آزمون با سرعت قبل از آزمون پروب ۵ میلی متر بر ثانیه، فواصل زمانی ۱۰ ثانیه و کمپرس ۰.۲۵٪ ارتفاع کیک انجام شد و

Table 2 Comparison of physicochemical properties sprouted wheat flour and quinoa flour

| Treatments | Moisture (%) | Acidity (%) | pH (%) | Wet Gluten (%) | Protein (%) | Ash (%) | Faling Number (s) |
|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Germinated wheat flour | 10.11 ^a | 5.12 ^a | 6.21 ^b | 21 ^a | 11.46 ^b | 1.65 ^b | 122 ^a |
| Quinoa flour | 10 ^a | 2.17 ^b | 6.27 ^a | 0 ^b | 14.78 ^a | 2.51 ^a | 62 ^b |

Different letters in each column indicate a significant difference ($p \leq 0.05$).

که افزایش سطوح مصرف ترکیبات مذکور منجر به افزایش محتوای خاکستر کل نمونه ها گشته است [۲۷].

۳-۲-۲-۳- ارزیابی نتایج پروتئین

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که با افزایش مقدار آرد کینوا و آرد گندم جوانه زده، میزان پروتئین نمونه های کیک اسفنجی تولیدی به طور معنی داری افزایش یافت ($p \leq 0.05$). به طوری که بالاترین میزان پروتئین در نمونه T₆ (کیک اسفنجی محتوی ۱۵٪ آرد کینوا + ۱۵٪ آرد گندم جوانه زده) و پائین ترین میزان آن در نمونه شاهد (کیک اسفنجی فاقد آرد کینوا و آرد گندم جوانه زده) مشاهده شد ($p \leq 0.05$). که علت این امر را می توان به مقادیر بالای پروتئین آرد کینوا و سپس آرد گندم جوانه زده نسبت داد. محققان مقدار پروتئین کینوا را ۲۰-۱۴ g/برمبنای (گزارش نموده اند [۲۸]). محققان دیگری نیز میزان پروتئین دانه های کینوا را بر اساس نوع فرآوری در محلوده ۱۵/۱۶-۱۷/۴۱ بر مبنای وزن خشک اعلام نموده اند [۲۹]. نتایج تحقیق حاضر مطابق با یافته های Sidhu و همکاران (۲۰۰۱) بود که بیان نمودند افزودن جوانه و سبوس گندم به نان برشه، موجب تولید نانی با افزایش محتوای پروتئین بالاتر نسبت به نمونه شاهد (نان با آرد معمولی) شد [۳۰]. نتایج حاصل از تحقیق حاضر با نتایج بدست آمده از تحقیق جلدانی و همکاران (۱۳۹۶) در بررسی تاثیر افزودن آرد کامل کینوا و صمغ زانتان را بر خصوصیات شیمیایی و حسی نان بربری هم خوانی داشت که بیان نمودند با افزودن آرد کامل کینوا به نان بربری، میزان پروتئین آن به طور معنی داری افزایش یافته است [۲۶]. نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر هم راستا با نتایج بدست دیگر محققان در بود که غنی سازی نان با آرد کینوا مورد بررسی قرار دادند و اعلام نمودند که جایگزینی آرد گندم در سطوح ۵-۱ درصد، سبب افزایش میزان پروتئین نان ها شده است [۲۶] Stikic. و همکاران (۲۰۱۲) نیز در بررسی تاثیر به کارگیری دانه های کینوا در مقادیر ۱۵، ۱۰، ۲۰ درصد به صورت جایگزینی با آرد گندم در

۳-۲-۳- ارزیابی نتایج آزمون های شیمیایی نمونه های کیک اسفنجی

۱-۲-۳- ارزیابی نتایج خاکستر

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که با افزایش مقدار آرد کینوا و آرد گندم جوانه زده، میزان خاکستر نمونه های کیک اسفنجی تولیدی به طور معنی داری افزایش یافت ($p \leq 0.05$). به طوری که بالاترین میزان خاکستر در نمونه T₆ (کیک اسفنجی محتوی ۱۵٪ آرد کینوا + ۱۵٪ آرد گندم جوانه زده) و پائین ترین میزان آن در نمونه شاهد (کیک اسفنجی فاقد آرد کینوا و آرد گندم جوانه زده) مشاهده شد ($p \leq 0.05$). که علت این امر را می توان به مقادیر بالای خاکستر آرد کینوا و سپس آرد گندم جوانه زده نسبت داد. نتایج تحقیق حاضر هم راستا با نتایج Fatma و همکاران (۲۰۱۰) بود که در تولید بیسکویت غنی شده با پروتئین جوانه گندم و ویژگی های فیزیکی و شیمیایی محصول حاصل، بیان نمودند بیسکویت های غنی شده، خاکستر بیشتری را نسبت به نمونه شاهد نشان دادند [۲۴]. نتایج تحقیقات حاضر هم راستا با پژوهش های Petrovic و همکاران (۲۰۱۷) در بررسی اثر افزودن جوانه گندم چربی زدایی شده بر ویژگی های کیفی کوکی بود که عنوان نمودند جایگزینی آرد گندم با آرد جوانه گندم موجب افزایش مواد معدنی و فیبر در نمونه های کوکی گردید. محققان میزان خاکستر آرد کینوا را ۳/۸ درصد گزارش نموده اند [۲۵]. نتایج حاصل از تحقیق حاضر با نتایج دیگر محققان در بررسی تاثیر افزودن آرد کامل کینوا بر خصوصیات شیمیایی و حسی نان بربری هم خوانی داشت که بیان نمودند با افزودن آرد کامل کینوا به نان بربری، میزان خاکستر نان ها به طور معنی داری افزایش یافته است [۲۶]. محققان در بررسی افزودن آرد کینوا، آمارانت و گندم سیاه در سطوح ۵ و ۱۰ درصد به عنوان جایگزین بخشی از آرد برنج در کلوچه بدون گلوتن بیان نمودند

شيميايي و حسي نان ببرري بود که بيان نمودند با افزودن آرد كامل کينوا ميزان چربی نمونه های نان به طور معنى داري افزایش يافت [۲۶]. محققان ديگر نيز در بررسی کيفيت نان گندم تهيه شده با کينوا، گندم سياه و دانه کدو تبل، بيان نمودند که ميزان چربی نمونه های محتوى آرد کينوا نسبت به نمونه شاهد افزایش يافته است [۲۸]. نتایج تحقيق حاضر مطابق با يافته های Sidhu و همكاران (۲۰۰۱) بود که بيان نمودند افزودن جوانه و سبوس گندم به نان برشته، موجب توليد ناني با افزایش محتوى چربی بالاتر نسبت به نمونه شاهد (نان با آرد معمولی) شد [۳۰]. نتایج تحقيق حاضر مطابق با يافته های Fatma و همكاران (۲۰۱۰) بود در توليد بيسکويت غني شده با پروتئين جوانه گندم و ويژگي های فيزيكي و شيميايي محصول حاصل، بيان نمودند که بيسکويت های غني شده چربی كمتری را نسبت به نمونه شاهد نشان دادند [۲۴]. Petrovic و همكاران (۲۰۱۷) در بررسی اثر افزودن جوانه گندم چربی زدائي شده بر ويژگي های كوکي عنوان نمودند که جايگزيني آرد گندم با آرد جوانه گندم موجب افزایش ميزان چربی نمونه های کوکي گردید [۲۵]. شاكرى و همكاران (۱۳۹۱) در بررسی اثرات افزودن جوانه گندم بر ويژگي های شيميايي، حسي، پخت و ميكروبى پاستا بيان نمودند که افزودن جوانه گندم در مقادير بالاتر از ۱۵٪ سبب افزایش ۱۰ درصدی ميزان چربی در نمونه ها شد [۳۱].

۲-۳-۴- ارزیابی نتایج تخلخل

نتایج تحقيق حاضر (جدول ۳) نشان داد که پائين ترين ميزان تخلخل در نمونه T₆ (کيک اسفنجي محتوى ۱۵٪ آرد کينوا + ۱۵٪ آرد گندم جوانه زده) و پس از آن در نمونه های T₇ (کيک اسفنجي محتوى ۱۰٪ آرد کينوا + ۱۵٪ آرد گندم جوانه زده) و T₈ (کيک اسفنجي محتوى ۱۵٪ آرد کينوا + ۱۰٪ آرد گندم جوانه زده) مشاهده شد [۰/۰۵]. به عبارت ديگر افزودن آردهای کينوا و جوانه گندم در بالاترین ميزان (۱۵٪) منجر به کاهش معنى دار تخلخل نمونه ها شد. از آنجايي که در افزایش حجم و تخلخل نمونه ها، شبکه گلوتنی نقش بسيار مهمی دارد، علت اين امر را می توان به رقيق سازی گلوتن توسيط آرد کينوا و آرد گندم جوانه زده نسبت داد که تا حدی منجر به تضعيف شبکه گلوتنی و کاهش تخلخل نمونه ها شده است.

فرمولاسيون نان اذعان نمودند که مقدار پروتئين در نان نهايی به ميزان ۲ درصد افزایش يافته است [۲۹]. Iglesias-Puig و همكاران (۲۰۱۵) نيز در بررسی توليد نان با آرد کينوا و فيتاز باكتريائي (در مقادير ۲۵ و ۵۰ درصد آرد) اعلام نمودند که افزودن آرد کينوا منجر به افزایش ميزان پروتئين ها گشته است. Milovanovic و همكاران (۲۰۰۸) در بررسی کيفيت نان گندم تهيه شده با کينوا، گندم سياه و دانه کدو تبل، آرد گندم را تا سطح ۴ درصد با مخلوط کينوا (۱۵ درصد)، آرد گندم تا ۴۰ درصد با مخلوط کينوا (۱۵ درصد)، گندم سياه (۱۵ درصد) و دانه کدو تبل (۱۰ درصد) جايگزين کرده و بيان نمودند که ميزان پروتئين نسبت به نمونه شاهد افزایش يافته است [۲۸]. Fatma و همكاران (۲۰۱۰) در توليد بيسکويت غني شده با پروتئين جوانه گندم و ويژگي های فيزيكي و شيميايي محصول حاصل، بيان نمودند که بيسکويت های غني شده، پروتئين بيشتر نسبت به نمونه شاهد نشان دادند [۲۴]. Petrovic و همكاران (۲۰۱۷) در بررسی اثر افزودن جوانه گندم چربی زدائي شده بر ويژگي های كيکي عنوان نمودند که جايگزيني آرد گندم با آرد جوانه گندم موجب افزایش ميزان پروتئين نمونه های کوکي گردید [۲۵]. شاكرى و همكاران (۱۳۹۱) در بررسی اثرات افزودن جوانه گندم بر ويژگي های شيميايي، حسي، پخت و ميكروبى پاستا بيان نمودند که افزودن جوانه گندم در مقادير بالاتر از ۱۵٪ سبب افزایش ۱۵ درصدی مقدار پروتئين در نمونه ها شد [۳۱].

۳-۲-۳- ارزیابی نتایج چربی

نتایج تحقيق حاضر نشان داد که با افزایش مقدار آرد کينوا و آرد گندم جوانه زده، ميزان چربی نمونه های کيک اسفنجي توليدی به طور معنى داري افزایش يافت (۰/۰۵). به طوري که بالاترین ميزان چربی در نمونه T₆ (کيک اسفنجي محتوى ۱۵٪ آرد کينوا + ۱۵٪ آرد گندم جوانه زده) و پائين ترين ميزان آن در نمونه شاهد (کيک اسفنجي فاقد آرد کينوا و آرد گندم جوانه زده) مشاهده شد (۰/۰۵). که علت اين امر را می توان به مقادير بالاي چربی آرد کينوا و آرد گندم جوانه زده نسبت داد. محققان بيان نموده اند که دانه کينوا حاوي ۲ تا ۱۰ درصد چربی می باشد [۳۰]. نتایج حاصل از تحقيق حاضر مطابق با يافته های جلداني و همكاران (۱۳۹۶) در بررسی تأثير افزودن آرد کامل کينوا بر خصوصيات

Table 3 Physicochemical tests of sponge cake containing quinoa flour and germinated wheat flour

| Treatments | Ash (%) | Fat (%) | Protein (%) | Prostity |
|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| T ₁ | 1.35 ^h | 14.84 ^e | 15.86 ^e | 35.92 ^{abc} |
| T ₂ | 1.39 ^g | 15.67 ^c | 16.10 ^e | 42.94 ^a |
| T ₃ | 1.44 ^f | 15.64 ^c | 16.45 ^d | 43.13 ^a |
| T ₄ | 1.48 ^e | 15.77 ^a | 16.80 ^c | 40.96 ^{ab} |
| T ₅ | 1.59 ^c | 16.42 ^a | 17.32 ^b | 0.88 ^{ab} |
| T ₆ | 1.88 ^a | 16.83 ^a | 17.90 ^a | 1.46 ^c |
| T ₇ | 1.63 ^b | 16.59 ^b | 17.44 ^b | 33.20 ^{bc} |
| T ₈ | 1.51 ^d | 15.07 ^d | 16.68 ^{cd} | 32.79 ^{bc} |

Different letters in each column indicate a significant difference ($p \leq 0.05$).

T₁: control sample (sponge cake without quinoa flour and germinated wheat flour), T₂: sponge cake containing 1.5% quinoa flour + 1.5% germinated wheat flour, T₃: Sponge Cake Containing 4.5% Quinoa Flour + 4.5% Germinated Wheat Flour, T₄: Sponge Cake Containing 7.5% Quinoa Flour + 7.5% Germinated Wheat Flour, T₅: Sponge Cake Containing 10.5% Quinoa Flour + 10.5% Germinated Wheat Flour, T₆: Sponge Cake Containing 15% Quinoa Flour + 15% Germinated Wheat Flour, T₇: sponge cake containing 0% quinoa flour + 15% germinated wheat flour, T₈: sponge cake containing 15% quinoa flour + 0% germinated wheat flour

[۳۲]. محققان ظرفیت جذب آب کینوا را ۱۴۷ درصد بیان نموده اند [۳۳]. محققان ارزیابی تغذیه ای دانه کینوا را به عنوان یک جز در فرمولاسیون نان مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که با افزایش درصد کینوا در نان، رطوبت کاهش پیدا می کند [۲۹]. محققان در بررسی افزودن آرد کینوا، آمارانت و گندم سیاه در سطوح ۵ و ۱۰ درصد به عنوان جایگزین بخشی از آرد برنج در کلوچه بدون گلوتن بیان نمودند که افزایش سطوح مصرف ترکیبات مذکور منجر به افزایش محتوای رطوبت نمونه ها گشته است [۲۷]. Fatma و همکاران (۲۰۱۰) در بررسی تولید بیسکویت غنی شده با پروتئین جوانه گندم و ویژگی های فیزیکی و شیمیایی محصول حاصل، بیان نمودند که بیسکویت های غنی شده، رطوبت کمتری را نسبت به نمونه شاهد نشان دادند [۲۶]. نتایج تحقیق حاضر مطابق با یافته های قویدل و همکاران (۱۳۹۳) در بررسی تاثیر افزودن جوانه گندم فرآوری شده بر ویژگی های کمی و کیفی کیک روغنی بود که بیان نمودند با افزایش بیش از ۵ درصد از هر دو نوع جوانه گندم در فرمولاسیون میزان رطوبت نمونه ها کاهش یافت. در حالی که با افزایش جوانه گندم در میزان فعالیت آبی نمونه ها اختلاف معنی داری در سطح ۵ درصد مشاهده نگردید [۳۴]. زارع نژاد و همکاران (۱۳۹۱) در بررسی اثر افزودن جوانه گندم خام و تثبیت شده بر ویژگی های کیک بیان نمودند که کیک های دارای جوانه گندم خام رطوبت بالاتری نسبت به کیک های دارای جوانه گندم

۵-۲-۳- ارزیابی نتایج رطوبت

نتایج تحقیق حاضر (جدول ۴) نشان داد که در تمامی روزهای مورد بررسی، پائین ترین میزان رطوبت متعلق به نمونه های T₃ (کیک اسفنجی محتوی ۴/۵٪ آرد کینوا + ۴/۵٪ آرد گندم جوانه زده) و T₄ (کیک اسفنجی محتوی ۷/۵٪ آرد کینوا + ۷/۵٪ آرد گندم جوانه زده) بود و بالاترین میزان آن در نمونه T₈ (کیک اسفنجی محتوی ۱۵٪ آرد کینوا + ۱۵٪ آرد گندم جوانه زده) مشاهده شد ($p \leq 0.05$). علت این امر را می توان به جذب آب پروتئین و فیبر موجود در آرد کینوا و سپس آرد جوانه گندم نسبت داد. همچنین با گذشت زمان از روز پانزدهم تا سی ام، میزان رطوبت نمونه های کیک اسفنجی به طور معنی داری کاهش یافت ($p \leq 0.05$). عموماً بیانی به صورت چرمی شدن پوسته نان، کاهش رطوبت و طعم و کاهش تازگی در محصول مشخص می شود آب جذب شده در طول فرآیند به پخت، سبب ایجاد بافت مربوط در نان تازه می شود و آزاد شدن آن در طول دوره نگهداری نان سبب سفتی و شکنندگی بافت نان مانده می گردد آب دارای نقش محوری در کنترل سفتی نشاسته در تمام مراحل توسعه خمیر، فرآوری نان و نگهداری آن می باشد. آب دارای نقش محوری در کنترل سفتی نشاسته و گلوتن بوده و نحوه توزیع آن در میان فازهای پروتئین و نشاسته در تمام مراحل توسعه خمیر، فرآوری نان و نگهداری آن مهم باشد. ارتباط معکوس بین محتوی رطوبت و سرعت بیانی در نان وجود دارد

که نمونه حاوی ۵۰ درصد آرد سویا و نمونه حاوی ۵ درصد جوانه گندم و ۵۰ درصد آرد سویا دارای بالاترین میزان رطوبت در هر دو بازه زمانی (۲ ساعت و یک هفته پس از پخت) بودند [۳۶].

ثبت شده داشتند و با گذشت زمان رطوبت کیک کاهش یافت [۳۵]. نقی پور و همکاران (۱۳۹۲) در بررسی امکان جایگزینی تخم مرغ با آرد سویا و اختلاط آرد گندم با جوانه گندم ثبت شده در تولید کیک روغنی از آرد سویا بیان نمودند

Table 4 Variation of moisture content of sponge cake samples containing different amounts of quinoa flour and germinated wheat flour

| Treatments | Time | | |
|----------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | Day 0 | Day 15 | Day 30 |
| T ₁ | 22.17 ^{da} | 16.27 ^{dB} | 14.27 ^{cC} |
| T ₂ | 17.97 ^{eA} | 15.43 ^{deA} | 13.75 ^{cB} |
| T ₃ | 16.27 ^{fA} | 14.77 ^{eBA} | 13.95 ^{cB} |
| T ₄ | 15.70 ^{fA} | 14.63 ^{eA} | 13.14 ^{dB} |
| T ₅ | 22.06 ^{da} | 20.15 ^{cA} | 15.69 ^{bB} |
| T ₆ | 22.95 ^{ba} | 21.22 ^{abA} | 15.65 ^{bB} |
| T ₇ | 23.78 ^{cA} | 22.04 ^{bA} | 15.86 ^{bB} |
| T ₈ | 25.48 ^{aA} | 24.95 ^{aA} | 17.00 ^{aB} |

Small letters indicate significant differences in rows and capital letters indicate significant differences in the column ($p<0.05$).

T1: control sample (sponge cake without quinoa flour and germinated wheat flour), **T2:** sponge cake containing 1.5% quinoa flour + 1.5% germinated wheat flour, **T3:** Sponge Cake Containing 4.5% Quinoa Flour + 4.5% Germinated Wheat Flour, **T4:** Sponge Cake Containing 7.5% Quinoa Flour + 7.5% Germinated Wheat Flour, **T5:** Sponge Cake Containing 10.5% Quinoa Flour + 10.5% Germinated Wheat Flour, **T6:** Sponge Cake Containing 15% Quinoa Flour + 15% Germinated Wheat Flour, **T7:** sponge cake containing 0% quinoa flour + 15% germinated wheat flour, **T8:** sponge cake containing 15% quinoa flour + 0% germinated wheat flour

میزان فعالیت آبی نمونه‌های کیک اسفنجی تولیدی به طور معنی‌داری افزایش یافت ($p\leq 0.05$).

۳-۲-۶- ارزیابی نتایج فعالیت آبی

نتایج تحقیق حاضر (جدول ۵) نشان داد که در تمامی روزهای مورد بررسی با افزایش مقدار آرد کینوا و آرد گندم جوانه زده،

Table 5 Variation of Active water of sponge cake samples containing different amounts of quinoa flour and germinated wheat flour (on test days)

| Treatments | Time | | |
|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | Day 0 | Day 15 | Day 30 |
| T ₁ | 0.68 ^{cA} | 0.67 ^{cdA} | 0.67 ^{cdA} |
| T ₂ | 0.66 ^{cA} | 0.66 ^{cdA} | 0.65 ^{deA} |
| T ₃ | 0.65 ^{cA} | 0.64 ^{deA} | 0.64 ^{deA} |
| T ₄ | 0.66 ^{cA} | 0.59 ^{eA} | 0.58 ^{eA} |
| T ₅ | 0.75 ^{ba} | 0.72 ^{bcA} | 0.70 ^{bcdA} |
| T ₆ | 0.77 ^{abA} | 0.76 ^{abA} | 0.73 ^{abcA} |
| T ₇ | 0.78 ^{abA} | 0.76 ^{abA} | 0.75 ^{abA} |
| T ₈ | 0.81 ^{aA} | 0.81 ^{aA} | 0.80 ^{aA} |

Small letters indicate significant differences in rows and capital letters indicate significant differences in the column ($p<0.05$).

T1: control sample (sponge cake without quinoa flour and germinated wheat flour), **T2:** sponge cake containing 1.5% quinoa flour + 1.5% germinated wheat flour, **T3:** Sponge Cake Containing 4.5% Quinoa Flour + 4.5% Germinated Wheat Flour, **T4:** Sponge Cake Containing 7.5% Quinoa Flour + 7.5% Germinated Wheat Flour, **T5:** Sponge Cake Containing 10.5% Quinoa Flour + 10.5% Germinated Wheat Flour, **T6:** Sponge Cake Containing 15% Quinoa Flour + 15% Germinated Wheat Flour, **T7:** sponge cake containing 0% quinoa flour + 15% germinated wheat flour, **T8:** sponge cake containing 15% quinoa flour + 0% germinated wheat flour

محتوی ۷/۵٪ آرد کینوا + ۷/۵٪ آرد گندم جوانه زده) مشاهده شد ($p \leq 0.05$). همچنین با گذشت زمان، اختلاف آماری معنیداری در میزان pH نمونه‌های کیک اسفنجی مشاهده نشد. به طور کلی مقایس pH به صورت منفی لگاریتم غلظت مولی یون هیدروژن نمایش داده می‌شود و هرچه قدرت اسید یا یون هیدروژن بیشتر شود، مقایس pH به سمت صفر کاهش می‌یابد و تراکم یون H یا هیدروژن یونیزه موجود در نمونه را مشخص می‌کند [۱۹].

به طوری که پائین ترین میزان فعالیت آبی در نمونه‌های T₁ (کیک اسفنجی فاقد آرد کینوا و آرد گندم جوانه زده) T₂ (کیک اسفنجی محتوی ۱/۵٪ آرد کینوا + ۱/۵٪ آرد گندم جوانه زده)، T₃ (کیک اسفنجی محتوی ۴/۵٪ آرد کینوا + ۴/۵٪ آرد گندم جوانه زده) و T₄ (کیک اسفنجی محتوی ۷/۵٪ آرد کینوا + ۷/۵٪ آرد گندم جوانه زده) مشاهده شد ($p \leq 0.05$).

۷-۲-۳- ارزیابی نتایج pH

نتایج تحقیق حاضر (جدول ۶) نشان داد که در تمامی روزهای مورد بررسی پائین ترین میزان pH در نمونه T₄ (کیک اسفنجی

Table 6 Variation of pH of sponge cake samples containing different amounts of quinoa flour and germinated wheat flour (on test days)

| Treatments | Day 0 | Day 15 | Day 30 |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| T ₁ | 7.33 ^{abA} | 6.95 ^{abA} | 6.79 ^{abA} |
| T ₂ | 7.19 ^{bC} | 6.70 ^{cA} | 6.66 ^{bcA} |
| T ₃ | 7.18b ^{cA} | 6.66 ^{cA} | 6.62 ^{cdA} |
| T ₄ | 7.07 ^{bcA} | 6.56 ^{cA} | 6.42 ^{eA} |
| T ₅ | 7.27 ^{cA} | 6.93 ^{abA} | 6.50 ^{deA} |
| T ₆ | 7.16 ^{abA} | 6.88 ^{bA} | 6.69 ^{bcA} |
| T ₇ | 7.27 ^{abA} | 7.00 ^{abA} | 6.71 ^{bcA} |
| T ₈ | 7.41 ^{aA} | 7.05 ^{aA} | 6.90 ^{aA} |

Small letters indicate significant differences in rows and capital letters indicate significant differences in the column ($p < 0.05$).

T₁: control sample (sponge cake without quinoa flour and germinated wheat flour), T₂: sponge cake containing 1.5% quinoa flour + 1.5% germinated wheat flour, T₃: Sponge Cake Containing 4.5% Quinoa Flour + 4.5% Germinated Wheat Flour, T₄: Sponge Cake Containing 7.5% Quinoa Flour + 7.5% Germinated Wheat Flour, T₅: Sponge Cake Containing 10.5% Quinoa Flour + 10.5% Germinated Wheat Flour, T₆: Sponge Cake Containing 15% Quinoa Flour + 15% Germinated Wheat Flour, T₇: sponge cake containing 0% quinoa flour + 15% germinated wheat flour, T₈: sponge cake containing 15% quinoa flour + 0% germinated wheat flour

گرم گالیک اسید در گرم عصاره و میزان فلاونوپید در عصاره دانه و برگ کینوا به ترتیب ۲۶/۳ و ۳۶/۷ (میلی گرم کوثرستین در گرم عصاره) به دست آمد [۳۲]. در تحقیق Dini و همکاران (۲۰۰۴)، دانه‌های کینوا برداشت شده از آمریکای جنوبی مقادیری ترکیبات فلاونوپیدی شناسایی شد [۳۳]. همچنین با گذشت زمان، میزان اندیس پراکسید نمونه‌های کیک اسفنجی به طور معنی‌داری افزایش یافت ($p \leq 0.05$).

اندیس پراکسید عبارت است از میلی اکی والان گرم پراکسید یا اکسیژن فعال موجود در یک کیلوگرم از نمونه روغن و یا چربی. اندیس پراکسید شاخص جهت نشان دادن میزان فساد اکسیداتیو در روغن‌ها و چربی‌ها می‌باشد. در اکسیداسیون پراکسید یا

۸-۲-۳- ارزیابی نتایج اندیس پراکسید

نتایج تحقیق حاضر (جدول ۷) نشان داد که در تمامی روزهای مورد بررسی نمونه‌های فاقد آرد گندم جوانه زده اندیس پراکسید پائین‌تری داشتند به طوری که پائین‌ترین میزان آن در نمونه T₈ (کیک اسفنجی محتوی ۱۵٪ آرد کینوا + ۰٪ آرد گندم جوانه زده) مشاهده شد ($p \leq 0.05$). که علت این امر را می‌توان به فعالیت آنتی‌اکسیدانی گیاه کینوا نسبت داد که البته در مقادیر بالای آرد جوانه گندم، بخشی از اثرات آنتی‌اکسیدانی آن کاهش یافته است. در تحقیق اسفندیاری سبزوار و همکاران (۱۳۹۶) در مقایسه خواص آنتی‌اکسیدانی عصاره برگ و دانه گیاه کینوا، میزان فنول کل در عصاره دانه و برگ کینوا به ترتیب ۵۴/۴ و ۷۶/۳ (میلی

پراکسید (PV) می باشد. در طی اکسیداسیون، اسیدهای چرب غیر اشبع می توانند اکسیژن را جذب کرده پراکسید تولید کنند [۳۷]

اکسیژن فعال در روغن ها تولید می شود. وجود پراکسید در روغن به عنوان کاتالیزور اکسیداسیون را تسريع می نماید. به عبارتی متداول ترین روش اندازه گیری شدت اکسیداسیون، اندیس

Table 7 Variation of Peroxide value of sponge cake samples containing different amounts of quinoa flour and germinated wheat flour (on test days)

| Treatments | Time | | |
|----------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | Day 0 | Day 15 | Day 30 |
| T ₁ | 0.33 ^{aC} | 0.50 ^{aB} | 0.76 ^{aA} |
| T ₂ | 0.30 ^{bC} | 0.48 ^{aB} | 0.71 ^{bA} |
| T ₃ | 0.28 ^{cC} | 0.45 ^{bB} | 0.69 ^{bcA} |
| T ₄ | 0.25 ^{cC} | 0.44 ^{bB} | 0.67 ^{bedA} |
| T ₅ | 0.21 ^{dC} | 0.40 ^{cB} | 0.63 ^{dA} |
| T ₆ | 0.20 ^{dC} | 0.38 ^{cB} | 0.56 ^{eA} |
| T ₇ | 0.25 ^{cC} | 0.44 ^{bB} | 0.65 ^{cdA} |
| T ₈ | 0.18 ^{eC} | 0.35 ^{dB} | 0.49 ^{fA} |

Small letters indicate significant differences in rows and capital letters indicate significant differences in the column ($p<0.05$).

T1: control sample (sponge cake without quinoa flour and germinated wheat flour), T2: sponge cake containing 1.5% quinoa flour + 1.5% germinated wheat flour, T3: Sponge Cake Containing 4.5% Quinoa Flour + 4.5% Germinated Wheat Flour, T4: Sponge Cake Containing 7.5% Quinoa Flour + 7.5% Germinated Wheat Flour, T5: Sponge Cake Containing 10.5% Quinoa Flour + 10.5% Germinated Wheat Flour, T6: Sponge Cake Containing 15% Quinoa Flour + 15% Germinated Wheat Flour, T7: sponge cake containing 0% quinoa flour + 15% germinated wheat flour, T8: sponge cake containing 15% quinoa flour + 0% germinated wheat flour

در بررسی اثرات افزودن جوانه گندم بر ویژگی های شیمیایی، حسی، پخت و میکروبی پاستا بیان نمودند که رنگ نمونه های مختلف در مقایسه با نمونه شاهد تفاوت های معنی دار داشت [۳۱]. ارزیاب ها از نظر بافت و طعم، نمونه های دارای جوانه گندم را به نمونه شاهد ترجیح دادند. قهقهی و یارمند (۱۳۹۵) در بررسی اثر افزودن سبوس گندم بر ویژگی های رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان ببری بیان نمودند که فاکتور *L نمونه ها کاهش یافت. محققان در بررسی افزودن آرد کینوا، آمارانت و گندم سیاه در سطوح ۵، ۱۰ و ۱۵ درصد به عنوان جایگزین بخشی از آرد برنج در کلوجه بدون گلوتن بیان نمودند که با جایگزینی بخشی از آرد برنج با آرد شبه غلات، مولفه رنگی *L به طور معنی داری اضافه شد که اثر آرد آمارانت در افزایش مولفه رنگی مذکور بالاتر از آرد کینوا و آرد گندم سیاه ارزیابی شد. افزایش مولفه رنگی *L به پوسته صاف، هموار و یکنواخت و بدون ترک نمونه های حاوی ارد شبه غلات نسبت داده شد که منجر به انتقال و مهاجرت آهسته تر رطوبت از مغز به پوسته شده است همچنین در مولفه رنگی *a^a نمونه های محتوى آرد آمارانت

۳-۳-۱- ارزیابی نتایج رنگ سنجی

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که در تمامی روزهای مورد بررسی با افزایش مقدار آرد کینوا و آرد گندم جوانه زده، میزان مولفه رنگی (L*) نمونه های کیک اسفنجی تولیدی به طور معنی داری کاهش یافت ($p\leq 0.05$). به طوری که بالاترین میزان مولفه رنگی (L*) در نمونه شاهد مشاهده شد ($p\leq 0.05$). رنگ تیره تر آرد کینوا نسبت به نان شاهد به دلیل حضور رنگدانه بتالانین در آن است و همچنین آرد کینوا به صورت آرد کامل (همراه با سبوس) مورد استفاده قرار گرفت که خود باعث تیرگی رنگ آن شده است. از طرفی حضور قند احیاء و اسید آمینه هایی مانند لیزین در کینوا باعث می شود تا در طی فرآیند پخت، قهوه ای شدن غیرآنژیمی میلارد رخ دهد که خود باعث تیرگی رنگ نان (L*) می شود. همچنین با گذشت زمان، میزان مولفه رنگی (L*) نمونه های کیک اسفنجی به طور معنی داری کاهش یافت ($p\leq 0.05$). شاخص *L میزان تیرگی و روشنی (روشن-تیره، ۰-۱۰۰) را اندازه گیری می کند. شاکری و همکاران (۱۳۹۱)

(کیک اسفنجی محتوی ۱۵٪ آرد کینوا + ۱۵٪ آرد گندم جوانه زده) مشاهده شد ($p\leq 0.05$). همچنین با گذشت زمان، میزان مولفه رنگی (a*) نمونه‌های کیک اسفنجی به طور معنی‌داری کاهش یافت ($p\leq 0.05$). طبق یافته‌های محققان، کینوا دارای رنگدانه‌های گیاهی از جمله بتا سیانین (بنفسن رنگ) است که نوعی بتالین محسوب شده و خواص آنتی‌اکسیدانی دارد [۳۱]. شاخص رنگی a* نشان دهندهٔ قرمزی در نمونه‌ها می‌باشد (قرمز مطلق - سبز مطلق، +۱۲۰ - -۱۲۰). نتی پور و همکاران (۱۳۹۲) در بررسی امکان جایگزینی تخم مرغ با آرد سویا و اختلاط آرد گندم با جوانه گندم ثبت شده در تولید کیک روغنی از آرد سویا بیان نمودند که با افزایش آرد سویا و جوانه گندم در فرمولاسیون به ترتیب میزان مولفه L* و a* نسبت به شاهد ۱ (نمونه فاقد تخم مرغ، آرد سویا و جوانه گندم) افزایش و کاهش یافت در حالی که آرد سویا سبب کاهش میزان مولفه a* و جوانه گندم سبب افزایش میزان این مولفه شد [۳۶].




Fig 2 Variation of a* of sponge cake samples containing different amounts of quinoa flour and germinated wheat flour (on test days)
Different letters indicate a significant difference ($p\leq 0.05$).

T1: control sample (sponge cake without quinoa flour and germinated wheat flour), T2: sponge cake containing 1.5% quinoa flour + 1.5% germinated wheat flour, T3: Sponge Cake Containing 4.5% Quinoa Flour + 4.5% Germinated Wheat Flour, T4: Sponge Cake Containing 7.5% Quinoa Flour + 7.5% Germinated Wheat Flour, T5: Sponge Cake Containing 10.5% Quinoa Flour + 10.5% Germinated Wheat Flour, T6: Sponge Cake Containing 15% Quinoa Flour + 15% Germinated Wheat Flour, T7: sponge cake containing 0% quinoa flour + 15% germinated wheat flour, T8: sponge cake containing 15% quinoa flour + 0% germinated wheat flour

و کینوا اختلاف آماری معنی‌داری با نمونه شاهد ملاحظه نشد. نتایج ارزیابی مولفه رنگی *b مقادیر مثبتی را برای نمونه‌های محتوی آرد کینوا نشان داد که به زرد رنگ بودن نمونه‌های محتوی آرد کینوا نسبت داده شد که به علت وجود رنگدانه‌های طبیعی موجود در دانه کینوا است [۲۷]. محققان اذعان نمودند که تغییرات سطح محصولات نانوایی مسئول روشنایی آن است و سطوح منظم و صاف نسبت به سطوح چین دار توانایی بیشتری در انعکاس نور و افزایش میزان مولفه L* دارند [۳۸].




Fig 1 Variation of L* of sponge cake samples containing different amounts of quinoa flour and germinated wheat flour (on test days)
Different letters indicate a significant difference ($p\leq 0.05$).

T1: control sample (sponge cake without quinoa flour and germinated wheat flour), T2: sponge cake containing 1.5% quinoa flour + 1.5% germinated wheat flour, T3: Sponge Cake Containing 4.5% Quinoa Flour + 4.5% Germinated Wheat Flour, T4: Sponge Cake Containing 7.5% Quinoa Flour + 7.5% Germinated Wheat Flour, T5: Sponge Cake Containing 10.5% Quinoa Flour + 10.5% Germinated Wheat Flour, T6: Sponge Cake Containing 15% Quinoa Flour + 15% Germinated Wheat Flour, T7: sponge cake containing 0% quinoa flour + 15% germinated wheat flour, T8: sponge cake containing 15% quinoa flour + 0% germinated wheat flour

۳-۲-۲- ارزیابی نتایج مولفه رنگی (a*)

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که در تمامی روزهای مورد بررسی با افزایش مقدار آرد کینوا و آرد گندم جوانه زده، میزان مولفه رنگی (a*) نمونه‌های کیک اسفنجی تولیدی به طور معنی‌داری افزایش یافت ($p\leq 0.05$). به طوری که پائین‌ترین میزان مولفه رنگی (a*) در نمونه شاهد و بالاترین میزان آن در نمونه T6

مقدار امتیاز مثبت شاخص رنگی^{b*} میزان زردی نمونه را نشان می دهد و مقدار منفی آن میزان مایل بودن به رنگ آبی نمونه (امتیاز شاخص رنگی^{L*} و میزان منفی آن مایل بودن به رنگ آبی نمونه) را نشان می دهد (زردمطلق آبی مطلق، ۱۲۰-+۱۲۰-)[۳۹]. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که با افزایش مقادیر مختلف جوانه و سبوس گندم اختلاف آماری معنی داری در مولفه رنگی^{b*} نمونه ها وجود نداشت ($p>0.05$).

۴-۳-۱- ارزیابی نتایج آنالیز پروفیل بافت نمونه های کیک اسفنجی تولیدی

۴-۳-۲- ارزیابی نتایج سختی

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که در تمامی روزهای مورد بررسی با افزایش مقدار آرد کینوا و آرد گندم جوانه زده، میزان سختی بافت نمونه های کیک اسفنجی تولیدی به طور معنی داری افزایش یافت ($p\leq 0.05$). به طوری که پائین ترین میزان سختی بافت در نمونه شاهد و بالاترین میزان آن در نمونه T₆ (کیک اسفنجی محتوی ۱۵٪ آرد کینوا + ۱۵٪ آرد گندم جوانه زده) مشاهده شد ($p\leq 0.05$). علت این امر را می توان به مقادیر بالای بکاربرده ترکیبات مذکور و اندازه ذرات آنها نسبت داد که ایجاد بافتی سفت و سخت در نمونه های کیک نموده اند. همچنین با گذشت زمان، میزان سختی بافت نمونه های کیک اسفنجی به طور معنی داری افزایش یافت ($p\leq 0.05$) که علت این امر را می توان به از دست دادن رطوبت با گذشت زمان نسبت داد. شاخص سختی به صفات نرمی یا سفتی بافت مربوط است که حداقل ارتفاع منحنی نیرو در اولین فشار است و حداقل نیروی اعمال شده طی گاز زدن کیک را نشان می دهد. از لحاظ حسی، سختی حداقل نیروی لازم برای فشردن ماده غذایی بین دندان های آسیاب تا حصول تعییر شکل معین است [۴۰]. Manohar و همکاران گزارش کردند تعییر در محتوای آب حتی به میزان ۱ درصد سبب ایجاد تعییرات قابل توجه در خصوصیات رئولوژیکی می گردد[۴۱]. Świeca و همکاران (۲۰۱۴) غنی سازی نان را با کینوا مورد بررسی قرار دادند و اعلام نمودند که جایگزینی آرد گندم در سطوح ۱-۵ درصد با آرد کینوا سبب افزایش خطی در سختی مغز نان و استحکام آن شد[۴۲].

۴-۳-۲- ارزیابی نتایج مولفه رنگی (b*)

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که در تمامی روزهای مورد بررسی با افزایش مقدار آرد کینوا و آرد گندم جوانه زده، میزان مولفه رنگی^(b*) نمونه های کیک اسفنجی تولیدی به طور معنی داری افزایش یافت ($p\leq 0.05$). به طوری که پائین ترین میزان مولفه T₆ (کیک اسفنجی محتوی ۱۵٪ آرد کینوا + ۱۵٪ آرد گندم جوانه زده) مشاهده شد ($p\leq 0.05$). همچنین با گذشت زمان، میزان مولفه رنگی^(b*) نمونه های کیک اسفنجی به طور معنی داری کاهش یافت ($p\leq 0.05$).




Fig 3 Variation of b* of sponge cake samples containing different amounts of quinoa flour and germinated wheat flour (on test days)
Different letters indicate a significant difference ($p\leq 0.05$).

T1: control sample (sponge cake without quinoa flour and germinated wheat flour), T2: sponge cake containing 1.5% quinoa flour + 1.5% germinated wheat flour, T3: Sponge Cake Containing 4.5% Quinoa Flour + 4.5% Germinated Wheat Flour, T4: Sponge Cake Containing 7.5% Quinoa Flour + 7.5% Germinated Wheat Flour, T5: Sponge Cake Containing 10.5% Quinoa Flour + 10.5% Germinated Wheat Flour, T6: Sponge Cake Containing 15% Quinoa Flour + 15% Germinated Wheat Flour, T7: sponge cake containing 0% quinoa flour + 15% germinated wheat flour, T8: sponge cake containing 15% quinoa flour + 0% germinated wheat flour

اولین گاز زدن و دومین گاز زدن بازیابی می‌شود. از دیدگاه حسی نیز مقدار برگشت ماده تغییر شکل یافته به شرایط اولیه (بدون تغییر شکل) پس از حذف نیرو جویدن را الاستیستیه گویند [۴۳].




Fig 5 Variation of Elasticity of sponge cake samples containing different amounts of quinoa flour and germinated wheat flour (on test days)

Different letters indicate a significant difference ($p \leq 0.05$).

T1: control sample (sponge cake without quinoa flour and germinated wheat flour), T2: sponge cake containing 1.5% quinoa flour + 1.5% germinated wheat flour, T3: Sponge Cake Containing 4.5% Quinoa Flour + 4.5% Germinated Wheat Flour, T4: Sponge Cake Containing 7.5% Quinoa Flour + 7.5% Germinated Wheat Flour, T5: Sponge Cake Containing 10.5% Quinoa Flour + 10.5% Germinated Wheat Flour, T6: Sponge Cake Containing 15% Quinoa Flour + 15% Germinated Wheat Flour, T7: sponge cake containing 0% quinoa flour + 15% germinated wheat flour, T8: sponge cake containing 15% quinoa flour + 0% germinated wheat flour

۴-۳-۲-ارزیابی نتایج چسبندگی بافت

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که در تمامی روزهای مورد بررسی با افزایش مقدار آرد کینوا و آرد گندم جوانه زده، میزان چسبندگی بافت نمونه‌های کیک اسفنجی تولیدی به طور معنی‌داری افزایش یافت ($p \leq 0.05$). به طوری که پائین‌ترین میزان چسبندگی بافت در نمونه شاهد و بالاترین میزان آن در نمونه T₆ (کیک اسفنجی محتوی ۱۵٪ آرد کینوا + ۱۵٪ آرد گندم جوانه زده) مشاهده شد ($p \leq 0.05$). همچنین با گذشت زمان، میزان الاستیستیه بافت نمونه‌های کیک اسفنجی به طور معنی‌داری کاهش یافت ($p \leq 0.05$). فرتیت (قابلیت ارتجاع، الاستیستیه) به صفات پلاستیک و الاستیک بودن جسم مربوط می‌شود. خاصیت ارتجاعی (برگشت پس از فشردن)، طول سیکل فشاری در طی گاز زدن دوم را نشان می‌دهد به عبارت دیگر مقدار ارتفاقی است که در مدت زمان بین انتهای




Fig 4 Variation of Texture of sponge cake samples containing different amounts of quinoa flour and germinated wheat flour (on test days)
Different letters indicate a significant difference ($p \leq 0.05$).

T1: control sample (sponge cake without quinoa flour and germinated wheat flour), T2: sponge cake containing 1.5% quinoa flour + 1.5% germinated wheat flour, T3: Sponge Cake Containing 4.5% Quinoa Flour + 4.5% Germinated Wheat Flour, T4: Sponge Cake Containing 7.5% Quinoa Flour + 7.5% Germinated Wheat Flour, T5: Sponge Cake Containing 10.5% Quinoa Flour + 10.5% Germinated Wheat Flour, T6: Sponge Cake Containing 15% Quinoa Flour + 15% Germinated Wheat Flour, T7: sponge cake containing 0% quinoa flour + 15% germinated wheat flour, T8: sponge cake containing 15% quinoa flour + 0% germinated wheat flour

۴-۳-۲-ارزیابی نتایج الاستیستیه (فتریت)

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که در تمامی روزهای مورد بررسی با تأثیر تیمار بر الاستیستیه بافت نمونه‌های کیک اسفنجی محتوی مقادیر مختلف آرد کینوا و آرد گندم جوانه زده معنی‌دار نبود ($p \geq 0.05$). در تمامی روزهای مورد بررسی اختلاف آماری معنی‌داری در میزان الاستیستیه نمونه‌ها مشاهده نشد ($p \geq 0.05$). همچنین با گذشت زمان، میزان الاستیستیه بافت نمونه‌های کیک اسفنجی به طور معنی‌داری کاهش یافت ($p \leq 0.05$). فرتیت (قابلیت ارتجاع، الاستیستیه) به صفات پلاستیک و الاستیک بودن طول سیکل فشاری در طی گاز زدن دوم را نشان می‌دهد به عبارت دیگر مقدار ارتفاقی است که در مدت زمان بین انتهای

+ ۰/۷٪ آرد گندم جوانه زده) و T₆ (کیک اسفنجی محتوی ۱۵٪ آرد کینوا + ۱۵٪ آرد گندم جوانه زده) مشاهده شد ($p \leq 0/05$) و بالاترین امتیاز رنگ متعلق به نمونه های T₇ (کیک اسفنجی محتوی ۰٪ آرد کینوا + ۱۵٪ آرد گندم جوانه زده) و T₈ (کیک اسفنجی محتوی ۱۵٪ آرد کینوا + ۰٪ آرد گندم جوانه زده) بود. پائین ترین امتیاز بو در نمونه شاهد و بالاترین میزان آن در نمونه T₈ (کیک اسفنجی محتوی ۱۵٪ آرد کینوا + ۱۵٪ آرد گندم جوانه زده) مشاهده شد ($p \leq 0/05$). پائین ترین امتیاز بافت در نمونه های T₂ (کیک اسفنجی محتوی ۵٪ آرد کینوا + ۱/۵٪ آرد گندم جوانه زده) و T₅ (کیک اسفنجی محتوی ۱۰/۵٪ آرد کینوا + ۰/۱٪ آرد گندم جوانه زده) مشاهده شد ($p \leq 0/05$). پائین ترین امتیاز پذیرش کلی در نمونه های T₁ (کیک اسفنجی فاقد آرد کینوا و آرد گندم جوانه زده)، T₄ (کیک اسفنجی محتوی ۷/۵٪ آرد کینوا + ۰/۷٪ آرد گندم جوانه زده) و T₇ (کیک اسفنجی محتوی ۰٪ آرد کینوا + ۱۵٪ آرد گندم جوانه زده) مشاهده شد ($p \leq 0/05$) و بالاترین امتیاز حسی متعلق به نمونه T₈ (کیک اسفنجی محتوی ۱۵٪ آرد کینوا + ۰٪ آرد گندم جوانه زده) بود. از دید تکنولوژیکی آرد کینوا به دلیل ظرفیت اتصال آب و اثرات تغییض کننده و بافت دهی باعث اصلاح و بهبود بافت، خواص حسی و ماندگاری می شود [۴۲]. Elgeti و همکاران (۲۰۱۲)، در بررسی حجم و بافت نان های فاقد گلوتون تهیه شده از آردهای برنج و ذرت و کینوا، آرد کینوا را در مقادیر ۴۰ تا ۱۰۰ درصد جایگزینی آردهای برنج و ذرت مورد استفاده قرار دادند و اذعان نمودند که افزودن کینوا منجر به افزایش ۳۳٪ حجم نان و همچنین ایجاد بافت و طعم و مزه مناسب تر گشته است [۴۲]. محققان در بررسی افروزن آرد کینوا، آمارانت و گندم سیاه در سطوح ۵ و ۱۰ درصد به عنوان جایگزین بخشی از آرد برنج در گلوچه بدون گلوتون بیان نمودند که نمونه های حاوی ۱۵ و ۱۰ درصد آرد کینوا و آمارانت بهترین نمونه های این پژوهش از نظر ارزیابی حسی و امتیاز پذیرش کلی بودند [۲۷].

نمونه های کیک اسفنجی به طور معنی داری کاهش یافت ($p \leq 0/05$).




Fig 6 Variation of Springiness of sponge cake samples containing different amounts of quinoa flour and germinated wheat flour (on test days)
Different letters indicate a significant difference ($p \leq 0.05$).

T1: control sample (sponge cake without quinoa flour and germinated wheat flour), T2: sponge cake containing 1.5% quinoa flour + 1.5% germinated wheat flour, T3: Sponge Cake Containing 4.5% Quinoa Flour + 4.5% Germinated Wheat Flour, T4: Sponge Cake Containing 7.5% Quinoa Flour + 7.5% Germinated Wheat Flour, T5: Sponge Cake Containing 10.5% Quinoa Flour + 10.5% Germinated Wheat Flour, T6: Sponge Cake Containing 15% Quinoa Flour + 15% Germinated Wheat Flour, T7: sponge cake containing 0% quinoa flour + 15% germinated wheat flour, T8: sponge cake containing 15% quinoa flour + 0% germinated wheat flour

۴-۴-۴- ارزیابی نتایج آزمون های حسی

نتایج تحقیق حاضر (جدول ۸) نشان داد که پائین ترین امتیاز طعم در نمونه T₆ (کیک اسفنجی محتوی ۱۵٪ آرد کینوا + ۱۵٪ آرد گندم جوانه زده) و بالاترین میزان آن در نمونه T₈ (کیک اسفنجی محتوی ۱۵٪ آرد کینوا + ۰٪ آرد گندم جوانه زده) مشاهده شد ($p \leq 0/05$). که علت این امر را می توان به علت عطر و طعم خاص کینوا نسبت داد که این ویژگی عطر و طعم خاص، برای ارزیاب ها مطلوب بود. همچنین پائین ترین امتیاز رنگ در نمونه شاهد و نمونه های T₄ (کیک اسفنجی محتوی ۷/۵٪ آرد کینوا

Table 8 Sensory evaluation of sponge cake samples containing different amounts of quinoa flour and germinated wheat flour (on test days)

| Treatments | Taste | Color | Odour | Texture | Overall acceptability |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| T ₁ | 4 ^b | 3 ^c | 2 ^d | 4 ^a | 3 ^c |
| T ₂ | 4 ^b | 4 ^b | 4 ^b | 3 ^b | 4 ^b |
| T ₃ | 3 ^c | 4 ^b | 4 ^b | 4 ^a | 4 ^b |
| T ₄ | 3 ^c | 3 ^c | 4 ^b | 4 ^a | 3 ^c |
| T ₅ | 4 ^b | 4 ^b | 4 ^b | 3 ^b | 4 ^b |
| T ₆ | 2 ^d | 3 ^c | 4 ^b | 4 ^a | 4 ^b |
| T ₇ | 3 ^c | 5 ^a | 3 ^c | 4 ^a | 3 ^c |
| T ₈ | 5 ^a | 5 ^a | 5 ^a | 4 ^a | 5 ^a |

Small letters indicate significant differences in rows and capital letters indicate significant differences in the column ($p<0.05$).

T1: control sample (sponge cake without quinoa flour and germinated wheat flour), T2: sponge cake containing 1.5% quinoa flour + 1.5% germinated wheat flour, T3: Sponge Cake Containing 4.5% Quinoa Flour + 4.5% Germinated Wheat Flour, T4: Sponge Cake Containing 7.5% Quinoa Flour + 7.5% Germinated Wheat Flour, T5: Sponge Cake Containing 10.5% Quinoa Flour + 10.5% Germinated Wheat Flour, T6: Sponge Cake Containing 15% Quinoa Flour + 15% Germinated Wheat Flour, T7: sponge cake containing 0% quinoa flour + 15% germinated wheat flour, T8: sponge cake containing 15% quinoa flour + 0% germinated wheat flour

ارزیابی نتایج آزمون های حسی نشان داد که بالاترین امتیاز رنگ متعلق به نمونه های T₇ (کیک اسفنجی محتوی ۰٪ آرد کینوا + ۱۵٪ آرد گندم جوانه زده) و T₈ (کیک اسفنجی محتوی ۱۵٪ آرد کینوا + ۰٪ آرد گندم جوانه زده) بود. پائین ترین امتیاز بو در نمونه شاهد و بالاترین میزان آن در نمونه T₈ (کیک اسفنجی محتوی ۱۵٪ آرد کینوا + ۰٪ آرد گندم جوانه زده) مشاهده شد (کیک اسفنجی محتوی ۰٪ آرد کینوا + ۰٪ آرد گندم جوانه زده) ($p\leq0.05$). بالاترین امتیاز حسی متعلق به نمونه T₈ (کیک اسفنجی محتوی ۱۵٪ آرد کینوا + ۰٪ آرد گندم جوانه زده) بود و تیمار T₈ (کیک اسفنجی محتوی ۱۵٪ آرد کینوا + ۰٪ آرد گندم جوانه زده) به عنوان تیمار برتر انتخاب شد.

5- منابع

- [1] Payan, r. 2001. An Introduction to the Technology of Cereal Products. 320 pages
- [2] Fatemi, h. (1387). Food Chemistry. Publication Joint Stock Company. P. 440.
- [3] FAO. (2013). Nutritional value- International Year of Quinoa 2013. <http://www.fao.org/quinoa-2013/what-isquinoa/nutritional-value/en>.
- [4] VegaGálvez, A., Miranda, M., Vergara, J., Uribe, E., Puente, L., & Martínez, E. A. (2010). Nutrition facts and functional potential of quinoa (*Chenopodium quinoa* willd.), an

4- نتیجه گیری کلی

نتایج نشان داد که با افزایش مقدار آرد کینوا و آرد گندم جوانه زده، میزان خاکستر، میزان پروتئین، چربی نمونه های کیک اسفنجی تولیدی به طور معنی داری افزایش یافت ($p\leq0.05$). پائین ترین میزان تخلخل در نمونه T₆ (کیک اسفنجی محتوی ۱۵٪ آرد کینوا + ۱۵٪ آرد گندم جوانه زده) و پس از آن در نمونه های T₇ (کیک اسفنجی محتوی ۰٪ آرد کینوا + ۱۵٪ آرد گندم جوانه زده) و T₈ (کیک اسفنجی محتوی ۱۵٪ آرد کینوا + ۰٪ آرد گندم جوانه زده) مشاهده شد ($p\leq0.05$). در تمامی روزهای مورد بررسی نمونه های فاقد آرد گندم، اندیس پراکسید پائین تری داشتند به طوری که پائین ترین میزان آن در نمونه T₈ (کیک اسفنجی محتوی ۱۵٪ آرد کینوا + ۰٪ آرد گندم جوانه زده) مشاهده شد ($p\leq0.05$). در تمامی روزهای مورد بررسی با افزایش مقدار آرد کینوا و آرد گندم جوانه زده، میزان مولفه های رنگی (L*) و (a*) نمونه ها به طور معنی داری افزایش یافت ($p\leq0.05$). نتایج آنالیز پروفیل بافت نشان داد که در تمامی روزهای مورد بررسی با افزایش مقدار آرد کینوا و آرد گندم جوانه زده، میزان سختی بافت نمونه های کیک اسفنجی تولیدی به طور معنی داری افزایش یافت ($p\leq0.05$).

- [15] Zeng, W., Yang, J., Pu, X., DuJ. (2013). Strategies of Functional Food for Cancer Prevention in Human Beings Asian Pac J Cancer Prev. 2013;14(3):1585-92.
- [16] Jan, K. N., Panesar, P. S., Rana, J. C., & Singh, S. (2017). Structural, thermal and rheological properties of starches isolated from Indian quinoa varieties. International Journal of Biological Macromolecules, 102, 315-322.
- [17] Gawlik-Dziki, U., Dziki, D., Świeca, M., Sęczyk, Ł., Różyło, R., & Szymanowska, U. (2015). Bread enriched with Chenopodium quinoa leaves powder—The procedures for assessing the fortification efficiency. J. LWT-Food Science and Technology, 62(2), 1226-1234.
- [18] Asgari, An Investigation of the Physicochemical Properties of Wheat and Lentil Auxiliary Foods Journal of Tarbiat Modares Food Science and Technology 1, 1 ,2,12-21
- [19] Anonmyous (2006).. Iranian Institute of Standards and Industrial Research Publications. Cake - Properties and Methods of National Standard Test No. 2553. Third Review.
- [20] Anonymous, 1995, Iranian Institute of Standards and Industrial Research Publications. Cereals and its products - Method for measuring humidity - Properties and methods of national standard test number 2705. Third revision.
- [21] Anonmyous (2013). Iranian Institute of Standards and Industrial Research Publications. Flour - Properties and Methods of National Standard Test No. 103 Third Revision.
- [22] Anonmyous (2003). AACC Approved methods of the American Association of CerealChemists (9th ed). St. Paul, MN: American Association of CerealChemists
- [23] Anonmyous (1999).National Iranian Standard. No. 37. Biscuits - Test Properties and Methods, First Edition.
- [24] Fatma, L., Ahmed, A., Rezq, M., and Rhman, M., 2010., Additional effect of defatted wheat germ protein isolate on nutritional value and functional properties of yogurts and biscuits. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 4(8), 3139-3147.
- [25] Petrović, J., Fišteš, A., Rakić, D., Pajin, B., Lončarević, I., & Šubarić, D. (2015). Effect of ancient Andean grain: a review. J. the Science of Food and Agriculture, 90(15), 2541-2547.
- [5] Nowak, V., Du, J., & Charrondière, U. R. (2016). Assessment of the nutritional composition of quinoa (*Chenopodium quinoa* Willd). J. Food chemistry, 193, 47-54.
- [6] Caperuto, L. C., Amaya-Farfán, J., & Camargo, C. R. O. (2001). Performance of quinoa (*Chenopodium quinoa* Willd) flour in the manufacture of gluten-free spaghetti. J. the Science of Food and Agriculture, 81(1), 95-101.
- [7] Jacobsen, S. E. (2003). The worldwide potential for quinoa (*Chenopodium quinoa* Willd). J. Food reviews international, 19(1-2), 167-177.
- [8] Iglesias-Puig, E., Monedero, V., & Haros, M. (2015). Bread with whole quinoa flour and bifidobacterial phytases increases dietary mineral intake and bioavailability. J. LWT-Food Science and Technology, 60(1), 71-77.
- [9] James, L. E. A. (2009). Quinoa (*Chenopodium quinoa* Willd.): composition, chemistry, nutritional, and functional properties. J. Advances in food and nutrition research, 58, 1-31.
- [10] Afify, A. E. M., Abbas, M. S., Abd El-Latif, B. M., & Ali, A. M. (2016). Chemical, rheological and physical properties of germinated wheat and naked barley. J. International Journal of ChemTech Research, 9(9), 521-31.
- [11] Kihara, M., Okada, Y., Iimure, T., & Ito, K. (2007). Accumulation and degradation of two functional constituents, GABA and β-glucan, and their varietal differences in germinated barley grains. J..Breeding Science, 57(2), 85-89.
- [12] Sharma, P., & Gujral, H. S. (2010). Antioxidant and polyphenol oxidase activity of germinated barley and its milling fractions. J. Food Chemistry, 120(3), 673-678.
- [13] De Bolle, M. F., Osborn, R. W., Goderis, I. J., Noe, L., Acland, D., Hart, C. A., ... & Broekaert, W. F. (1996). Antimicrobial peptides from *Mirabilis jalapa* and *Amaranthus caudatus*: Expression, processing, localization and biological activity in transgenic tobacco. . J. Plant molecular biology, 31(5), 993-1008.
- [14] Anonmyous (2001). Cereals and its products - Germinated wheat flour (aged flour) Characteristics and test methods (6874).

- Science and Technology. Sixth year. Number three. 65-59
- [34] Zarejad, F., Prophet, SA. Free Man, p. Damirchi, A. The Effect of Adding Raw and Stabilized Wheat Germs on the Qualitative Properties of Molded Cake Iranian Food Science and Technology Research, Vol. 10, No. 3.
- [35] Nagipour F, Mazaheri Tehrani M., Sahrani B, Sheikholeslami Z., Soleimani, M. 2013. The possibility of replacing eggs with soy flour and mixing wheat flour with wheat germ stabilized in the production of oil cake. Iranian Journal of Nutrition Sciences and Food Technology, Volume 8, Number 2, 220- 211. Shahidi, F. 2005. Quality Assurance of Fats and Oils, Baileys industrial oil and fat products. F. Shahidi. New Jersey, A. John Wiley & Sons, Inc., 1, 565-575.
- [36] Purlis, E and Salvadori, V. 2009. Modelling the browning of bread during baking. Food Research International, 42: 865-870.
- [37] Majzoobi, M., Keshni, R., Ferhatiya, 1392. Determination of some characteristics of paste enriched dough and biscuit. Journal of Food Industry Research, Volume 23, Number 2, pp. 28-2
- [38] Ghanbarzadeh B., 2009. Rheology of Food Biomaterials and Materials, University of Tehran Press, 37-80.
- [39] Manohar R, Rao H. (2002). Interrelationship between rheological characteristics of dough and quality of biscuits. Food Res Int; 35(2), 807-13.
- [40] Świeca, M., Sęczyk, Ł., Gawlik-Dziki, U., & Dziki, D. (2014). Bread enriched with quinoa leaves—The influence of protein-phenolics interactions on the nutritional and antioxidant quality. J. Food chemistry, 162, 54-62.
- [41] Majzoobi, M., Beparva, p., Farahnaky, A., Badii, f. 2014. Physicochemical Properties of Cross-linked Wheat Starch Affected by L-Ascorbic Acid Journal of Agricultural Science and Technology, 10, 16 . 355-364
- [42] Gelroth J, Ranhotra GR, M. L. Dreher, editors. 2001. Handbook of dietary fiber, newyork: marcel Dekker Inc.
- [43] Elgeti D, Nordlohne SD, Föste M, Besl M, Linden MH, Heinz V, Jekle M, Becker T. Volume and texture improvement of gluten-free bread using quinoa white flour. J Cereal Sci. 2014 Jan 31; 59(1):41-7.
- defatted wheat germ content and its particle size on the rheological and textural properties of the cookie dough. Journal of texture studies, 46(5), 374-384.
- [26] Jedani, Sh. Inconsistent, b. Barzegar, H. Sepahvand, n. (1396). The effect of adding quinoa whole flour and xanthan gum on the chemical and sensory properties of barberry bread. Iranian Journal of Nutrition Sciences and Food Technology. Twelfth year. No. 70. Volume 14. 89-79.
- [27] Haghayagh, Gh., Atta Salehi, A. Enrichment of gluten free pie with quinoa cereal flour, amaranth and buckwheat. Journal of Food Science and Technology, Volume 14, Issue 69. 283-294 Milovanović, M. and Vučelić-Radović, B. 2008. Sources, nutritional and health values of ω-3 and ω-6 fatty acids. Journal of Agricultural Sciences. 53,3, 203-213
- [28] Stikic, R., Glamoclija, D., Demin, M., Vučelic-Radovic, B., Jovanovic, Z., Milojkovic-Opsenica, D., & Milovanovic, M. (2012). Agronomical and nutritional evaluation of quinoa seeds (*Chenopodium quinoa* Willd.) as an ingredient in bread formulations. J. Cereal Science, 55(2), 132-138.
- [29] Sidhu, J.S., Al-Hoot, S.N., and Al-Safer, J.M., 1999. Effect of adding wheat bran and germ fractions on the chemical composition of high-fiber toast bread. Food Chemistry, 67, 365-371.
- [30] Shaker, and. Ghaithi Tarzi, b. 1391. Effects of Wheat Germ Addition on Chemical, Sensory, Baking and Microbial Properties of Pasta. Iranian Journal of Nutrition Sciences and Food Technology. Seventh Year, No. 3, 89- 100
- [31] Gray, J. A., & BeMiller, J. N. (2003). Bread staling: Molecular basis and control. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 2,
- [32] Ogungbenle HN1. 2003. Nutritional evaluation and functional properties of quinoa (*Chenopodium quinoa*) flour. Int J Food Sci Nutr. Mar; 54, 2,153-8.
- [33] Qavi del, R. Ghiafe davoodi, M. Karimi, M. The priestly peasant, m. (1393). The Effect of Addition of Processed Wheat Germ on the Quantitative and Qualitative Characteristics of Oily Cake. Journal of Innovation in Food

Iranian Journal of Food Science and Technology

Homepage:www.fsct.modares.ir

Scientific Research

The effect of adding quinoa flour and germinated wheat flour on the physicochemical, microbial and sensory properties of sponge cake

Javaheripour, N. ¹, Shahsoni Mojarad, L. ^{2*}, Mehdikhani, Sh. ³, Inanloo, Y. ⁴

1. M.Sc. in Food Science and Technology, Ghods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2. Assistant Professor, Department of Food Science and Technology, Ghods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3. Assistant Professor, Department of Food Science and Technology, Ghods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4. M.Sc., Lecturer, University of Applied Sciences, Karaj Sugar Factory, Karaj, Iran

ARTICIE INFO**ABSTRACT****Article History:**

Received 2020/01/11

Accepted 2021/03/08

Keywords:

Sponge cake,
Quinoa,
Wheat flour,
Germination.

DOI: [10.52547/fsct.18.119.375](https://doi.org/10.52547/fsct.18.119.375)

*Corresponding Author E-Mail:
Shahsavani.l@gmail.com

In the present study, the effect of adding quinoa flour and germinated wheat flour on the physicochemical, microbial and sensory properties of sponge cake was investigated. The results showed that as the amount of quinoa flour and germinated wheat flour increased, ash, protein, and fat content of sponge cake samples significantly increased ($p<0.05$). The lowest porosity was observed in sample T6 (sponge cake containing 15% quinoa flour + 15% wheat flour) ($p\leq0.05$). The highest moisture content was observed in sample T8 (sponge cake containing 15% quinoa flour + 0% germinated wheat flour) on all days ($p\leq0.05$). Texture profile analysis results showed that texture of sponge cake samples significantly increased with increasing amount of quinoa flour and germinated wheat flour ($P\leq0.05$). Evaluation of sensory test results showed that the highest color score belonged to sample T7 (sponge cake containing 0% quinoa flour + 15% germinated wheat flour) and sample T8 (sponge cake containing 15% quinoa flour + 0% germinated wheat flour). The lowest odor score was observed in the control sample and the highest in the sample T8 (sponge cake containing 15% quinoa flour + 0% germinated wheat flour) ($p\leq0.05$). The highest sensory score belonged to the sample T8 (sponge cake containing 15% quinoa flour + 0% germinated wheat flour) and sample T8 (sponge cake containing 15% quinoa flour + 0% germinated wheat flour) was selected as the highest treatment.