

تأثیر شستشو با آب مقطر، اسید سیتریک و کلرید کلسیم بر ترکیب شیمیایی پروتئین ضایعات ماهی قزل آلائی رنگین کمان و فعالیت آنتی اکسیدانی و ضد دیابت پروتئین هیدرولیز

مهدی نیکو^{۱*}، حسن احمدی گاولیقی^۲، مهران یاسمی^۳

۱- استادیار پژوهشکده آرتمیا و آبی پروری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، آذربایجان غربی

۲- استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

۳- دانشیار موسسه علمی کاربردی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی، تهران، ایران

(تاریخ دریافت: ۹۷/۰۵/۰۲ تاریخ پذیرش: ۹۷/۱۱/۱۴)

چکیده

در این مطالعه تأثیر پیش تیمارهای مختلف شامل: روش ۱- مینس ضایعات (BP-FPI)، روش ۲- شستشوی مینس ضایعات با آب (WBP-FPI)، روش ۳- شستشوی مینس ضایعات با اسید سیتریک + کلرید کلسیم (CaCi-BPFPI)، روش ۴- شستشوی مینس ضایعات با اسید سیتریک + کلرید کلسیم + شستشوی دوم با آب (CaCi-W- BPFPI) و روش ۵- شستشوی مینس ضایعات با آب + شستشوی دوم با اسید سیتریک + کلرید کلسیم (W-CaCi-BPFPI) بر ترکیب شیمیایی پروتئین ایزوله از ضایعات ماهی قزل آلائی رنگین کمان (*Oncorhynchus mykiss*) بررسی گردید. شستشو با آب مقطر (روش ۲) و با آب مقطر + مخلوط اسید سیتریک و کلرید کلسیم (روش ۵) تأثیر زیادی بر کاهش آهن هم و فسفولپید داشت ($P < 0/05$). روش شستشو تأثیر معنی داری بر راندمان استخراج پروتئین ایزوله داشت بطوریکه کمترین درصد استخراج (۹/۴ درصد) مربوط به روش ۵ بوده است ($P < 0/05$). پروتئین های حاصل از روشهای ۲ تا ۵ از روشنایی بالاتری نسبت به پروتئین تولید شده بطور مستقیم از ضایعات داشتند ($P < 0/05$). روش ۱ منجر به بالاترین قرمزی (۹/۳۶) در پروتئین گردید ولی نمونه ۵ دارای کمترین رنگ قرمزی (۱/۱۹) بود ($P < 0/05$). پروتئین هیدرولیز تولید شده از پروتئین روش ۵ دارای فعالیت آنتی اکسیدانی در غلظت های مختلف بوده است. همچنین، وجود پپتید های کوچک در پروتئین هیدرولیز سبب فعالیت ضد دیابت در آن گردید. نتیجه نشان داد که شستشو با آب مقطر به تنهایی (روش ۲) و یا در ترکیب با اسید سیتریک + کلرید کلسیم (روش ۵) برای تهیه پروتئین ایزوله با مقدار کمتر ترکیبات پرواکسیدانی از ضایعات ماهی قزل آلائی رنگین کمان مناسب می باشد.

کلید واژگان: قزل آلائی رنگین کمان، ضایعات، روش های شستشو، ترکیب شیمیایی، فعالیت آنتی اکسیدانی، فعالیت ضد دیابت

* مسئول مکاتبات: m.nikoo@urmia.ac.ir

۱- مقدمه

تولید آبی پروری غذاهای دریایی در مقیاس جهانی رو به افزایش است بطوریکه در سال ۲۰۱۴ رقم تولید به بیشتر از ۱۶۰ میلیون تن رسید [۱] که به دلیل افزایش جمعیت جهان و نیاز به تقاضای غذای بالاتر می باشد. از فرآوری صنعتی ماهی، حدود ۳۵۰ تا ۶۰۰ کیلوگرم ضایعات جامد از هر تن تولید می شود که عمدتاً در تولید کود و خوراک آبزیان (ماهی و میگوی پرورشی) استفاده می شود [۲]. با در نظر گرفتن محتوی ارزشمند پروتئینی ضایعات و در صورت هندلینگ و نگهداری صحیح، می توانند جهات مصارف انسانی کاربرد داشته باشند و لذا به عنوان ترکیبات با ارزش افزوده در تامین پایدار منابع غذایی مناسب باشند [۳]. طبق گزارشات FAO، تولید جهانی قزل آلی رنگین کمان در سال ۲۰۱۴ معادل ۸۱۴ هزار تن بوده و ایران یکی از بزرگترین تولیدکننده بزرگ این ماهی سردآبی می باشد. مقادیر زیادی از ضایعات (حدود ۳۰ درصد وزن) شامل سر، امعاء و احشاء، استخوان و باله پس از تهیه فیله از قزل آلا تولید می شود. علاوه بر غنی بودن از پروتئین، پروتئین های آبزیان دارای پپتید های زیست فعال^۱ در توالی اسید آمینه خود می باشند. مطالعات انجام شده طی سال های اخیر نشان داد که پروتئین هیدرولیز و پپتید های آبزیان دارای اثرات مثبت بر سلامتی^۲ بوده و پتانسیل استفاده به عنوان ترکیبات فراسودمند در مواد غذایی را دارند [۴]، [۵]. پپتید های آبزیان نشان داده شده که از طریق کنترل بیماری های قلبی-عروقی، سرطان، چاقی و دیابت سبب حفظ سلامتی انسان خواهند شد [۶].

یکی از مشکلاتی که در زمان تولید پروتئین هیدرولیز اتفاق می افتد، اکسیداسیون بدلیل وجود ترکیبات پرواکسیدانی مانند فسفولپید، آهن هم، میوگلوبین و ترکیبات نامطلوب چربی است. اکسیداسیون چربی منجر به خواص ارگانولپتیک نامطلوب و عدم ثبات اکسیداتیو و نهایتاً کاهش مشتری پسندی و قابلیت کاربرد در فرآورده های غذایی می شود [۷]. کاهش چربی، خصوصاً فسفولپید، و آهن هم منجر به تولید پروتئین هیدرولیز با خواص زیستی بهتر خواهد شد. استفاده از کلرید کلسیم و اسید سیتریک

جهت کاهش ترکیبات پرواکسیدانی از مینس ماهی مورد بررسی قرار گرفت. تیمار مینس ماهی کد و هرینگ با کلرید کلسیم و اسید سیتریک سبب قطع اتصال چربیهای غشایی و پروتئین های سیتواسکلتی و نهایتاً تولید تجمع غشایی گردید که با سانتریفیوژ جدا شد [۸]. شستشوی ضایعات ماهی هیگ^۳ با کلرید کلسیم و اسید سیتریک نیز سبب کاهش سطح فسفولپید محلول قلیایی پروتئین شد [۹]. ولی پروتئین هیدرولیز حاصل دارای روشنایی کمتر و قرمزی بالاتر در مقایسه با پروتئین تولید شده از ضایعات شسته نشده بود. دلیل این امر به محلول شدن همزمان پروتئین های هم در زمان شستشو با کلرید کلسیم و اسید سیتریک نسبت داده شد که نهایتاً در پروتئین هیدرولیز وجود خواهند داشت.

تاثیر شستشو با آب مقطر به تنهایی و یا در ترکیب با کلرید کلسیم و اسید سیتریک در زمان حلالیت قلیایی پروتئین برای جداسازی چربی، فسفولپید، و ترکیبات پرواکسیدانی محلول در آب بررسی شد. مینس ماهی ساردین که با آب مقطر قبل یا بعد از تیمار با کلرید کلسیم و اسید سیتریک شستشو داده شد، دارای مقدار کمتری آهن هم و میوگلوبین بود [۷]. جهت بهبود رنگ پروتئین و کاهش ترکیبات پرواکسیدانی از ضایعات ماهی، شستشو با آب مقطر در جریان تیمار با کلرید کلسیم و اسید سیتریک می تواند مفید باشد. با این وجود، مطالعه ای در رابطه با روش های شستشو بر پایه آب مقطر در ترکیب با کلرید کلسیم و اسید سیتریک در ضایعات ماهی و بخصوص ضایعات قزل آلی رنگین کمان وجود ندارد. هدف این مطالعه ارزیابی تاثیر شستشوی ضایعات هموزن شده قزل آلی رنگین کمان با آب مقطر در مراحل قبل و یا بعد از تیمار با کلرید کلسیم و اسید سیتریک بر ترکیب شیمیایی، و فعالیت آنتی اکسیدانی و ضد دیابت پروتئین هیدرولیز ضایعات بوده است.

۲- مواد و روشها

۲-۱- مواد مورد استفاده

2,2'-azinobios-(3-ethylbenzothiazoline-6-2,2-diphenyl-1-sulphonic acid) (ABTS)

3. *Merlucciusmerluccius*

1. Bioactive peptides
2. Health benefits

زن الکتریکی بهم زده شد. در پی اچ ۱۱ محلول به مدت ۱۰ دقیقه مجدداً بهم زده شد و سپس طبق روش ۲ سانتیفیوژ گردید. پروتئین محلول توسط اسید کلریدریک ۱ نرمال به پی اچ ۴/۵ رسانده شده و پس از هم زدن به مدت ۱۰ دقیقه با سانتیفیوژ پروتئین ترسیب و جدا گردید.

روش ۴: در این روش ضایعات هموژن شده طبق روش ۱ تولید و با محلول اسید سیتریک (۵ میلی مول) + کلرید کلسیم (۸ میلی مول) به نسبت ۱ به ۵ مخلوط و به مدت ۲ دقیقه هموژن شد و قیل از آنکه پی اچ آن به ۱۱ رسانده شود، به مدت ۶۰ دقیقه توسط هم زن الکتریکی بهم زده شد. در پی اچ ۱۱ محلول به مدت ۱۰ دقیقه مجدداً بهم زده شد و سپس طبق روش ۲ سانتیفیوژ گردید. سوپرناتانت دور ریخته شده و پلت توسط آب مقطر سرد برای مدت ۱۵ دقیقه بهم زده شد و در دور ۶۰۰۰ در دقیقه در دمای ۴ درجه سانتی گراد سانتیفیوژ گردید. پلت حاصل برای تولید پروتئین به روش حلالیت قلیایی-رسوب اسیدی طبق روش ۳ استخراج گردید.

روش ۵: در این روش ضایعات هموژن شده طبق روش ۱ تولید و توسط آب مقطر سرد برای مدت ۱۵ دقیقه بهم زده شد و در مرحله بعد در دور ۶۰۰۰ در دقیقه در دمای ۴ درجه سانتی گراد سانتیفیوژ گردید. بعد از آن پلت توسط محلول اسید سیتریک (۵ میلی مول) + کلرید کلسیم (۸ میلی مول) به نسبت ۱ به ۵ مخلوط و به مدت ۲ دقیقه هموژن شد و برای مدت دقیقه توسط هم زن الکتریکی بهم زده شد. بعد از سانتیفیوژ طبق بالا، پلت برای تولید پروتئین به روش حلالیت قلیایی-رسوب اسیدی طبق روش ۳ بکار برده شد. کلیه نمونه های پروتئین ایزوله وسط فریز درایر (type 102042, Christ, Germany) برای مدت ۲۴ ساعت خشک شدند.

۲-۳- هیدرولیز آنزیمی

جهت انجام هیدرولیز محلول ۳ درصد پروتئین ایزوله از آنزیم آلکالاز استفاده شد. غلظت آنزیم به پروتئین ۱ به ۲۰ و هیدرولیز به مدت ۱۸۰ دقیقه در دمای ۵۰ درجه دسانتی گراد صورت پذیرفت. طی زمان هیدرولیز، جهت ثابت نگه داشتن PH از هیدروکسید سدیم ۱ نرمال استفاده گردید. بعد از اتمام واکنش، محلول پپتیدی در دمای ۱۰۰ درجه سانتی گراد به مدت ۱۰ دقیقه

(DPPH) picrylhydrazyl 5,6-(2-Pyridyl)-
diphenyl-1,2,4-triazine-4',4''-disulfonic acid
p-nitrophenyl α -D-sodium salt (ferrozine)
Rat intestinal acetone glucopyranoside
Alcalase 2.4L (Proteinase from *Bacillus* powder
licheniformis) از شرکت سیگما (آمریکا) خریداری شدند.
سایر مواد آزمایشگاهی شامل کلرید کلسیم، اسید سیتریک، کربنات سدیم، اسید کلریدریک، هیدروکسید سدیم، کلرید آهن و متانول از نوع گرید آزمایشگاهی بودند.

۲-۲- استخراج پروتئین ضایعات به روشهای مختلف

روش ۱: ضایعات شامل سر (۳۶ درصد)، امعاء و احشاء (۲۶/۸۵ درصد)، باله (۷/۴ درصد) و استخوان ستون فقرات (۲۹/۶۲ درصد) توسط چرخ گوشت با قطر سوراخ ۳ میلی متری به شکل یکنواخت در آمده و سپس با ۵ حجم آب سرد به مدت ۲ دقیقه هموژن (Heidolph DIAX900, Germany) گردید.
ضایعات هموژن شده برای مدت ۱۵ دقیقه توسط هم زن الکتریکی (FTDS-11, SciFinetech Co., South Korea) بهم زده شد و تا زمان تهیه پروتئین هیدرولیز در دمای ۱-۸ درجه سانتی گراد نگهداری گردید.

روش ۲: ضایعات هموژن شده طبق روش ۱ تولید و سپس توسط محلول قلیایی با پی اچ ۱۱ (pH 7110, Xylem Analytics) پروتئین به شکل محلول در آورده شد. محلول به مدت ۳۰ دقیقه توسط هم زن الکتریکی بهم زده شد و سپس در دور ۶۰۰۰ در دقیقه در دمای ۴ درجه سانتی گراد به مدت ۱۰ دقیقه سانتیفیوژ گردید (Z 326 K, HERMLE Labortechnik GmbH, Germany). پروتئین محلول توسط اسید کلریدریک ۱ نرمال به پی اچ ۴/۵ رسانده شده و پس از هم زدن به مدت ۱۰ دقیقه با سانتیفیوژ پروتئین ترسیب و جدا گردید.

روش ۳: ضایعات هموژن شده طبق روش ۱ تولید و با محلول اسید سیتریک (۵ میلی مول) + کلرید کلسیم (۸ میلی مول) به نسبت ۱ به ۵ مخلوط و به مدت ۲ دقیقه هموژن شد و قیل از آنکه پی اچ آن به ۱۱ رسانده شود، به مدت ۶۰ دقیقه توسط هم

میکرولیتر محلول آنزیمی به مدت ۱۰ دقیقه انکوبه گردید. بعد از آن، ۱۰۰ میکرولیتر محلول سوبسترا اضافه و مخلوط برای ۵ دقیقه دیگر در دمای اتاق نگهداری شد. با افزودن ۱ میلی لیتر محلول کربنات سدیم ۰/۲ مول واکنش متوقف گردید و جذب نمونه ها در طول موج ۴۰۵ نانومتر قرائت شد. درصد بازدارندگی فعالیت آنزیم توسط فرمول زیر محاسبه گردید: بازدارندگی فعالیت آلفا-گلوکوسیداز = جذب کنترل - جذب نمونه/جذب کنترل × ۱۰۰.

۲-۷- فعالیت بازدارندگی آنزیم آلفا-گلوکوسیداز

پستانداران

فعالیت بازدارندگی آنزیم آلفا-گلوکوسیداز پستانداران با استفاده از پودر استونی روده موش^۴ به عنوان محلول آنزیمی (22 mU/mL) و p-nitrophenyl- α -D-glucopyranoside (5 میلی مول) تهیه شده در بافر ۰/۱ مول فسفات (pH 6.9) به عنوان سوبسترا تعیین شد. فعالیت بازدارندگی از طریق آزادسازی ترکیب p-nitrophenyl در طول موج ۴۰۵ نانومتر توسط میکروپلیت ریدر (BioTek Instruments Inc., VT) به روش Connolly و همکاران [۱۳] اندازه گیری شد.

۲-۸- جداسازی فرکشن های پپتیدی به روش

ژل فیلتراسیون

به منظور جداسازی فرکشن های پپتیدی از کروماتوگرافی غریبال مولکولی با کاربرد Sephadex G-15 استفاده شد. برای جداسازی پپتید های ضایعات قزل آلا، پروتئین هیدرولیز زمان ۱۸۰ دقیقه در غلظت ۱۰ میلی گرم در میلی لیتر تهیه گردید. ستون (به طول ۱ متر و عرض ۱/۲ سانتی متر) توسط ژل سفادکس پر و توسط آب مقطر بخوبی مورد شستشو قرار گرفت. شدت جریان آب مقطر در حد ۱ میلی لیتر در دقیقه تنظیم و پس از عبور پپتید ها از Sephadex G-15، فرکشن ها (هر کدام ۳ میلی لیتر) جمع آوری شدند. فعالیت آنتی اکسیدانی این فرکشن ها در مهار رادیکال های DPPH، ABTS و شلاته کنندگی یون آهن سنجش گردید.

۲-۹- فعالیت مهار رادیکال DPPH

جوشانده شد تا آنزیم غیر فعال گردد. بعد از سرد شدن، در دور ۶ هزار دور در دقیقه و به مدت ۱۰ دقیقه سانتریفیوژ و توسط دستگاه فریز درایر خشک شد.

۲-۴- تعیین رنج وزن مولکولی پپتید ها

رنج وزن مولکولی پپتید ها در پروتئین هیدرولیز توسط ستون TSKgel 2500 PWXL (7.8 × 300 mm, Tosoh, HPLC (Agilent Tokyo, Japan) متصل به دستگاه استونیتیل/ تری فلورواستیک اسید با نسبت ۷۰/۳۰/۰/۱ بود. 1100, USA) اندازه گیری شد. فاز متحرک شامل آب/ استونیتیل/ تری فلورواستیک اسید با نسبت ۷۰/۳۰/۰/۱ بود. جذب در طول موج ۲۲۵ نانومتر قرائت شد و شدت جریان ۰/۵ میلی لیتر در دقیقه بوده است. Cytochrome C (۱۲۳۸۴ دالتون)، bacitracin (۱۴۲۳ دالتون)، Gly-Gly-Arg (۴۵۱ دالتون) و Gly-Gly-Gly (۱۸۹ دالتون) به عنوان استانداردهای وزن مولکولی مورد استفاده قرار گرفتند.

۲-۵- تعیین میزان آهن هم و فسفولپید

آهن هم به روش Cheng و Ockerman اندازه گیری شد [۱۱]. مقدار ۲ گرم نمونه با ۹ میلی لیتر اسید استون (حاوی ۲ درصد اسید کلریدریک) مخلوط و پس از ورتکس برای مدت ۱ ساعت در دمای اتاق انکوبه گردید و سپس با کاغذ واتمن شماره ۴۲ فیلتر شد. جذب نمونه ها در طول موج ۶۸۰ نانومتر توسط اسپکتروفوتومتر خوانده شد. عدد بدست آمده با ۶۸۰ ضرب شد تا مقدار کل رنگدانه بر حسب میکروگرم در گرم بدست آید. آهن هم (میلی گرم در ۱۰۰ گرم) با ضرب مقدار کل رنگدانه در ۰/۰۰۸۸۲ محاسبه شد. مقدار فسفولپید نیز به روش Khantaphant و همکاران [۷] بر حسب میلی گرم در ۱۰۰ گرم تعیین شد.

۲-۶- سنجش فعالیت ضد دیابت

فعالیت بازدارندگی آنزیم آلفا-گلوکوسیداز مخمیری فعالیت ممانعت کنندگی آنزیم آلفا-گلوکوسیداز به روش Yu و همکاران [۱۲] صورت پذیرفت. آلفا-گلوکوسیداز مخمیری در بافر فسفات ۰/۱ میل مول (پی اچ ۶/۸) بعنوان منبع آنزیم استفاده گردید. سوبسترا p-nitrophenyl α -D-glucopyranoside در غلظت ۱۰ میلی مول در بافر فسفات ۰/۱ مول (پی اچ ۶/۸) حل گردید. ۲۵۰ میکرولیتر نمونه با ۱۵۰

پروتئین های ایزوله حاصل از ضایعات (روش ۱)، ضایعات شسته شده با آب مقطر (روش ۲)، ضایعات شسته شده با اسید سیتریک + کلرید کلسیم (روش ۳)، ضایعات شسته شده با مخلوط اسید سیتریک (۵ میلی مول) و کلرید کلسیم (۸ میلی مول) + آب مقطر (روش ۴) و ضایعات شسته شده با آب مقطر + مخلوط اسید سیتریک و کلرید کلسیم (روش ۵) ترکیب شیمیایی مختلفی از خود نشان دادند. روش شستشو تاثیر معنی داری بر راندمان استخراج پروتئین ایزوله داشت بطوریکه کمترین درصد استخراج (۹/۴ درصد) مربوط به روش ۵ بوده است ($P < 0/05$) (شکل ۱). شستشو با آب مقطر (روش ۲) و با آب مقطر + مخلوط اسید سیتریک و کلرید کلسیم (روش ۴) تاثیر زیادی بر کاهش آهن هم و فسفولپید داشت (شکل ۲) ($P < 0/05$) بالاترین میزان آهن هم و فسفولپید مربوط به روش ۳ بوده است ($P < 0/05$). پروتئین های حاصل از روشهای ۲ تا ۵ از روشنایی بالاتری نسبت به پروتئین تولید شده بطور مستقیم از ضایعات داشتند (جدول ۱) ($P < 0/05$). روش ۱ منجر به بالاترین قرمزی (۹/۳۶) در پروتئین گردید ولی نمونه ۵ دارای کمترین رنگ قرمزی (۱/۱۹) بود ($P < 0/05$).




Fig 1 Yield of rainbow trout by-product protein isolate with different pretreatments. Bars represent the standard deviation from triplicate determinations. Different letters indicate significant differences ($P < 0.05$).

توانایی مهار رادیکالهای DPPH با استفاده از روش Benjakul و Senphan [۱۴] انجام شد. از محلول ۰/۱ میلی مول DPPH برای سنجش فعالیت آنزیمی استفاده شده و جذب نمونه ها در طول موج ۵۱۹ نانومتر خوانده شد. فعالیت آنتی اکسیدانی از طریق فرمول زیر برحسب درصد محاسبه می گردد: (جذب کنترل - جذب نمونه / جذب کنترل $\times 100$)

۱۰-۲- فعالیت مهار رادیکال ABTS

تعیین فعالیت حذف کنندگی رادیکالهای ABTS به روش Benjakul و Senphan [۱۴] انجام شد. محلول واکنشی از ترکیب ۷/۴ میلی مول ABTS و ۲/۶ میلی مول پتاسیم پرسولفات به نسبت ۱ به ۱ تهیه و توسط متانول جذب آن به ۱/۱۰۰ در طول موج ۷۳۴ نانومتر رسانده شد. نمونه ها قبل از خواندن جذب نمونه ها به مدت ۲ ساعت در تاریکی نگهداری شدند. فعالیت آنتی اکسیدانی از طریق فرمول زیر برحسب درصد تعیین گردید: (جذب کنترل - جذب نمونه / جذب کنترل $\times 100$)

۱۱-۲- فعالیت شلاته کنندگی یون آهن

فعالیت شلاته کنندگی یون آهن به روش Benjakul و Senphan [۱۴] اندازه گیری شد. پس از واکنش ۳۰۰ میکرولیتر نمونه با ۳۵/۵ میکرولیتر کلرید آهن و انکوباسیون مجدد برای مدت ۳ دقیقه، با مقدار مناسب فروزین (۵ میلی مول) مخلوط و برای ۲۰ دقیقه در دمای اتاق نگهداری گردیدند. جذب نمونه در طول موج ۵۶۲ نانومتر قرائت شد. فعالیت آنتی اکسیدانی از طریق فرمول زیر برحسب درصد تعیین گردید: (جذب کنترل - جذب نمونه / جذب کنترل $\times 100$)

۱۲-۲- آنالیز آماری

آنالیز آماری داده ها با استفاده از آنالیز واریانس (One-way ANOVA) انجام و مقایسه بین میانگین ها توسط آزمون چند دامنه ای دانکن انجام شد. از نرم افزار SPSS شماره ۱۶ جهت آنالیز آماری استفاده گردید. معنی داری داده ها در سطح اطمینان ۹۵ درصد ($P < 0/05$) بررسی گردید.

۳- نتایج




Fig 2 Heme iron (a) and phospholipid contents (b) of rainbow trout by-product protein isolate with different pretreatments. Method 1 (homogenized by-product, BP-FPI), Method 2 (washed by-product-alkaline solubilized isolate, WBP-FPI), Method 3 (CaCl₂-citric acid treated-alkaline solubilized isolate, CaCi- BPFPI), Method 4 (CaCl₂-citric acid treated-washed- alkaline solubilized isolate, CaCi-W-BPFPI), Method 5 (washed- CaCl₂-citric acid treated-alkaline solubilized isolate, W-CaCi-BPFPI). Bars represent the standard deviation from triplicate determinations. Different letters indicate significant differences ($P < 0.05$).

Table 1 Color parameters of rainbow trout protein isolates obtained from different processes.

Protein isolates	L*	a*	b*
BP-FPI	30.86 ± 1.61 ^c	9.36 ± 0.74 ^a	11.34 ± 0.21 ^d
W-FPI	46.57 ± 2.01 ^{ab}	7.52 ± 0.30 ^b	43.36 ± 1.72 ^a
CaCi- BPFPI	44.59 ± 2.73 ^b	3.89 ± 0.21 ^c	28.06 ± 1.27 ^b
CaCi-W- BPFPI	49.82 ± 0.90 ^a	1.23 ± 0.32 ^d	25.09 ± 1.05 ^c
W-CaCi-BPFPI	46.51 ± 3.41 ^{ab}	1.19 ± 0.04 ^d	24.43 ± 1.67 ^c

Values represent M ± SD (n = 5). Different superscript letters (a-d) denote significant differences among protein isolates prepared using different processes ($P < 0.05$).

(جدول ۲). همچنین پپتیدهای با وزن بالاتر از ۵ و ۱۰ کیلودالتون نیز در ترکیب پروتئین هیدرولیز وجود داشت.

نتیجه آنالیز وزن مولکولی پپتیدها نشان داد که ۳۷/۱۱ درصد ترکیب پروتئین هیدرولیز به شکل اسید آمینه آزاد و ۲۶/۹۴ درصد از نوع دی- و تری-پپتید با تعداد ۲ و ۳ اسید آمینه بوده است.

Table 2 Molecular weight distribution of peptides in rainbow trout protein hydrolysate

Molecular weight distribution (Da)	% Peptide fraction
>10000	5.98
10000-5000	1.51
5000-3000	2.38
3000-2000	3.20
2000-1000	9.02
1000-500	13.87
500-180	26.94
<180	37.11

های DPPH بود. پپتیدهای کوچک زنجیره در مقایسه با انواع بزرگتر توانایی آنتی اکسیدانی بالایی نشان داده بطوریکه منجر به جداسازی کامل دو پیک از یکدیگر گردید. فرکشن شماره ۲۴ بالاترین خاصیت شلاته کنندگی یون آهن را در غلظت ۲ میلی گرم در میلی لیتر داشته است (۸۸/۷۹ درصد). فرکشن های ۱۶ و ۱۷ کمترین فعالیت شلاته کنندگی در بین فرکشن ها را داشته اند. الگوی مهار رادیکال های ABTS مشابه شلاته کنندگی یون آهن بود بطوریکه فرکشن های ۲۱ ال ۲۳ بالاترین فعالیت آنتی اکسیدانی را نشان دادند (۸۵/۵ درصد).




Fig 4 DPPH, ABTS and metal chelating activity of peptide fractions obtained from Sephadex G-15 gel filtration column equilibrated and eluted with distilled water (1 mg/mL).

درصد بازدارندگی آنزیم آلفا-گلوکوسیداز مخمری توسط پروتئین هیدرولیز در شکل ۳ نشان داده شده است. بطور کلی درصد بازدارندگی با افزایش غلظت پپتید از ۱۰ تا ۵۰۰ میکروگرم در میلی لیتر افزایش یافت و بین ۲/۸ تا ۹۹ درصد بود. بالاترین فعالیت بازدارندگی این آنزیم مربوط به غلظت ۵۰۰ میکروگرم در میلی لیتر بود ($P < 0/05$). قدرت بازدارندگی ۵۰ درصدی آلفا-گلوکوسیداز مخمری (IC_{50}) توسط پپتیدها حدود ۲۰ میکروگرم در میلی لیتر بود. از اینرو، پروتئین هیدرولیز حداقل ۲/۵ برابر قوی تر از آکاربوز در مهار آلفا-گلوکوسیداز مخمری بوده است. فعالیت بازدارندگی آنزیم آلفا-گلوکوسیداز پستانداران توسط آکاربوز در غلظت ۵۰۰ میکروگرم در میلی لیتر در حدود ۸۰ درصد بود که از این جهت در مقایسه با پروتئین هیدرولیز در غلظت ۱۰ میلی گرم در میلی لیتر بالاتر بود ($P < 0/05$).




Fig 3 Yeast and mammalian α -glucosidase inhibitory activity of hydrolysate from rainbow trout by-product. AC: Acarbose; Y: Yeast; M: Mammalian

پس از جدا سازی اولیه پپتیدها، تعداد ۲۹ فرکشن پپتیدی جمع آوری و فعالیت آنتی اکسیدانی هر کدام سنجش گردید (شکل ۴). فرکشن های بدست آمده فعالیت آنتی اکسیدانی بالایی نشان دادند. فعالیت آنتی اکسیدانی پپتیدهای بزرگ زنجیره در مهار رادیکال های DPPH بالاتر از پپتیدهای کوچکتر با RT^5 بیشتر بوده است. فرکشن شماره ۵ دارای بالاترین فعالیت آنتی اکسیدانی (۴۹/۷۶ درصد) بوده است. نتایج حاکی از وجود دو پیک پس از جداسازی بوده است. با این وجود، نتیجه فعالیت مهار رادیکال های ABTS و شلاته کردن یون آهن عکس نتایج مهار رادیکال

5. Retention time

۴- بحث

در روش ۵ علیرغم اینکه دارای ترکیب شیمیایی مناسبی بود ولی درصد استخراج کمتر از سایر نمونه ها بود. ولی بدون در نظر گرفتن فاکتور رنگی قرمزی در روش ۲ که بالاتر از روش ۵ بود، به لحاظ سایر ویژگی های ترکیب شیمیایی و راندمان استخراج، روش ۲ می تواند روش مناسبی برای استخراج پروتئین در نظر گرفته شود.

پس از هیدرولیز ضایعات ماهی قزل آلا توسط آلکالاز، پپتیدهایی با اندازه های مختلف تولید گردیدند. این امر نشان دهنده شکستگی پیوند های پپتیدی و تولید قطعات کوچکتری از زنجیره پلی پپتید می باشد. حدود ۵۵ درصد پپتیدها در پروتئین هیدرولیز ضایعات ماهی قزل آلا دارای وزن مولکولی کمتر از ۵۰۰ دالتون بودند. فعالیت آنتی اکسیدانی پروتئین هیدرولیز و پپتید به طول زنجیره پپتید، نوع اسیدهای آمینه در زنجیره پپتید، توالی اسیدهای آمینه و قرارگیری در موقعیت های انتهایی کربوکسیلیک و آمینو زنجیره یا نزدیک به این موقعیت ها بستگی دارد [۱۶، ۱۵]. اغلب پپتیدهای آنتی اکسیدانی دارای ویژگی های ساختاری مشابه می باشند بطوریکه از ۳ تا ۱۶ اسید آمینه تشکیل یافته، وزن مولکولی بین ۲۰۰ تا ۱۸۰۰ دالتون دارند و معمولا دارای اسیدهای آمینه آبگریز در زنجیره خود می باشند [۱۷، ۱۸، ۱۹]. این پپتیدها دارای قدرت حذف رادیکال های آزاد و توانایی شلاته کردن یون های آهن می باشند [۲۰]. پپتیدهای کوچک زنجیره فعالیت آنتی اکسیدانی بالاتریدر مقایسه با پپتیدهای بزرگتر دارند [۱۵]. پروتئین هیدرولیز ضایعات قزل آلا با توجه به ترکیب خاص پپتیدی خود می تواند فعالیت آنتی اکسیدانی در کنترل فرایندهای اکسیداتیو داشته باشد.

نتایج بازدارندگی آنزیم آلفا-گلوکوسیداز نشان داد که پروتئین هیدرولیز ماهی می تواند یکی از موثرترین ترکیبات طبیعی در کنترل آنزیم های مرتبط با تجزیه کربوهیدرات باشد. پروتئین هیدرولیز عضله ماهی ساردین که از تخمیر باکتری باسیلوس لیچنی فورمیس^۱ و یا تریپسین هیدرولیز گردید نشان داده شد که می تواند سبب توقف فعالیت آنزیم آلفا-گلوکوسیداز با IC₅₀ برابر با ۴۸/۷ و ۱۲۴/۱ میلی گرم در میلی لیتر باشد [۲۱]. مقایسه توانایی پروتئین هیدرولیز ضایعات قزل آلا با سایر ترکیبات

ترکیب شیمیایی پروتئین ضایعات هموزن شده ماهی قزل آلا رنگین کمان تحت تاثیر روش های مختلف شستشو قرار گرفت. مقدار آهن هم و فسفولپید در پروتئین حاصل از شستشو به روش های ۲ و ۵ در مقایسه با سایر روشها کمتر بوده و همچنین ترکیب اسید سیتریک و کلرید کلسیم به تنهایی یا در ترکیب با آب مقطر توانستند سبب کاهش آهن هم و فسفولپید شوند. شستشو روشی به منظور حذف پروتئین های محلول در آب (سارکوپلازمیک) و ترکیبات پرواکسیدانی که بطور طبیعی در ماهی وجود دارند می باشد. برخی مطالعات نشان دادند که شستشو می تواند سبب کاهش میزان فسفولپید مینس ماهی گردد [۸]. به دلیل سر قطبی فسفولپید که مرتبط با غشای سلولی است در زمان شستشو تا حدی می تواند حذف شود. غشای فسفولپیدی از طریق جذب الکترواستاتیک بین فسفولپیدهای اسیدی غشاء و اسیدهای آمینه بازی پروتئین های سیتواسکلتی به آن متصل می باشد. زمانیکه مینس ماهی برای جداسازی غشاء در معرض محلول اسید سیتریک و کلرید کلسیم قرار می گیرد برهم کنش بین کلسیم با سر قطبی فسفولپید و همچنین رقابت بین اسید سیتریک با فسفولپیدهای اسیدی غشاء متصل به اسیدهای آمینه بازی پروتئین های سیتواسکلتی اتفاق می افتد. در نتیجه جداشدگی غشاء فسفولپیدی از پروتئین های سیتواسکلتی رخ می دهد [۷]. این روش توانست به نحو موثری سبب کم شدن فسفولپید از ضایعات ماهی قزل آلا رنگین کمان گردد که با مطالعه صورت گرفته در ضایعات ماهی هیک که البته فقط از ترکیب اسید سیتریک و کلرید کلسیم (بدون کاربرد آب مقطر) استفاده نمودند مطابقت دارد [۹]. همچنین این فرایند سبب کاهش آهن هم در پروتئین ضایعات گردد که به دلیل خاصیت قطبی محلول شستشو، آهن هم می تواند به شکل محلول درآید. از اینرو، کاربرد روشهای ۲ و ۵ برای استفاده از ضایعات قزل آلا رنگین کمان در استخراج پروتئین پیشنهاد می گردد. این پروتئین (روش ۵) دارای ویژگی های رنگی بهتری (روشنایی بالاتر و قرمزی کمتر) در مقایسه با پروتئین استخراج شده بطور مستقیم از ضایعات هموزن شده بود. البته شستشوی متوالی سبب کاهش معنی دار درصد استخراج پروتئین گردید بطوریکه

6. *Bacillus licheniformis*

و فسفولیپید از روش ۵ نیز کمتر بوده است. ولی با در نظر گرفتن راندمان بالاتر روش ۲، و بدون در نظر گرفتن فاکتور رنگی قرمزی در این روش که بالاتر از روش ۵ بود، روش ۲ می تواند روش مناسب و کم هزینه برای استخراج پروتئین از ضایعات ماهی قزل آلی رنگین کمان پیشنهاد شود.

۵- تقدیر و تشکر

این تحقیق با حمایت مالی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (طرح شماره ۹۴۰۱۳۳۷۴) صورت پذیرفت.

۶- منابع

- [1] FAO. (2016). The state of world fisheries and aquaculture 2016. Contributing to food security and nutrition for all. In (pp. 200). Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- [2] Pérez-Gálvez, R., Espejo-Carpio, F. J., Morales-Medina, R., García-Moreno, P. J., Guadix-Escobar, A., & Guadix-Escobar, E. (2018). Fish discards as source of health-promoting biopeptides. In *Alternative and Replacement Foods* (pp. 177-204).
- [3] Šližytė, R., Daukšas, E., Falch, E., Storrø, I., & Rustad, T. (2005). Characteristics of protein fractions generated from hydrolysed cod (*Gadus morhua*) by-products. *Process Biochemistry*, 40(6), 2021-2033.
- [4] Norris, R., Harnedy, P. A., & FitzGerald, R. J. (2013). Antihypertensive peptides from marine origin. In B. Hernández-Ledesma & M. Herrero (Eds.), *Bioactive Compounds from Marine Foods: Plant and Animal Sources* (pp. 27-56): Wiley-Blackwell.
- [5] Opheim, M., Šližytė, R., Sterten, H., Provan, F., Larssen, E., & Kjos, N. P. (2015). Hydrolysis of Atlantic salmon (*Salmo salar*) rest raw materials—Effect of raw material and processing on composition, nutritional value, and potential bioactive peptides in the hydrolysates. *Process Biochemistry*, 50(8), 1247-1257.
- [6] Harnedy, P. A., & FitzGerald, R. J. (2013). Bioactive proteins and peptides from macroalgae, fish, shellfish and marine processing waste. In S.-K. Kim (Ed.), *Marine proteins and peptides: Biological activities*

طبیعی مهار کننده آلفا-گلوکوسیداز نشان داد که عصاره چای اولونگ و چای سبز به ترتیب دارای IC_{50} برابر با ۱۱/۱ و ۱۱/۳ میلی گرم در میلی لیتر بودند [۲۲]. تاکنون هیچ مطالعه ای فعالیت ضد دیابت پروتئین هیدرولیز ضایعات قزل آلی رنگین کمان را بررسی ننموده است. با این وجود، قدرت بازدارندگی آن در برابر آنزیم آلفا-گلوکوسیداز پستانداران کمتر از آکاربوز بود. این امر تا حدی قابل پیش بینی می باشد زیرا آکاربوز داروی ضد دیابت سنتتیک و خالص می باشد در حالیکه پروتئین هیدرولیز ضایعات از مخلوطی از پپتید ها و پلی پپتید ها و ترکیبات غیر پروتئینی تشکیل یافته است.

یکی از مسیر های کلیدی فساد مواد غذایی، اکسیداسیون چربی می باشد که عاملی برای تشکیل ترکیبات فرار^۷ و بروز بوی نامطلوب در ماده غذایی می باشد. یون های عبوری مانند یون آهن از مهم ترین کاتالیست های اکسیده شده چربی بوده و می تواند به عنوان یک دهنده الکترونیه هیدروپراکسیدهای ناپایدار عمل نموده که حاصل تشکیل رادیکال های آلكوكسيل است [۲۳]. تشکیل ترکیبات فرار، حاصل از تجزیه هیدروپراکسیدها، بطور منفی بر طعم و بوی فرآورده تاثیر می گذارد. از اینرو، شلاته کردن آنها توسط یک ماده می تواند نقش مهمی بر تاثیر آنتی اکسیدانی آن در جلوگیری از اکسیداسیون مواد غذایی داشته باشد [۲۴]. فرکشن های پپتیدی پروتئین هیدرولیز ضایعات قزل آلا با مقدار بالای دی- و تری-پپتید و اسید های آمینه آزاد، یونهای فلزی را شلاته نموده که می تواند منجر به کاهش اکسیداسیون گردد. همچنین فرکشن های پپتیدی توانایی مهار رادیکال های آزاد را از خود نشان دادند. مهار رادیکال های آزاد یکی از مکانیسم هایی است که آنتی اکسیدان از فرآیند های اکسیداسیون جلوگیری می نماید [۱۵]. لذا پروتئین هیدرولیز ضایعات قزل آلا با توانایی مهار رادیکال های آزاد میتواند سبب توقف اکسیداسیون چربی از طریق توقف واکنش زنجیره ای گردد.

در مجموع این مطالعه نشان داد که ترکیب شیمیایی پروتئین ضایعات قزل آلی رنگین کمان تحت تاثیر روشهای مختلف شستشو قرار می گیرد. روش ۵ از روشنایی بالاتر و زردی و قرمزی کمتری برخوردار بود با این وجود روش ۲ مقدار آهن هم

7. Volatiles

- 140). Cambridge: Woodhead Publishing Limited.
- [16] Kim, S., & Wijesekara, I. (2010). Development and biological activities of marine derived bioactive peptides: A review. *Journal of Functional Foods*, 2, 1–9.
- [17] Li-Chan, E.C.Y. (2015). Bioactive peptides and protein hydrolysates: research trends and challenges for application as nutraceuticals and functional food ingredients. *Current Opinion in Food Science*, 1, 28–37.
- [18] Nikoo, M., & Benjakul, S. (2015). Potential application of seafood-derived peptides as bifunctional ingredients, antioxidant-cryoprotectant: A review. *Journal of Functional Foods*, 19, 753–764.
- [19] Wang, B., Gong, Y. D., Li, Z. R., Yu, D., Chi, C. F., & Ma, J. Y. (2014). Isolation and characterisation of five novel antioxidant peptides from ethanol-soluble proteins hydrolysate of spotless smoothhound (*Mustelus griseus*) muscle. *Journal of Functional Foods*, 6, 176–185.
- [20] Samaranayaka, A.G.P., & Li-Chan, E.C.Y. (2011). Food-derived peptidic antioxidants: A review of their production, assessment, and potential applications. *Journal of Functional Foods*, 3, 229–254.
- [21] Matsui, T., Oki, T., & Osajima, Y. (1999). Isolation and identification of peptidic α -Glucosidase inhibitors derived from sardine muscle hydrolysate. *Z. Naturforsch*, 54, 259–263.
- [22] Oki, T., Matsui, T., & Osajima, Y. (1999). Inhibitory effect of α -glucosidase inhibitors varies according to its origin. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 47(2), 550–553.
- [23] Shahidi, F., & Zhong, Y. (2015). Measurement of antioxidant activity. *Journal of Functional Foods*, 18, 757–781.
- [24] Yarnpakdee, S., Benjakul, S., Nalinanon, S., & Kristinsson, H. G. (2012). Lipid oxidation and fishy odour development in protein hydrolysate from Nile tilapia (*Oreochromis niloticus*) muscle as affected by freshness and antioxidants. *Food Chemistry*, 132(4), 1781–1788.
- and applications (pp. 5–39). West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd.
- [7] Khantaphant, S., Benjakul, S., & Ghomi, M. R. (2011). The effects of pretreatments on antioxidative activities of protein hydrolysate from the muscle of brownstripe red snapper (*Lutjanus vitta*). *LWT-Food Science and Technology*, 44(4), 1139–1148.
- [8] Liang, Y., & Hultin, H. O. (2005). Separation of membranes from acid-solubilized fish muscle proteins with the aid of calcium ions and organic acids. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 53(8), 3008–3016.
- [9] Pires, C., Teixeira, B., Cardoso, C., Mendes, R., Nunes, M. L., & Batista, I. (2015). Cape hake protein hydrolysates prepared from alkaline solubilised proteins pre-treated with citric acid and calcium ions: Functional properties and ACE inhibitory activity. *Process Biochemistry*, 50(6), 1006–1015.
- [10] Cheng, E. H., & Ockerman, H. W. (2004). Effect of ascorbic acid with tumbling on lipid oxidation of precooked roast beef 1. *Journal of Muscle Foods*, 15(2), 83–93.
- [11] Clark, E. M., Mahoney, A. W., & Carpenter, C. E. (1997). Heme and total iron in ready-to-eat chicken. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 45, 124–126.
- [12] Yu, Z., Yin, Y., Zhao, W., Liu, J., & Chen, F. (2012). Anti-diabetic activity peptides from albumin against α -glucosidase and α -amylase. *Food Chemistry*, 135(3), 2078–2085.
- [13] Connolly, A., Piggott, C. O., & FitzGerald, R. J. (2014). In vitro α -glucosidase, angiotensin converting enzyme and dipeptidyl peptidase-IV inhibitory properties of brewers' spent grain protein hydrolysates. *Food Research International*, 56, 100–107.
- [14] Senphan, T., & Benjakul, S. (2014). Antioxidative activities of hydrolysates from seabass skin prepared using protease from hepatopancreas of Pacific white shrimp. *Journal of Functional Foods*, 6, 147–56.
- [15] Aluko, R. (2015). Amino acids, peptides, and proteins as antioxidants for food preservation. In F. Shahidi (Ed.), *Handbook of antioxidants for food preservation* (pp. 105–

Effect of washing with distilled water, citric acid and calcium ion on composition of protein isolates from rainbow trout by-product and antioxidant and anti-diabetic activities of hydrolysate

Nikoo, M. ^{1*}, Ahmadi Gavlighi, H. ², Yasemi, M. ³

1. Department of Pathobiology and Quality Control, Artemia and Aquaculture Research Institute, Urmia University, Urmia, West Azerbaijan, Iran.
2. Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3. Institute of Technical and Vocational Higher Education & Skills Training of Agriculture Jihad, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

(Received: 2018/07/24 Accepted: 2019/01/04)

In this study, the effect of different treatments including method 1- homogenized by-product (BP-FPI), method 2- washing of homogenized by-product by distilled water (WBP-FPI), method 3- washing of homogenized by-product by CaCl₂-citric acid (CaCi-BPFPI), method 4- CaCl₂-citric acid treated – washing by distilled water (CaCi-W- BPFPI), method 5- washing by distilled water- CaCl₂-citric acid treatment (W-CaCi-BPFPI) on composition of protein isolate from rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) by-product were investigated. Washing by distilled water (method 2) and distilled water + combination of CaCl₂ + citric acid (method 5) had significant effect on heme iron and phospholipid (P < 0.05). Washing methods influenced protein yield and the lowest yield (9.4%) was obtained using method 5 (P < 0.05). Washing-derived proteins were lighter in color compared with that obtained from by-product. Method 1 resulted in higher redness (9.36) while that obtained with method 5 showed the lowest redness (1.19) (P < 0.05). Protein hydrolysate produced from method 5 protein isolate had high antioxidant activity in a dose-dependent manner. Additionally, the presence of small peptides in hydrolysate contributed to its anti-diabetic activities. Results indicated that washing by distilled water (method 2) or combined with CaCl₂ + citric acid (method 5) is necessary for production of protein isolate from rainbow trout processing by-product.

Keywords: Rainbow trout, By-product, Washing methods, Composition, Antioxidant activity, Anti-diabetic activity

* Corresponding Author E-Mail Address: m.nikoo@urmia.ac.ir