



مقاله علمی-پژوهشی

مقایسه اثر ضدباکتریایی عصاره پروبیوتیکی حاصل از لاکتوباسیلوس کازئی با آنتی بیوتیک‌های رایج علیه چهار سویه پاتوژن باکتریایی بصورت برون تنی

افروز سعادت زاده^{۱*}، رضا هنرمند^۲، سحر قلی پور^۲

۱- دکترای تخصصی فارماسیوتیکس، استادیار، گروه کنترل دارو و غذا، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

۲- دکترای عمومی داروسازی، گروه کنترل دارو و غذا، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

اطلاعات مقاله	چکیده
تاریخ های مقاله : تاریخ دریافت: ۱۴۰۳/۱/۱۷ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۴/۱۳	هدف از این مطالعه، بررسی فعالیت عصاره پروبیوتیکی استخراج شده از لاکتوباسیلوس کازئی علیه رشد ۴ سویه استاندارد باکتریایی مقاوم به دارو و مقایسه اثر ضد میکروبی آن با چند آنتی بیوتیک رایج در شرایط برون تنی بود. لاکتوباسیلوس کازئی در محیط استاندارد MRS و شرایط کم هوازی، کشت داده شد. عصاره خشک پروبیوتیکی، پس از جداسازی توده سلول‌های زنده با روش سانتیفریژ استخراج شده و توسط روش لیوفیلیزاسیون، پایدار گردید. بررسی فعالیت ضد میکروبی با استفاده از روش انتشار-دیسک انجام شد. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS و با سطح معناداری $P < 0.05$ مورد آنالیز قرار گرفت. تفاوت معناداری بین تمام عوامل ضد میکروبی وجود داشت ($P < 0.05$). یافته‌ها نشان می‌داد که LPE قادر بود باکتری‌های پاتوژن مقاوم را کنترل نماید. بیشترین اثر مهارکنندگی LPE علیه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس با قطر هاله عدم رشد ۲۶ میلی‌متر و در مقابل، کمترین اثر علیه باکتری شرشیا کلی با قطر هاله عدم رشد ۱۳/۳ میلی‌متر ارزیابی شد. هرچند که LPE، در مقایسه با عوامل آنتی بیوتیک علیه ۳ سویه باکتریایی بیشترین اثر را دارا بود ولی در مورد سالمونلا تایفی، از جنتامایسین و استرپتومایسین ضعیف‌تر بود. با وجود اثرات قابل توجه ضدباکتریایی از LPE علیه چند سویه باکتری گرم منفی و گرم مثبت، مطالعات بیشتری قبل از تجویز بالینی آن و اثبات نقش مفید آن در درمان بیماری‌های عفونی ضروری است.
کلمات کلیدی: پروبیوتیک، آنتی بیوتیک، پاتوژن.	
DOI:10.22034/FSCT.21.157.100. * مسئول مکاتبات: afsaadat@gmail.com	

۱-مقدمه

آنجایی که شناسایی کل ترکیبات، مشکل و وقتگیر بوده و نیاز به جداسازی، خالص‌سازی و ارزیابی شمار زیادی از مواد دارد و نیز بخش عمده‌ای از این متابولیت‌ها را اسیدهای آلی شامل می‌شود، شناسایی این اسیدها با استفاده از روش‌های کروماتوگرافیک یا آنزیماتیک بعنوان شاخص مدنظر قرار می‌گیرد. حال با توجه به مطالعات متعددی که در خصوص اثبات اثرات آنتی پاتوژنیک پروبیوتیک‌ها انجام شده است، پیش بینی می‌شود که می‌توان از آن‌ها بعنوان جایگزین مناسب و موثری برای آنتی بیوتیک‌ها با هدف غلبه بر آثار سوء جانبی آنتی بیوتیک‌ها و مقاومت باکتریایی نسبت به آن‌ها استفاده نمود.

سلولهای زنده و خشک شده پروبیوتیک‌ها به دو فرم مصرف می‌شوند:

۱- به صورت مکمل‌های دارویی به شکل پودر، شربت یا قرص

۲- مواد غذایی غنی شده با پروبیوتیک‌ها [۶، ۷].

مطالعات بالینی مختلف انجام شده بر روی انسان نشان داده‌اند که مصرف باکتری‌های تولید کننده اسید لاکتیک به میزان 10^{11} - 10^9 عدد در روز، می‌تواند میزان بروز، طول مدت و نیز شدت تعدادی از بیماری‌های دستگاه گوارش را کاهش دهد. مشاهده شده است که پروبیوتیک‌ها یکنواختی روده را حفظ کرده و عوارض تعدادی از بیماری‌های گوارشی مانند اسهال وابسته به آنتی بیوتیک‌ها، بیماری‌های التهابی روده، اسهال کودکان، اسهال مسافرتی، عدم تحمل لاکتوز، عفونت ناشی از هلیکوباکتر پیلوری، سندرم روده تحریک پذیر و بیماری روده‌ای ناشی از کلسترییدیوم دیفسیل را تعدیل می‌کنند. علاوه بر آن، بررسی‌های آزمایشگاهی و بالینی مختلف نشان داده‌اند که پروبیوتیک‌ها در پیشگیری یا درمان عفونت‌های ادراری - تناسلی، چربی خون بالا، آلرژی و سرطان اثر بخشی امیدوارکننده‌ای داشته‌اند [۸-۱۰].

از جمله فواید بالقوه استفاده از پروبیوتیک‌ها در درمان بیماری‌های مختلف علاوه بر هزینه نسبتاً کم،

پروبیوتیک‌ها میکروارگانیسم‌های زنده و مشخصی هستند که در صورت مصرف در انسان یا حیوان، با تعدیل فلور میکروبی بدن باعث اعمال اثرات مفید بر سلامتی میزبان می‌شوند [۱]. این میکروارگانیسم‌ها، عموماً از منابع انسانی بوده و بعنوان باکتری‌های غیر بیماری‌زا محسوب می‌شوند و راه حل مناسبی برای بهبود و حفظ سلامتی مجاری گوارش، کاهش مصرف آنتی بیوتیک‌ها، پیشگیری از بروز بیماری‌ها، افزایش قدرت سیستم ایمنی و از بین بردن عوامل پاتوژن از طریق رقابت یا تولید ترکیبات ضد میکروبی و تولید مواد مغذی و فاکتورهای رشد می‌باشند [۲، ۳].

بر اساس مطالعات بسیاری ثابت شده است که اثرات پروبیوتیک‌ها به واسطه تولید ترکیبات بیولوژیکی فعالی است که متابولیت‌های آنها قلمداد می‌شوند. این متابولیت‌ها در سوپرناتانت کشت باکتری‌ها وجود دارند و با شستشوی محیط، جدا کردن سوپرناتانت و خشک کردن آن می‌توان به فرم‌های خشک این متابولیت‌ها دسترسی پیدا کرد. این متابولیت‌ها شامل طیف وسیعی از اسیدهای آلی، باکتریوسین‌ها و ترکیبات پلی آمینی می‌باشند. مطالعات نشان می‌دهد که این ترکیبات بر روی میکروفلورهای پاتوژن فرصت طلب گرم مثبت و منفی موجود در سیستم گوارشی انسان و حیوان، اثرات باکتریواستاتیک و باکتریوسیدال دارند. به دلیل ویژگی‌های درمانی پروبیوتیک‌ها و متابولیت‌های آن‌ها، افزودن این مواد به محصولات لبنی مثل شیر، پنیر و ماست، بسیار مورد توجه است. به همین دلیل، امروزه فرآورده‌های دارویی و غذایی بسیاری با هدف درمانی و تقویتی در دست تولید است که حاوی پروبیوتیک‌ها می‌باشند از جمله ترکیباتی که حاوی سلول‌های خشک شده پروبیوتیکی هستند. البته کاربرد متابولیت‌ها بعنوان جایگزین سلول‌های زنده هم ایده نوینی است که در دست بررسی می‌باشد [۲، ۴، ۵].

مساله مهمی که باید مورد توجه قرار داد، شناسایی متابولیت‌های تهیه شده جهت تعیین مقدار دقیق مصرف آن‌ها در فرمولاسیون‌های حاوی متابولیت‌های بیولوژیکی است. از

در دهه های اخیر، گونه های باکتریایی اسید لاکتیک روده‌ای که دارای ویژگی‌های سلامت بخش اثبات شده هستند، بعنوان پروبیوتیک‌ها معرفی شده‌اند که از آن جمله می‌توان به *لاکتوباسیلوس رامنوسوس*، *لاکتوباسیلوس کازئی* و *لاکتوباسیلوس جانسونی* اشاره کرد [۱۴، ۱۵].

آنتی‌بیوتیک‌ها موادی هستند که توسط گونه‌های مختلف میکروارگانیسمی تولید می‌شوند و قادرند مانع رشد میکروارگانیسم‌ها شوند. امروزه تمام یا بخشی از آنتی‌بیوتیک‌ها توسط راه‌های مختلف شیمیایی سنتز می‌شوند [۱۶].

خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و دارویی آنتی‌بیوتیک‌ها کاملاً متفاوت است که این تفاوت بیانگر طیف ضد میکروبی آن‌ها و مکانیسم عملشان می‌باشد. نکته قابل توجه این است که از هزاران آنتی‌بیوتیک تولید شده در طبیعت که خالص شده‌اند، فقط تعداد محدودی غیر سمی بوده و در نتیجه از آن‌ها به عنوان دارو استفاده می‌شود. آنتی‌بیوتیک‌ها برای اعمال فعالیت مهارکنندگی خود در سلول، اهداف گوناگونی دارند. این مواد در سنتز دیواره، عمل غشاء، سنتز پروتئین، متابولیسم اسیدهای نوکلئیک و واکنش‌های آنزیمی مداخل می‌کنند. برخی از این مواد ممکن است بیش از یک محل هدف یا مکانیسم عمل داشته باشند [۱۷]. هدف از این مطالعه بررسی خصوصیات ضد میکروبی عصاره سلولی باکتری پروبیوتیک *لاکتوباسیلوس کازئی* و مقایسه تاثیرات آن با آنتی‌بیوتیک‌های رایج علیه چهار سویه پاتوژن مقاوم می‌باشد.

۲- مواد و روش

سویه استاندارد *لاکتوباسیلوس کازئی* (PTCC 1608) از کلکسیون قارچ‌ها و باکتریهای صنعتی و بیماری‌زا از مرکز پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، به صورت لیوفیلیزه تهیه و در محیط (MRS (Merck Cat. No. 1.1.0660.0500

می‌توان به ایمنی و مکانیسم‌های متعددی که پروبیوتیک‌ها از طریق آن پاتوژن‌ها را مهار کرده و در نتیجه شانس توسعه مقامت در برابر پروبیوتیک‌ها را کاهش می‌دهند، اشاره نمود [۸، ۱۱].

از مهمترین پروبیوتیک‌هایی که در صنایع لبنی استفاده می‌شود، *لاکتوباسیلوس*‌ها را می‌توان نام برد. در سال ۱۹۰۶ دکتر ایلیا ایلیچ مچنیکف^۱ برنده جایزه نوبل، طول عمر مردم بالکان را در نتیجه مصرف مقادیر زیاد غذاهای تخمیری غنی شده با *لاکتوباسیلوس*‌ها و دیگر ارگانیسم‌های تولیدکننده‌ی اسید لاکتیک به خصوص ماست دانست و مشخص کرد که باکتری‌های موجود در ماست از فعالیت پاتوژن‌ها ممانعت کرده و خاصیت ضد سمی دارند [۶].

بعد از مرگ مچنیکف در سال ۱۹۱۶، مرکز فعالیت‌های تحقیقاتی در این مورد به ایالات متحده منتقل شد و اثبات شد که باکتری‌های با منشأ روده‌ای به احتمال زیاد اثر مطلوبی در روده می‌گذارند. در سال ۱۹۳۵ بعضی از سوش‌های *لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس* کشف شدند که در دستگاه گوارش انسان فعالیت زیادی داشتند. ادامه روند آزمایشات با استفاده از این میکروارگانیسم دنبال شد و نتایج قابل توجهی مخصوصاً در تسکین یبوست مزمن بدست آمد [۶، ۱۲].

اصطلاح پروبیوتیک‌ها اولین بار در سال ۱۹۵۳ بیان شد. بر خلاف آنتی‌بیوتیک‌ها، پروبیوتیک‌ها عواملی میکروبی تعریف می‌شوند که رشد میکروارگانیسم‌های دیگر را تحریک می‌کنند. در سال ۱۹۸۹ اری فولر تعریفی از پروبیوتیک‌ها بیان کرد که بطور گسترده‌ای مورد استفاده قرار گرفت: مکمل غذایی میکروبی زنده‌ای که با بهبود توازن میکروبی در روده، اثرات مطلوبی را در میزبان خود ایجاد می‌نماید. تعریف فولر بر لزوم قابلیت زیستی پروبیوتیک‌ها تاکید کرده و جنبه اثر سلامت بخش روی میزبان را بیان می‌کند [۶، ۱۳].

برای بررسی فعالیت ضد باکتریایی (ضد پاتوژن) باکتری لاکتوباسیلوس کازئی، از محیط مولر هیتون آگار استفاده شد. برای این منظور از روش چاهک^۳ برای تعیین میزان مهارکنندگی باکتری‌های اسید لاکتیکی استفاده شد و اثر آنانگونیستی این باکتری‌ها بر سویه‌های پاتوژن مورد بررسی قرار گرفت. به منظور کاهش خطا هر آزمون سه بار تکرار شد. در روش چاهک، از سوسپانسیون باکتری‌های بیماری-زای کشت داده شده در محیط نوترینت برات (۰/۵ مک فارلند) با سوآپ استریل روی محیط مولر هیتون آگار کشت داده شد. سپس با استفاده از سیلندر استریل چاهک‌هایی به قطر ۵ میلی‌متر روی محیط ایجاد کرده و از مایع رویی یا (سوپرناتانت) باکتری لاکتوباسیلوس کازئی و نیز مقادیر ۲۰۰، ۴۰۰ و ۶۰۰ میکروگرم LPE در هر چاهک تلقیح شد. در تست بررسی اثرات ممانعت‌کنندگی از رشد پاتوژن عصاره تام، از ۱۰۰ میکرولیتر عصاره تام یا سوپرناتانت باکتری استفاده شد. بعد از خشک شدن محیط، پلیت‌ها در انکوباتور ۳۷ درجه سانتیگراد به مدت ۲۴ ساعت گرمخانه گذاری شدند. سپس قطر هاله عدم رشد ایجاد شده توسط باکتری‌های اسید لاکتیکی علیه هر یک از باکتری‌های بیماری‌زا توسط خط کش میلی‌متری، اندازه گیری و ثبت گردید [۶، ۲۱].

آنالیز آماری

تجزیه و تحلیل آماری نتایج حاصل از این مطالعه توسط نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ انجام شد. برای آزمون اختلاف میانگین در چند گروه کیفی از آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد. برای افزایش میزان معنی‌داری از آزمون Post Hoc Tukey استفاد شد که نشان دهنده بیشترین اختلاف معناداری می‌باشد.

۳- نتایج و بحث

نتایج حاصل از بررسی اثرات ممانعت‌کنندگی عصاره تام و LPE باکتری لاکتوباسیلوس کازئی بر روی باکتری پاتوژن سودوموناس آئروژینوزا

Table 1- The diameter of non-growth halo resulting from the effect of total extract and LPE as well as common antibiotics on halo diameter on *Pseudomonas aeruginosa* in millimeters (n=3)

آگار کشت داده شد. کلونی باکتری رشد کرده روی آگار به محیط MRS مایع انتقال داده شده و به صورت شبانه کشت داده شد. سپس مقدار ۱ میلی لیتر از کشت شبانه در ۵۰ میلی‌لیتر محیط کشت تازه MRS مجدداً کشت داده شده و در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد با دور ۲۵۰×rpm گرمخانه-گذاری شدند. جذب نوری محیط کشت به صورت دوره‌ای در طول موج ۶۰۰ نانومتر اندازه گیری شد تا میزان جذب محیط کشت باکتری به یک برسد. بعد از خالص‌سازی کلنی‌ها، با تست‌های بیوشیمیایی، تخمیر قندها، مطالعات میکروسکوپی، رشد در دمای ۴۵، ۳۷، ۱۵ درجه سانتیگراد، باکتری لاکتوباسیلوس کازئی شناسایی و تأیید شد [۱۸].

تهیه عصاره تام و LPE از محیط کشت باکتری لاکتوباسیلوس کازئی

لاکتوباسیلوس کازئی خالص شده در محیط MRS both، در شرایط کم‌هوایی و در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد گرمخانه گذاری شد تا کدورتی معادل ۰/۵ مک فارلند بدست آید. برای تهیه سوپرناتانت کشت، باکتری‌ها به مدت ۲۵ دقیقه در دمای ۴ درجه سانتیگراد با دور ۳۵۰۰×rpm سانتریفیوژ شدند. سپس با استفاده از روش لیوفیلیزاسیون به صورت عصاره خشک و پایدار پروبیوتیکی یا LPE بدست آمد [۱۸، ۱۹].

آماده‌سازی باکتری‌های پاتوژن

سویه‌های باکتریایی زیر به صورت آمپول لیوفیلیزه استاندارد و خالص از مرکز پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران تهیه و پس از تهیه و کشت در محیط نوترینت برات با کدورت معادل ۰/۵ مک فارلند به عنوان پاتوژن مورد استفاده قرار گرفتند [۲۰]:

۱- استافیلوکوکوس اورئوس (PTCC 1431)

۲- سودوموناس آئروژینوزا (PTCC 27853)

۳- سالمونلا تیفی موریوم (PTCC 1639)

۴- اشرشیا کلی (PTCC 1399)

بررسی فعالیت ضد میکروبی

³ Well Diffusion Agar

1 Lyophilized Probiotic Extract

Bacteria	Antibacterial agent	Average	Standard deviation (±SD)
<i>P. aeruginosa</i>	Imipenem	18.66	3.51
	Gentamicin	17.66	0.57
	Meropenem	20	4.58
	Total extract	18.33	1.15
	LPE (200 µg)	25.00	1.00
	LPE (400 µg)	22.33	0.57
	LPE (600 µg)	20	1.52

نتایج حاصل از بررسی اثرات ممانعت‌کنندگی عصاره تام و LPE باکتری لاکتوباسیلوس کازئی بر روی باکتری پاتوژن اشریشیا کلی

Table 2- The diameter of non-growth halo resulting from the effect of total extract and LPE as well as common antibiotics on halo diameter on *Escherichia coli* in millimeters (n=3)

Bacteria	Antibacterial agent	Average	Standard deviation (±SD)
<i>E. coli</i>	Ciprofloxacin	0	0.00
	Imipenem	6	4
	Trimethoprim	9.33	3.05
	Total extract	12.66	2.08
	LPE (200 µg)	14.33	1.15
	LPE (400 µg)	16.66	0.57
	LPE (600 µg)	13.33	0.57

نتایج حاصل از بررسی اثرات ممانعت‌کنندگی عصاره تام و LPE باکتری لاکتوباسیلوس کازئی بر روی باکتری پاتوژن سالمونلا تیفی موریوم

Table 3- The diameter of non-growth halo resulting from the effect of total extract and LPE as well as common antibiotics on halo diameter on *Salmonella Typhimurium* in millimeters (n=3)

Bacteria	Antibacterial agent	Average	Standard deviation (±SD)
<i>S. Typhimurium</i>	Streptomycin	19	6
	Gentamicin	22	2
	Trimethoprim	5.66	5.5
	Total extract	12.66	2.08
	LPE (200 µg)	13.66	0.57
	LPE (400 µg)	16.33	1.15
	LPE (600 µg)	15.33	0.57

نتایج حاصل از بررسی اثرات ممانعت‌کنندگی عصاره تام و LPE باکتری لاکتوباسیلوس کازئی بر روی باکتری پاتوژن استافیلوکوکوس اورئوس

Table 4- The diameter of the non-growth halo resulting from the effect of total extract and LPE and also the common antibiotic methicillin on *Staphylococcus aureus* in millimeters (n=3)

Bacteria	Antibacterial agent	Average	Standard deviation (±SD)
<i>S. aureus</i>	Methicillin	0.66	1.15
	Total extract	13.33	2.88
	LPE (200 µg)	16.66	0.57
	LPE (400 µg)	17.66	1.52
	LPE (600 µg)	26	1.00

توان نتیجه گرفت که تفاوت معناداری بین قدرت ضد میکروبی وجود دارد. به منظور بررسی دقیق تر و مقایسه دو به دوی آنتی بیوتیک ها، در ادامه نتایج آزمون تعقیبی (post-hoc) و یا عبارتی آزمون LSD آورده شده است.

مقایسه اثرات ممانعت کنندگی عوامل آنتی باکتریال بر روی باکتری پاتوژن سودوموناس آئروژینوزا با توجه به اینکه معناداری به دست آمده کوچکتر از سطح معناداری استاندارد ($p < 0/05$) می باشد، لذا می

Table 5. The results of comparison of halo diameter for two by two antibiotics on *Pseudomonas aeruginosa*

Bacteria	Antibacterial agent 1	Antibacterial agent 2	Average differences	Standard error	Significant
<i>P. aeruginosa</i>	Imipenem	Gentamicin	2.00000	1.91899	0.315
		Meropenem	-1.33333	1.91899	0.499
		Total extract	.33333	1.91899	0.865
		LPE (200 µg)	-6.33333*	1.91899	0.005
		LPE (400 µg)	-3.66667	1.91899	0.077
		LPE (600 µg)	-1.66667	1.91899	0.400
	Gentamicin	Imipenem	-2.00000	1.91899	0.315
		Meropenem	-3.33333	1.91899	0.104
		Total extract	-1.66667	1.91899	0.400
		LPE (200 µg)	-8.33333*	1.91899	0.001
		LPE (400 µg)	-5.66667*	1.91899	0.010
		LPE (600 µg)	-3.66667	1.91899	0.077
	Meropenem	Imipenem	1.33333	1.91899	0.499
		Gentamicin	3.33333	1.91899	0.104
		Total extract	1.66667	1.91899	0.400
		LPE (200 µg)	-5.00000*	1.91899	0.021
		LPE (400 µg)	-2.33333	1.91899	0.244
		LPE (600 µg)	-.33333	1.91899	0.865
	Total Extract	Imipenem	-.33333	1.91899	0.865
		Gentamicin	1.66667	1.91899	0.400
Meropenem		-1.66667	1.91899	0.400	
LPE (200 µg)p.		-6.66667*	1.91899	0.004	
LPE (400 µg)		-4.00000	1.91899	0.056	
LPE (600 µg)		-2.00000	1.91899	0.315	
LPE (200 µg)	Imipenem	6.33333*	1.91899	0.005	
	Gentamicin	8.33333*	1.91899	0.001	
	Meropenem	5.00000*	1.91899	0.021	
	Total Extract	6.66667*	1.91899	0.004	
	LPE (400 µg)	2.66667	1.91899	0.186	
	LPE (600 µg)	4.66667*	1.91899	0.029	

LPE (400 µg)	Imipenem	3.66667	1.91899	0.077
	Gentamicin	5.66667*	1.91899	0.010
	Meropenem	2.33333	1.91899	0.244
	Total Extract	4.00000	1.91899	0.056
	LPE (200 µg)	-2.66667	1.91899	0.186
	LPE (600 µg)	2.00000	1.91899	0.315
LPE (600 µg)	Imipenem	1.66667	1.91899	0.400
	Gentamicin	3.66667	1.91899	0.077
	Meropenem	.33333	1.91899	0.865
	Total Extract	2.00000	1.91899	0.315
	LPE (200 µg)	-4.66667*	1.91899	0.029
	LPE (400 µg)	-2.00000	1.91899	0.315




Figure 1- Prato diagram (ranking) to compare the killing power of antibacterial agents, gentamicin, imipenem, meropenem, total extract and LPE in concentrations of 200, 400 and 600 µg of *L. casei* supernatant against *P. aeruginosa*

مقایسه اثرات ممانعت کنندگی عوامل آنتی

باکتریال بر روی باکتری پاتوژن استافیلوکوکوس اورئوس

با توجه به اینکه معناداری به دست آمده کوچکتر از سطح معناداری استاندارد ($p < 0.05$) می باشد، لذا می توان نتیجه گرفت که تفاوت معناداری بین قدرت ممانعت کنندگی عوامل آنتی باکتریال وجود دارد. به منظور بررسی دقیق تر و مقایسه دو به دو آنتی بیوتیک های مورد استفاده، در ادامه نتایج آزمون تعقیبی (post-hoc) و یا عبارتی آزمون LSD آورده شده است.

همانطور که در جدول ۵ و شکل ۱ دیده می شود، بیشترین قدرت ضد میکروبی مربوط به LPE400 می باشد. تفاوت LPE400 با دیگر گروه های ضد میکروبی معنادار می باشد ($P < 0.05$). به عبارتی می توان گفت که LPE400 مقایسه با سایر عوامل ضد میکروبی شامل آنتی بیوتیک های جنتامایسین، عصاره تام پروبیوتیک، ایمی پنم و مروپنم، LPE200 (غلظت ۲۰۰ میکروگرم) از پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی بیشترین قدرت ممانعت کنندگی را در برابر باکتری سودوموناس آئروژینوزا دارا بود.

Table 6. The results of comparison of halo diameter for two by two antibiotics on *S. aureus*

Bacteria	Antibacterial agent 1	Antibacterial agent 2	Average differences	Standard error	Significant
<i>S. aureus</i>	Total extract	LPE 200	-3.33333*	1.33333	0.031
		LPE 400	-4.33333*	1.33333	0.009
		LPE 600	-12.66667*	1.33333	0.000
		Methicillin	12.66667*	1.33333	0.000
	LPE 200	Total extract	3.33333*	1.33333	0.031
		LPE 400	-1.00000	1.33333	0.471
		LPE 600	-9.33333*	1.33333	0.000
		Methicillin	16.00000*	1.33333	0.000
	LPE 400	Total extract	4.33333*	1.33333	0.009
		LPE 200	1.00000	1.33333	0.471
		LPE 600	-8.33333*	1.33333	0.000
		Methicillin	17.00000*	1.33333	0.000
	LPE 600	Total extract	12.66667*	1.33333	0.000
		LPE 200	9.33333*	1.33333	0.000
		LPE 400	8.33333*	1.33333	0.000
		Methicillin	25.33333*	1.33333	0.000
Methicillin	Total extract	-12.66667*	1.33333	0.000	
	LPE 200	-16.00000*	1.33333	0.000	
	LPE 400	-17.00000*	1.33333	0.000	
	LPE 600	-25.33333*	1.33333	0.000	




Figure 2- Prato diagram (ranking) to compare the killing power of antibacterial agents, Methicillin, total extract and LPE in concentrations of 200, 400 and 600 μg of *L. casei* supernatant against *S. aureus*

ضدمیکروبی معنادار می باشد ($P < 0.05$). به عبارتی می توان گفت که در مقایسه با سایر عوامل ضدمیکروب شامل آنتی بیوتیک متی سیلین که باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در برابر آن مقاومت

همانطور که در جدول ۶ و شکل ۲ دیده می شود، بیشترین قدرت ضدمیکروبی مربوط به LPE600 می باشد. تفاوت LPE600 با دیگر گروه های

توان نتیجه گرفت که تفاوت معناداری بین قدرت ممانعت‌کنندگی عوامل ضد میکروبی وجود دارد. به منظور بررسی دقیق‌تر و مقایسه دو به دوی آنتی‌بیوتیک‌های مورد استفاده، در ادامه نتایج آزمون تعقیبی (post-hoc) و یا عبارتی آزمون LSD آورده شده است.

از خود نشان داده است، عوامل پروبیوتیک حاصل از باکتری لاکتوباسیلوس کازئی چه به صورت عصاره تام و چه به صورت LPE قدرت ممانعت‌کنندگی بالاتری دارد. همچنین هر چه غلظت ماده مؤثره در LPE بیشتر باشد، قدرت ضد میکروبی بالاتری را به دست می‌دهد.

مقایسه اثرات ممانعت‌کنندگی عوامل آنتی‌باکتریال بر روی باکتری پاتوژن سالمونلا تیفی

موریوم

با توجه به اینکه معناداری به دست آمده کوچکتر از سطح معناداری استاندارد ($p < 0.05$) می‌باشد، لذا می

Table 7. The results of comparison of halo diameter for two by two antibiotics on *S. Typhimurium*

Bacteria	Antibacterial agent 1	Antibacterial agent 2	Average differences	Standard error	Significant
<i>S. typhimurium</i>	Gentamicin	Total extract	9.33333*	2.70214	0.004
		LPE (200 µg)	8.33333*	2.70214	0.008
		LPE (400 µg)	5.66667	2.70214	0.055
		LPE (600 µg)	6.66667*	2.70214	0.027
		Streptomycin	3.00000	2.70214	0.286
		Trimethoprim	16.33333*	2.70214	0.000
	Total Extract	Gentamicin	-9.33333*	2.70214	0.004
		LPE 200	-1.00000	2.70214	0.717
		LPE 400	-3.66667	2.70214	0.196
		LPE 600	-2.66667	2.70214	0.340
		Streptomycin	-6.33333*	2.70214	0.034
		Trimethoprim	7.00000*	2.70214	0.021
	LPE 200	Gentamicin	-8.33333*	2.70214	0.008
		Total Extract	1.00000	2.70214	0.717
		LPE 400	-2.66667	2.70214	0.340
		LPE 600	-1.66667	2.70214	0.547
		Streptomycin	-5.33333	2.70214	0.068
		Trimethoprim	8.00000*	2.70214	0.010
	LPE 400	Gentamicin	-5.66667	2.70214	0.055
		Total Extract	3.66667	2.70214	0.196
		LPE 200	2.66667	2.70214	0.340
		LPE 600	1.00000	2.70214	0.717
		Streptomycin	-2.66667	2.70214	0.340
		Trimethoprim	10.66667*	2.70214	0.001
	LPE 600	Gentamicin	-6.66667*	2.70214	0.027
		Total Extract	2.66667	2.70214	0.340
		LPE 200	1.66667	2.70214	0.547
		LPE 400	-1.00000	2.70214	0.717
Streptomycin		-3.66667	2.70214	0.196	
Trimethoprim		9.66667*	2.70214	0.003	
Streptomycin	Gentamicin	-3.00000	2.70214	0.286	
	Total Extract	6.33333*	2.70214	0.034	
	LPE 200	5.33333	2.70214	0.068	
	LPE 400	2.66667	2.70214	0.340	
	LPE 600	3.66667	2.70214	0.196	
	Trimethoprim	13.33333*	2.70214	0.000	
Trimethoprim	Gentamicin	-16.33333*	2.70214	0.000	
	Total Extract	-7.00000*	2.70214	0.021	
	LPE 200	-8.00000*	2.70214	0.010	
	LPE 400	-10.66667*	2.70214	0.001	
	LPE 600	-9.66667*	2.70214	0.003	
	Streptomycin	-13.33333*	2.70214	0.000	




Figure 3-Prato diagram (ranking) to compare the killing power of antibacterial agents, Gentamicin, Streptomycin, Trimethoprim, total extract and LPE in concentrations of 200, 400 and 600 μg of *L. casei* supernatant against *S. Typhimurium*

مقایسه اثرات ممانعت‌کنندگی عوامل ضد میکروبی

روی باکتری پاتوژن/اشرشیا کلی

با توجه به اینکه معناداری به دست آمده کوچکتر از سطح معناداری استاندارد ($p < 0.05$) می‌باشد، لذا می‌توان نتیجه گرفت که تفاوت معناداری بین قدرت ممانعت‌کنندگی عوامل ضد میکروبی وجود دارد. به منظور بررسی دقیق‌تر و مقایسه دو به دو آنتی‌بیوتیک‌های مورد استفاده، در ادامه نتایج آزمون تعقیبی (post-hoc) و یا بعبارتی آزمون LSD آورده شده است.

همانطور که در جدول ۷ و شکل ۳ دیده می‌شود، بیشترین قدرت ضد میکروبی مربوط به آنتی‌بیوتیک جنتامایسین و استرپتومایسین می‌باشد ($P < 0.05$). آنتی‌بیوتیک تری‌متوپریم، در مقایسه با عصاره تام و LPE باکتری لاکتوباسیلوس کازئی، از قدرت ممانعت‌کنندگی کمتری برخوردار بود. می‌توان گفت که آنتی‌بیوتیک جنتامایسین از قدرت ممانعت‌کنندگی بهتر و عملکرد مناسب‌تری در برابر باکتری سالمونلا تیفی موریوم برخوردار است.

Table 8. The results of comparison of halo diameter for two by two antibiotics on *E. coli*

Bacteria	Antibacterial agent 1	Antibacterial agent 2	Average differences	Standard error	Significant
<i>E. coli</i>	Imipenem	Total extract	-6.66667*	1.73663	0.002
		LPE (200 μg)	-8.33333*	1.73663	0.000
		LPE (400 μg)	-10.66667*	1.73663	0.000
		LPE (600 μg)	-7.33333*	1.73663	0.001
		Trimethoprim	-3.33333	1.73663	0.076
		Ciprofloxacin	6.00000*	1.73663	0.004
	Total extract	Imipenem	6.66667*	1.73663	0.002
		LPE (200 μg)	-1.66667	1.73663	0.353
		LPE (400 μg)	-4.00000*	1.73663	0.037
		LPE (600 μg)	-.66667	1.73663	0.707

	Trimethoprim	3.33333	1.73663	0.076
	Ciprofloxacin	12.66667*	1.73663	0.000
LPE 200	Imipenem	8.33333*	1.73663	0.000
	Total extract	1.66667	1.73663	0.353
	LPE (400 µg)	-2.33333	1.73663	0.200
	LPE (600 µg)	1.00000	1.73663	0.574
	Trimethoprim	5.00000*	1.73663	0.012
	Ciprofloxacin	14.33333*	1.73663	0.000
	LPE 400	Imipenem	10.66667*	1.73663
Total extract		4.00000*	1.73663	0.037
LPE (200 µg)		2.33333	1.73663	0.200
LPE (600 µg)		3.33333	1.73663	0.076
Trimethoprim		7.33333*	1.73663	0.001
Ciprofloxacin		16.66667*	1.73663	0.000
LPE 600		Imipenem	7.33333*	1.73663
	Total extract	.66667	1.73663	0.707
	LPE (200 µg)	-1.00000	1.73663	0.574
	LPE (400 µg)	-3.33333	1.73663	0.076
	Trimethoprim	4.00000*	1.73663	0.037
	Ciprofloxacin	13.33333*	1.73663	0.000
	Trimethoprim	Imipenem	3.33333	1.73663
Total extract		-3.33333	1.73663	0.076
LPE (200 µg)		-5.00000*	1.73663	0.012
LPE (400 µg)		-7.33333*	1.73663	0.001
LPE (600 µg)		-4.00000*	1.73663	0.037
Ciprofloxacin		9.33333*	1.73663	0.000
Ciprofloxacin	Imipenem	-6.00000*	1.73663	0.004
	Total extract	-12.66667*	1.73663	0.000
	LPE (200 µg)	-14.33333*	1.73663	0.000
	LPE (400 µg)	-16.66667*	1.73663	0.000
	LPE (600 µg)	-13.33333*	1.73663	0.000
	Trimethoprim	-9.33333*	1.73663	0.000





Figure 4-Prato diagram (ranking) to compare the killing power of antibacterial agents, Trimethoprim, Imipenem, Ciprofloxacin, total extract and LPE in concentrations of 200, 400 and 600 µg of *L. casei* supernatant against *E. coli*

مقایسه اثرات ممانعت کنندگی عصاره تام پروبیوتیک روی باکتری های مختلف با توجه به اینکه معناداری به دست آمده کوچکتر از سطح معناداری استاندارد ($p < 0.05$) می باشد، لذا می توان نتیجه گرفت که تفاوت معناداری بین قدرت ممانعت کنندگی عصاره تام لاکتوباسیلوس کازئی در برابر عوامل پاتوژن وجود دارد. به منظور بررسی دقیق تر و مقایسه دو به دوی باکتری های مورد استفاده، در ادامه نتایج آزمون تعقیبی (post-hoc) و یا عبارتی آزمون LSD آورده شده است.

همانطور که در جدول ۸ و شکل ۴ دیده می شود، بیشترین قدرت ضد میکروبی مربوط به آنتی بیوتیک جنتامایسین و استرپتومایسین می باشد ($P < 0.05$). آنتی بیوتیک تری متوپریم، در مقایسه با عصاره تام و LPE باکتری لاکتوباسیلوس کازئی، از قدرت ممانعت کنندگی کمتری برخوردار بود. می توان گفت که آنتی بیوتیک جنتامایسین از قدرت ممانعت کنندگی بهتر و عملکرد مناسبتری در برابر باکتری اشرشیا کلی برخوردار است.

Table 9-Results of the comparison of the halo diameter of the total extract antibiotic for two pairs of bacteria

Antibacterial	Bacteria 1	Bacteria 2	Average differences	Standard error	Significant
Total extract	<i>P. aeruginosa</i>	<i>S. aureus</i>	5.00000*	1.74801	0.021
		<i>S. Typhimurium</i>	5.66667*	1.74801	0.012
		<i>E. coli</i>	5.66667*	1.74801	0.012
	<i>S. aureus</i>	<i>P. aeruginosa</i>	-5.00000*	1.74801	0.021
		<i>S. Typhimurium</i>	.66667	1.74801	0.713
		<i>E. coli</i>	.66667	1.74801	0.713
	<i>S. Typhimurium</i>	<i>P. aeruginosa</i>	-5.66667*	1.74801	0.012
		<i>S. aureus</i>	-.66667	1.74801	0.713
		<i>E. coli</i>	.00000	1.74801	1.000
	<i>E. coli</i>	<i>P. aeruginosa</i>	-5.66667*	1.74801	0.012
		<i>S. aureus</i>	-.66667	1.74801	0.713
			<i>S. Typhimurium</i>	.00000	1.74801

Figure 5- Prato chart (ranking) to compare the inhibitory power of *I. casei* total extract on pathogenic

می توان نتیجه گرفت که تفاوت معناداری بین قدرت ممانعت کنندگی LPE200 در برابر عوامل پاتوژن مختلف وجود دارد. به منظور بررسی دقیق تر و مقایسه دو به دو باکتری های مورد استفاده، در ادامه نتایج آزمون تعقیبی (post-hoc) و یا عبارتی آزمون LSD آورده شده است.

همانطور که در جدول ۹ و شکل ۵ دیده می شود، حساسیت باکتری سودوموناس آئروژینوزا نسبت به دیگر عوامل پاتوژن نسبت به عصاره تام پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی بیشتر می باشد ($P < 0.05$).

مقایسه اثرات ممانعت کنندگی LPE (۲۰۰)

میکروگرم) روی باکتری های مختلف

با توجه به اینکه معناداری به دست آمده کوچکتر از سطح معناداری استاندارد ($p < 0.05$) می باشد، لذا

Table 10-Results of comparing the halo diameter of LPE 200 antibiotic for bacteria two by two

Antibacterial	Bacteria 1	Bacteria 2	Average differences	Standard error	Significant
LPE 200	<i>P. aeruginosa</i>	<i>S. aureus</i>	8.33333*	0.70711	0.000
		<i>S. Typhimurium</i>	11.33333*	0.70711	0.000
		<i>E. coli</i>	10.66667*	0.70711	0.000
	<i>S. aureus</i>	<i>P. aeruginosa</i>	-8.33333*	0.70711	0.000
		<i>S. Typhimurium</i>	3.00000*	0.70711	0.003
		<i>E. coli</i>	2.33333*	0.70711	0.011
	<i>S. Typhimurium</i>	<i>P. aeruginosa</i>	-11.33333*	0.70711	0.000
		<i>S. aureus</i>	-3.00000*	0.70711	0.003
		<i>E. coli</i>	-.66667	0.70711	0.373
	<i>E. coli</i>	<i>P. aeruginosa</i>	-10.66667*	0.70711	0.000

<i>S. aureus</i>	-2.33333*	0.70711	0.011
<i>S. Typhimurium</i>	0.66667	0.70711	0.373




Figure 6 - Prato chart (ranking) to compare the inhibitory power of LPE 200 of *L. casei* on pathogenic agents

توان نتیجه گرفت که تفاوت معناداری بین قدرت ممانعت کنندگی LPE400 در برابر عوامل پاتوژن وجود دارد. به منظور بررسی دقیق تر و مقایسه دو به دوی باکتری های مورد استفاده، در ادامه نتایج آزمون تعقیبی (post-hoc) و یا عبارتی آزمون LSD آورده شده است.

همانطور که در جدول ۱۰ و شکل ۶ دیده می شود، حساسیت باکتری سودوموناس آئروژینوزا نسبت به دیگر عوامل پاتوژن در برابر LPE200 لاکتوباسیلوس کازئی بیشتر می باشد ($P < 0.05$).

مقایسه اثرات ممانعت کنندگی LPE (۴۰۰) میکروگرم) بر روی باکتری های مختلف با توجه به اینکه معناداری به دست آمده کوچکتر از سطح معناداری استاندارد ($p < 0.05$) می باشد، لذا می

Table 11-Results of comparing the halo diameter of LPE 400 antibiotic for bacteria two by two

Antibacterial	Bacteria 1	Bacteria 2	Average differences	Standard error	Significant
LPE 400	<i>P. aeruginosa</i>	<i>S. aureus</i>	4.66667*	0.84984	0.001
		<i>S. Typhimurium</i>	6.00000*	0.84984	0.000
		<i>E. coli</i>	5.66667*	0.84984	0.000
		<i>P. aeruginosa</i>	-4.66667*	0.84984	0.001
	<i>S. aureus</i>	<i>S. Typhimurium</i>	1.33333	0.84984	0.155
		<i>E. coli</i>	1.00000	0.84984	0.273
		<i>P. aeruginosa</i>	-6.00000*	0.84984	0.000
	<i>S. Typhimurium</i>	<i>S. aureus</i>	-1.33333	0.84984	0.155

	<i>E. coli</i>	-0.33333	0.84984	0.705
	<i>P. aeruginosa</i>	-5.66667*	0.84984	0.000
<i>E. coli</i>	<i>S. aureus</i>	-1.00000	0.84984	0.273
	<i>S.</i>	.33333	.84984	0.705
	<i>Typhimurium</i>			




Figure 7- Prato chart (ranking) to compare the inhibitory power of LPE 200 *L. casei* on pathogenic agents

توان نتیجه گرفت که تفاوت معناداری بین قدرت ممانعت کنندگی LPE600 در برابر عوامل پاتوژن وجود دارد. به منظور بررسی دقیق‌تر و مقایسه دو به دوی باکتری‌های مورد استفاده، در ادامه نتایج آزمون تعقیبی (post-hoc) و یا عبارتی آزمون LSD آورده شده است.

همانطور که در جدول ۱۱ و شکل ۷ دیده می‌شود، حساسیت باکتری سودوموناس آئروژینوزا نسبت به دیگر عوامل پاتوژن در برابر LPE400 لاکتوباسیلوس کازئی بیشتر می‌باشد ($P < 0.05$).

مقایسه اثرات ممانعت کنندگی LPE (۶۰۰)

میکروگرم) بر روی باکتری‌های مختلف

با توجه به اینکه معناداری به دست آمده کوچکتر از سطح معناداری استاندارد ($p < 0.05$) می‌باشد، لذا می

Table 12-Results of the comparison of the diameter of the non-growth halo obtained from LPE 600 for two pairs of pathogens

Antibacterial	Bacteria 1	Bacteria 2	Average differences	Standard error	Significant
LPE 600	<i>P. aeruginosa</i>	<i>S. aureus</i>	-5.66667*	0.81650	0.000
		<i>S. Typhimurium</i>	5.00000*	0.81650	0.000
		<i>E. coli</i>	7.00000*	0.81650	0.000
	<i>S. aureus</i>	<i>P. aeruginosa</i>	5.66667*	0.81650	0.000
		<i>S. Typhimurium</i>	10.66667*	0.81650	0.000
		<i>E. coli</i>	12.66667*	0.81650	0.000
	<i>S. Typhimurium</i>	<i>P. aeruginosa</i>	-5.00000*	0.81650	0.000
		<i>S. aureus</i>	-10.66667*	0.81650	0.000
		<i>E. coli</i>	2.00000*	0.81650	0.040

	<i>P. aeruginosa</i>	-7.00000*	0.81650	0.000
<i>E. coli</i>	<i>S. aureus</i>	-12.66667*	0.81650	0.000
	<i>S. Typhimurium</i>	-2.00000*	0.81650	0.040




Figure 8 - Bar chart (ranking) to compare the inhibitory power of LPE 400 *L. casei* on pathogenic agents

نسبت به آنتی بیوتیک‌ها قدرت ممانعت کنندگی قوی‌تری داشت.

عصاره LPE 400 همچنین در غلظت‌های ۲۰۰، ۴۰۰ و ۶۰۰ میکروگرم، اثر ممانعت کنندگی قوی‌تری نسبت به آنتی بیوتیک تری متوپریم در مهار باکتری *سالمونلا تایفی موریوم* داشت. ولی از آنتی بیوتیک‌های جنتامایسین و استرپتومایسین ضعیفتر بودند. بیشترین قطر هاله عدم رشد در پروبیوتیک‌ها مربوط به LPE400 با میانگین قطر هاله ۱۶ میلی‌متر بود که در مقایسه با قطر هاله جنتامایسین که ۲۲ میلی‌متر بود ضعیفتر بود.

عصاره LPE در غلظت‌های ۲۰۰، ۴۰۰ و ۶۰۰ میکروگرم، اثر ممانعت کنندگی قوی‌تری نسبت به آنتی بیوتیک‌های تری متوپریم، ایمپی پنم و سیپروفلوکسازین که بیشترین کاربرد را در درمان عفونت‌های اشریشیاکلی دارند را داراست. حتی

همانطور که در جدول ۱۲ و شکل ۸ دیده می‌شود، حساسیت باکتری *استافیلوکوکوس اورئوس* نسبت به دیگر عوامل پاتوژن در برابر LPE600 لاکتوباسیلوس کازئی بیشتر می‌باشد ($P < 0.05$).

عصاره‌های خشک پروبیوتیک یا LPE در غلظت‌های ۲۰۰، ۴۰۰ و ۶۰۰ میکروگرم، اثر ممانعت کنندگی قوی‌تری نسبت به آنتی بیوتیک‌های رایج در درمان عفونت‌های ناشی از *سودوموناس آئروژینوزا* دارد. به طوری که بیشترین قطر هاله عدم رشد مربوط به LPE200 با میانگین قطر ۲۵ میلی‌متر بود.

از طرفی عصاره LPE در غلظت‌های ۲۰۰، ۴۰۰ و ۶۰۰ میکروگرم، اثر ممانعت کنندگی قوی‌تری نسبت به آنتی بیوتیک‌های رایج در درمان عفونت‌های ناشی از *استافیلوکوکوس اورئوس* دارد. بطوریکه بیشترین قطر هاله عدم رشد مربوط به LPE600 با میانگین قطر ۲۶ میلی‌متر بود. عصاره تام لاکتوباسیلوس کازئی

شدند. خاصیت ضد میکروبی مایع رویی کشت آنها علیه عوامل بیماری‌زای باکتریایی به کمک روش دیسک و چاهک مورد بررسی قرار گرفت. به منظور کاهش خطا هر آزمون سه بار تکرار شد و قطر هاله عدم رشد اندازه‌گیری و توانایی ضد میکروبی آنها با هم مقایسه شد. از نمونه‌های ماست و قرص پروبیوتیکی شش گونه باکتری اسید لاکتیک شناسایی شد. این باکتری‌ها توان ضد میکروبی خوبی در مقابل هفت باکتری بیماری‌زا از خود نشان دادند. بیشترین اثر مهار کنندگی را لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بر علیه باسیلوس سرئوس طی روش چاهک با میانگین قطر هاله عدم رشد ۱۴ میلی‌متر از خود نشان داد. همچنین در مقایسه دو روش دیسک و چاهک، روش چاهک روشی به مراتب حساس‌تر از روش دیسک بود. طی این مطالعه، متابولیت‌های تولیدی توسط باکتری‌های اسید لاکتیک، توانستند از رشد باکتری-های بیماری‌زا جلوگیری کنند [۲۲].

سعادت‌زاده و همکاران در سال ۲۰۱۳، تحقیقاتی روی عصاره پروبیوتیکی بدست آمده از لاکتوباسیلوس کازئی انجام دادند، که اثرات ضد میکروبی و آنتی‌اکسیدانی عصاره پروبیوتیکی، مورد مطالعه قرار گرفت. این گروه تحقیقاتی جهت افزایش پایداری و ماندگاری از عصاره پروبیوتیکی بدست آمده پروسه‌ی لیوفیلیزاسیون استفاده نمودند و ثابت کردند که قدرت آنتی‌اکسیدانی و ضد میکروبی این عصاره که به اختصار LPE خوانده شده است، حدود ۱۰ برابر افزایش می‌یابد. در طول این مطالعه محتوی اسیدلاکتیک عصاره پروبیوتیکی بعنوان شاخص بیولوژیک مورد ارزیابی قرار گرفت [۲۳].

فرح بخش و همکاران در سال ۱۳۹۲، در تحقیق خود به جداسازی لاکتوباسیل‌های پروبیوتیک از ماست‌های سنتی مناطق روستایی رفسنجان و بررسی اثرات ضد میکروبی آنها پرداخت. در این تحقیق ۴ نمونه ماست محلی از چهار منطقه روستایی تهیه و با استفاده از

عصاره تام نیز قدرت ممانعت کنندگی بیشتری نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های رایج در درمان عفونت‌های ناشی از *اشریشیا کلی* دارد.

نتایج همچنین ثابت می‌کند که بیشترین قدرت ممانعت کنندگی برای باکتری *سودوموناس آئروژینوزا* مربوط به LPE در غلظت ۲۰۰ میکروگرم بود و بیشترین قدرت ممانعت کنندگی برای باکتری *استافیلوکوکوس اورئوس* مربوط به LPE در غلظت ۶۰۰ میکروگرم بود.

بیشترین قدرت ممانعت کنندگی برای باکتری *سالمونلا تیفی* موربوم مربوط به آنتی‌بیوتیک‌های جنتامایسین و استرپتومایسین بود. البته قدرت ممانعت کنندگی LPE و عصاره تام لاکتوباسیلوس کازئی از تری‌متوپریم قوی‌تر بود.

بیشترین قدرت ممانعت کنندگی برای باکتری *اشریشیا کلی* مربوط به LPE در غلظت ۴۰۰ میکروگرم بود.

عصاره تام پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی بیشترین قدرت ممانعت کنندگی را بر روی باکتری *سودوموناس آئروژینوزا* داشت.

LPE در غلظت‌های ۲۰۰ و ۴۰۰ بیشترین قدرت ممانعت کنندگی را بر روی باکتری *سودوموناس آئروژینوزا* داشتند.

LPE در غلظت ۶۰۰ میکروگرم بیشتر قدرت ممانعت کنندگی را بر روی باکتری *استافیلوکوکوس اورئوس* و سپس *سودوموناس آئروژینوزا* داشت.

مطابق یافته‌های این مطالب می‌توان به مطالعات بسیاری اشاره نمود که طی سال‌های اخیر توسط تیم-

های تحقیقاتی انجام شده از جمله کاظمی درستی و همکاران در سال ۱۳۸۹ در تحقیق خود به بررسی

فعالیت ضد میکروبی باکتری‌های اسید لاکتیک جدا شده از محصولات پروبیوتیکی (لاکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریوم) پرداختند. در این مطالعه از نمونه ماست و قرص پروبیوتیکی، باکتری‌های اسید لاکتیک جداسازی و به کمک روش‌های بیوشیمیایی شناسایی

منظور کاهش خطا، هر آزمون حداقل سه بار تکرار گردید و میانگین قطر هاله عدم رشد روی محیط مولر هیتتون آگار اندازه‌گیری و ثبت شد و خاصیت آنتاگونیستی باکتری‌های لاکتیک با هم مقایسه گردید. بیشترین اثر بازدارندگی مربوط به گونه‌های *لاکتوباسیلوس کازئی* و *لاکتوکوکوس لاکتیس* در روش چاهک بود و حداکثر میانگین قطر هاله عدم رشد آن‌ها ۱۸ میلی‌متر ارزیابی شد. بیشترین و کمترین اثر مهارتی بر علیه باکتری‌های پاتوژن به ترتیب روی *یرسینیا اتوکولیتیکا* و *باسیلوس سرئوس* مشاهده شد. به طور کلی نتیجه این بررسی نشان داد که هر دو جنس *لاکتوباسیلوس* و *لاکتوکوک* اثر مهارتی مناسبی روی باکتری‌های بیماری‌زای روده دارند. ولی *لاکتوباسیل*‌های موجود در ماست‌های محلی استان گلستان نسبت به *لاکتوکوک*‌ها توانایی بیشتری در مقابله با پاتوژن‌ها از خود نشان دادند و این اثر مهارتی روی *یرسینیا اتوکولیتیکا* مشهودتر بود [۲۵].

چاووشی فروشانی و همکاران در سال ۱۳۹۰، در تحقیق خود به بررسی اثرات ضد میکروبی جسم سلولی و مایع روی *لاکتوباسیلوس کازئی* جدا شده از ماست بر ضد *اشریشیا کلی O157:H7* پرداخت. باکتری *اشریشیا کلی* در کشورهای در حال توسعه یکی از عوامل مهم اسهال می‌باشد. لذا توجه به درمان آن ضروری است. به علت بروز مقاومت‌های دارویی از بین رفتن فلور طبیعی روده و القای تولید وروتوکسین توسط این باکتری در اثر مصرف برخی از آنتی‌بیوتیک‌ها، نیاز به روش‌های نوین درمانی است. در تحقیق آنها *لاکتوباسیلوس کازئی* از ماست جداسازی شده و اثر جسم سلولی و مایع رویی حاصل از کشت آن بر روی باکتری پاتوژن فوق بررسی شد. مایع رویی حاصل از کشت سویه‌های مورد مطالعه، در حرارت ۵۶ تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد به مدت ۳۰ و ۶۰ دقیقه پایدار بودند و نیز در مقابل

محیط کشت اختصاصی (MRS)، روش‌های غربالگری انتخابی، تست کاتالاز و تست‌های بیوشیمیایی مربوطه *لاکتوباسیلوس*‌های پروبیوتیک جداسازی شدند. پس از جداسازی، با استفاده از روش دیسک دیفیوژن و چاهک، اثرات ضد باکتریایی این پروبیوتیک‌ها بر علیه باکتری‌های بیماری‌زای شایعی همچون *استافیلوکوکوس اورئوس*، *اشریشیا کلی*، *استرپتوکوک پیوژنز* و *پروتئوس و لگاریس* بررسی شد. از ۴۰ نمونه ماست محلی، در مرحله اول ۳۳ سویه باکتری مقاوم به اسید جداسازی شد و در مراحل بعدی نهایتاً ۹ سویه با مقاومت زیاد به اسید و املاح صفراوی جداسازی شدند. این باکتری‌ها شامل: *لاکتوباسیلوس‌های کازئی* (در دو محل)، *رامنسسوس*، *پلانتاروم*، *اسیدوفیلوس*، *بولگاریس*، *دلبروکی*، *فرمنتوم*، و *برویس* همه سویه‌های پروبیوتیکی قادر به از بین بردن باکتری‌های بیماری‌زا شدند و بیشترین اثر ضد باکتریایی از *لاکتوباسیلوس پلانتاروم* مشاهده شد. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که امکان وجود باکتری‌های پروبیوتیک با فعالیت ضد باکتریایی بر علیه بعضی از باکتری‌های بیماری‌زا در ماست‌هایی که به صورت سنتی تهیه می‌شوند وجود دارند و می‌توان از آن‌ها در تولید فرآورده‌های لبنی صنعتی استفاده کرد [۲۴].

کیانی و همکاران در سال ۱۳۸۵، در تحقیق خود به بررسی اثر آنتاگونیستی باکتری‌های لاکتیک جدا شده از ماست بر علیه باکتری‌های بیماری‌زا پرداختند. در این تحقیق از ۹۶ سویه باکتری لاکتیک جدا شده از ۳۴ نمونه ماست محلی بر علیه ۷ گونه مهم پاتوژن-های گوارشی به خصوص *شیگلا دیسانتری*، *یرسینیا اتروکولیکیتیکا*، *اشریشیا کلی* و *سالمونلا تیفی موربیوم* با دو روش انتشار در آگار به کمک دیسک و روش چاهک با استفاده از محلول روئی تهیه شده از محیط کشت باکتری‌ها بررسی گردید. قطر هاله عدم رشد در اطراف دیسک و چاهک اندازه‌گیری شد و به

۴- نتیجه گیری کلی

با توجه به نتایج تحقیق، می‌توان چنین نتیجه گرفت که عصاره خشک پروبیوتیکی حاصل از باکتری لاکتوباسیلوس کازئی دارای قدرت ممانعت‌کنندگی بسیار مناسب بر ضد بسیاری از عوامل پاتوژن مهم در عفونت‌ها می‌باشند. به نظر می‌رسد که این عامل پروبیوتیک، قادر باشد عفونت‌های ناشی از پاتوژن‌های شایعی همچون *سودوموناس آئروژینوزا*، *استافیلوکوکوس اورئوس*، *سالمونلا تایفی* و *اشرشیا کلی* را مهار نموده و در مهار مقاومت‌های میکروبی رخ داده نسبت به آنتی‌بیوتیک‌ها، نقش موثری داشته باشد. هرچند، جهت کسب نتایج قطعی، تحقیقات بیشتری مورد نیاز است.

۵- تقدیر و تشکر

از همکاری صمیمانه آزمایشگاه کنترل دارو و غذای دانشکده داروسازی اهواز که در انجام این تحقیق نهایت همکاری را داشتند، کمال تشکر را دارم.

pH های ۳ تا ۱۰ پایدار بودند. حداقل غلظت کشنده و مهارکننده رشد مایع رویی لاکتوباسیلوس‌ها با استفاده از روش رقت در لوله به ترتیب رفت ۱/۱۶ و ۱/۸ بود. با توجه به نتایج بدست آمده، می‌توان از مایع رویی به عنوان نگهدارنده بیولوژیکی در صنایع غذایی استفاده کرد. همچنین به علت اثر ضد باکتریایی لاکتوباسیلوس کازئی، می‌تواند در درمان بیماری‌های ناشی از اشریشیاکلی مورد استفاده قرار گیرد [۲۶].

اوکانا و همکاران در سال ۲۰۰۴، در تحقیق خود فعالیت میکروبی و تولید باکتریوسین دو سویه پروبیوتیک لاکتوکوکوس پلانتراروم و لاکتوباسیلوس برویس را روی چند پاتوژن بررسی کردند که بیشترین اثر مهارکنندگی روی باسیلوس سرئوس (۸-۱۰ میلی‌متر) مشاهده شد. نتایج دیگر شامل اثر ممانعت‌کنندگی روی *اشرشیا کلی* (۸-۶ میلی‌متر)، *یرسینیا ائروکولیتیکا* (۷-۶ میلی‌متر) بود [۲۷].

۵- منابع

- [۱] Ghazanfari N, Fallah S, Vasiee A, Yazdi FT. Optimization of fermentation culture medium containing food waste for l-glutamate production using native lactic acid bacteria and comparison with industrial strain. *LWT*. 2023;184:114871.
- [۲] Vasiee A, Falah F, Sankian M, Tabatabaei-Yazdi F, Mortazavi SA. Oral immunotherapy using probiotic ice cream containing recombinant food-grade *Lactococcus lactis* which inhibited allergic responses in a BALB/c mouse model. *Journal of Immunology Research*. 2020;2020.
- [۳] Behbahani BA, Noshad M, Vasiee A, Brück WM. Probiotic *Bacillus* strains inhibit growth, biofilm formation, and virulence gene expression of *Listeria monocytogenes*. *LWT*. 2024;191:115596.
- [۴] Falah F, Vasiee A, Tabatabaei-Yazdi F, Moradi S, Sabahi S. Optimization of γ -aminobutyric acid (GABA) production by *Lactobacillus* spp. from agro-food waste. *Biomass Conversion and Biorefinery*. 2024 Feb;14(3):3425-37.
- [۵] Falah F, Zareie Z, Vasiee A, Tabatabaei Yazdi F, Mortazavi SA, Alizadeh Behbahani B. Production of synbiotic ice-creams with *Lactobacillus brevis* PML1 and inulin: functional characteristics, probiotic viability, and sensory properties. *Journal of Food Measurement and Characterization*. 2021;15:5537-46.
- [۶] Behbahani BA, Noshad M, Vasiee A, Brück WM. Probiotic *Bacillus* strains inhibit growth, biofilm formation, and virulence gene expression of *Listeria monocytogenes*. *LWT*. 2024 Jan 1;191:115596.
- [۷] Falah F, Vasiee A, Alizadeh Behbahani B, Tabatabaei Yazdi F, Mortazavi SA. Optimization of gamma-aminobutyric acid production by *Lactobacillus brevis* PML1 in dairy sludge-based culture medium through response surface methodology. *Food science & nutrition*. 2021;9:3317-26.
- [۸] Gomes BC, Rodrigues MR, Winkelstroter LK, Nomizo A, de Martinis EC. In vitro evaluation of the probiotic potential of bacteriocin producer *Lactobacillus sakei*. *Journal of food protection*. 2012;75:1083-9.
- [۹] Alebooye P, Falah F, Vasiee A, Yazdi FT, Mortazavi SA. Spent coffee grounds as a potential culture medium for γ -aminobutyric acid (GABA) production by *Levilactobacillus brevis* PML1. *Lwt*. 2023;189:115553.
- [۱۰] Rouhi A, Falah F, Azghandi M, Behbahani BA, Mortazavi SA, Tabatabaei-Yazdi F, et al. Investigating the effect of *Lactiplantibacillus plantarum* TW57-4 in preventing biofilm formation and expression of virulence genes in *Listeria monocytogenes* ATCC 191. *LWT*. 2024;191:115669.
- [۱۱] Kanmani P, Satish Kumar R, Yuvaraj N, Paari K, Pattukumar V, Arul V. Probiotics and its functionally valuable products—a review. *Critical reviews in food science and nutrition*. 2013;53:641-58.
- [۱۲] Mancuskova T, Medved'ova A, Ozbolt M. The medical functions of probiotics and their role in clinical nutrition. *Current Nutrition & Food Science*. 2018;14:3-10.
- [۱۳] Dobrogosz WJ, Peacock TJ, Hassan HM. Evolution of the probiotic concept: from conception to validation and acceptance in medical science. *Advances in applied microbiology*. 2010;72:1-41.
- [۱۴] Gogineni VK, Morrow LE, Gregory PJ, Malesker MA. Probiotics: history and evolution. *J Anc Dis Prev Rem*. 2013;1:1-7.
- [۱۵] Khaled JM. Probiotics, prebiotics, and COVID-19 infection :A review article. *Saudi journal of biological sciences*. 2021;28:865-9.
- [۱۶] Fenneman AC, Weidner M, Chen LA, Nieuwdorp M, Blaser MJ. Antibiotics in the pathogenesis of diabetes and inflammatory diseases of the gastrointestinal tract. *Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology*. 2023;20:81-100.
- [۱۷] de Souza ZN, de Moura DF, de Almeida Campos LA, Córdula CR,

Cavalcanti IMF. Antibiotic resistance profiles on pathogenic bacteria in the Brazilian environments. *Archives of Microbiology*. 2023;205:185.

[۱۸] Falah F, Vasiee A, Behbahani BA, Yazdi FT, Moradi S, Mortazavi SA, et al. Evaluation of adherence and anti-infective properties of probiotic *Lactobacillus fermentum* strain 4-17 against *Escherichia coli* causing urinary tract infection in humans. *Microbial pathogenesis*. 2019;131:246-53.

[۱۹] Vasiee A, Yazdi FT, Mortazavi A, Edalatian M. Isolation, identification and characterization of probiotic *Lactobacilli* spp. from Tarkhineh. 2014.

[۲۰] Yazdi FT, Behbahani BA, Vasiee A, Mortazavi SA, Yazdi FT. An investigation on the effect of alcoholic and aqueous extracts of *Dorema aucheri* (Bilhar) on some pathogenic bacteria in vitro. *Archives of Advances in Biosciences*. 2015;6.

[۲۱] Behbahani BA, Yazdi FT, Mortazavi A, Gholian MM, Zendeboodi F, Vasiee A. Antimicrobial effect of Carboxy Methyl Cellulose (CMC) containing aqueous and ethanolic *Eucalyptus camaldulensis* L. leaves extract against *Streptococcus pyogenes*, *Pseudomonas aeruginosa* and *Staphylococcus epidermidis*. *Archives of Advances in Biosciences*. 2014;5.

[۲۲] کاظمی درسنگی ر، قائمی ن، میرپور م. س. بررسی فعالیت ضد میکروبی باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از محصولات پروبیوتیکی (لاکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریوم) (۲۰۱۱).

[۲۳] Saadatzadeh A, Fazeli MR, Jamalifar H, Dinarvand R. Probiotic properties of lyophilized cell free extract of *Lactobacillus casei*. *Jundishapur journal of natural pharmaceutical products*. 2013;8:131.

[۲۴] فرح بخش م، حکیمی ب، ذوالفقاری د. جداسازی لاکتوباسیل های پروبیوتیک از ماست های سنتی مناطق روستایی رفسنجان و بررسی اثرات ضد میکروبی آن ها-۱۳۹۱. *مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان*. ۲۰۱۳. Dec 10;12(9):733-46.

[۲۵] کیانی ا، مظفری نا، الادب حس، جندقی ن، قائمی عا. اثر آنتاگونیستی باکتری های لاکتیک جدا شده از ماست بر علیه باکتری های بیماریزا. *مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان*. ۱۳۸۵؛ ۱.

[۲۶] چاووشی فروشانی م، ایمانی فولادی ع، سعادت مند س. اثرات ضد میکروبی جسم سلولی و مایع رویی لاکتوباسیلوس کازئی جدا شده از ماست بر ضد اشریشیاکلی H7: O157. *مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل*. ۲۰۱۱؛ ۱۱.

[۲۷] Ocaña VS, Nader-Macías ME. Production of antimicrobial substances by lactic acid bacteria II: screening bacteriocin-producing strains with probiotic purposes and characterization of a *Lactobacillus* bacteriocin. *Public Health Microbiology: Methods and Protocols*. 2004:347-53.



***In vitro* comparison of antimicrobial effect of probiotic extract from *Lactobacillus casei* with current antibiotics on four strains of pathogenic bacteria**

Afroz Saadatzaheh^{1*}, Reza Honarmand², Sahar Gholipour²,

1-Assistant Professor, Ph.D. of Pharmaceutics, Department of Food and Drug Control, Faculty of Pharmacy, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

2- MD of Pharmacy, Department of Food and Drug Control, Faculty of Pharmacy, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Article History: Received:2024/5/4 Accepted:2024/7/3</p>	<p>The purpose of this study was to investigate the activity of probiotic extract achieved from <i>Lactobacillus casei</i> against the growth of 4 standard drug-resistant bacterial strains and to compare its antimicrobial effect with some common antibiotics <i>in vitro</i>. <i>L. casei</i> was cultured in standard MRS medium and under anaerobic conditions. Probiotic dry extract was extracted after separating the mass of living cells by centrifugation and stabilized by lyophilization. The investigation of antimicrobial activity was done using the diffusion-disc method, the results were analyzed using SPSS software with a significance level of $P < 0.05$. There was a significant difference between all antimicrobial agents ($P < 0.05$). The findings showed that LPE was able to control resistant pathogenic bacteria. The highest inhibitory effect of LPE was evaluated against <i>Staphylococcus aureus</i> with a diameter of 26 mm of non-growth halo and on the other hand, the lowest effect was evaluated against <i>Escherichia coli</i> with a diameter of 13.3 mm of non-growth halo. Although LPE had the greatest effect compared to antibiotic agents against 3 bacterial strains, it was weaker than gentamicin and streptomycin in the case of <i>Salmonella typhi</i>. Despite the significant antibacterial effects of LPE against several strains of gram-negative and gram-positive bacteria, more studies are necessary before its clinical administration and to prove its beneficial role in the treatment of infectious diseases.</p>
<p>Keywords: Probiotic, Antibiotic, Pathogen</p>	
<p>DOI: 10.22034/FSCT.21.157.100. *Corresponding Author E- afsaadat@gmail.com</p>	