

## اثر چربی و ماده خشک بر برخی از ویژگیهای پودر دوغ تولید شده به روش آزمایشگاهی

کمیل رشیدی<sup>1</sup>، مرتضی مشایخ<sup>2\*</sup>، امیر محمد مرتضویان<sup>3</sup>، زهره امیری<sup>4</sup>

1- دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی، دانشکده علوم تغذیه و

صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

2- استادیار گروه آموزشی علوم و صنایع غذایی، انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی، دانشکده علوم

تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

3- دانشیار گروه آموزشی علوم و صنایع غذایی، انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی، دانشکده علوم تغذیه و صنایع

غذایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

4- دانشیار گروه آموزشی علوم پایه، انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

(تاریخ دریافت: 91/8/16 تاریخ پذیرش: 92/3/8)

### چکیده

تولید و صادرات دوغ به عنوان یک نوشیدنی تخمیری بومی ایران در سالهای اخیر افزایش روبه رشدی داشته است. یکی از معایبی که باعث فساد و افزایش ضایعات دوغ می شود آلودگی ناشی از فعالیت کپکها و مخمرها می باشد. از روشهای رایج نگهداری مواد غذایی و افزایش ماندگاری (دوغ)، خشک کردن و تبدیل آن به پودر با استفاده از خشک کن پاششی و کاهش حجم و هزینه های حمل آن می باشد. در پژوهش حاضر نمونه های دوغ با چربی (0/5 و 1/5 درصد)، ماده خشک بدون چربی بدون نمک (3/5 و 4/5 درصد) و نمک 0/7 درصد با استفاده از خشک کن پاششی آزمایشگاهی ابتدا در آزمایشات مقدماتی با استفاده از تیمارهای ترکیبی شامل دمای ورودی (100، 150 و 200 درجه سانتی گراد)، دبی سیال (5، 10 و 15 میلی لیتر در دقیقه) و دبی هوای ورودی (400، 600 و 800 لیتر در ساعت) خشک شدند. بر اساس بیشترین میزان حلالیت، بهترین شرایط مشخص و سپس جهت خشک کردن نمونه های بعدی مورد استفاده قرار گرفت. میزان چربی و ماده خشک اثر قابل توجهی بر ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و میکروبی پودر دوغ داشتند. بیشترین و کمترین میزان حلالیت به ترتیب مربوط به نمونه پودر فرمول اول (دوغ با چربی 0/5 و ماده خشک بدون چربی بدون نمک 3/5 درصد و نمک 0/7 درصد) و سوم (دوغ با چربی 0/5 و ماده خشک بدون چربی بدون نمک 4/5 درصد و نمک 0/7 درصد) و برابر 82/11±0/62 در دمای 25 °C و 63/18±0/33 در دمای 15 °C بود. افزایش میزان چربی موجب کاهش حلالیت پودر دوغ، اندازه ذرات و افزایش میزان باکتریهای آغازگر زنده مانده در دوغ شد.

حروف واژگان: دوغ، چربی، ماده خشک، خشک کردن پاششی

\* مسئول مکاتبات: [mortezamashayekh@yahoo.com](mailto:mortezamashayekh@yahoo.com)

## 1- مقدمه

دوغ یک نوشیدنی تخمیری است که به مقدار زیاد در ایران و سایر کشورهای خاورمیانه مصرف می شود [1]. امروزه به دلیل افزایش سطح آگاهی مردم نسبت به مضرات نوشابه های گازدار، مصرف دوغ با توجه به فواید تغذیه ای آن از جمله قابلیت هضم بالا و افزایش جذب کلسیم افزایش چشمگیری داشته و تمایل به تولید و مصرف آن در کشور رو به افزایش است [2]. فساد دوغ در اثر فعالیت کپکها و مخمرها عامل اصلی کاهش زمان ماندگاری آن می باشد. با توجه به بالا بودن قیمت انرژی و نیروی انسانی، استفاده از سردخانه های مجهز جهت نگهداری هزینه زیادی در بر خواهد داشت. استفاده از نگهدارنده ها باعث کنترل رشد کپک ها و مخمرها می شود ولی با توجه به ضوابط و قوانین وزارت بهداشت استفاده از هرگونه افزودنی نگهدارنده در دوغ غیر مجاز است [3]. برخی از اهداف تولید محصولات لبنی جدید تخمیری خشک شده شامل بهبود زمان نگهداری محصول، کاهش حجم و به تبع آن کاهش فضای نگهداری و کم کردن هزینه های بسته بندی و حمل و نقل می باشند [4]. از طرفی فراهم آوردن شرایطی که مصرف کننده بتواند دوغ را با غلظت و طعم دلخواه خویش مصرف نماید اهمیت به سزایی دارد علاوه بر آن با توجه به عدم دسترسی به دوغ تازه در شرایط و مناطق جغرافیایی خاص، تولید پودر دوغ کمک فراوانی به تامین نیازهای تغذیه ای مصرف کنندگان آن مناطق خواهد کرد.

## 2- مواد و روش ها

## 2-1- مواد

برای تولید دوغ از شیر خشک بدون چربی شرکت کاله، خامه 25% چربی پگاه تهران، نمک طعام شرکت Merck و مایه تلقیح CH-1 شامل سویه های تجاری لاکتوباسیلوس بولگاریکوس و استرپتوکوکوس ترموفیلوس شرکت Hansen دانمارک استفاده شد. سایر مواد شیمیایی و محیط کشتهای میکروبی نیز از شرکت Merck آلمان تهیه شدند.

## 2-1-1- تهیه پودر دوغ

مخلوط کردن شیر خشک بدون چربی، خامه 25% چربی، نمک و آب با نسبتهای مذکور، به مدت 5 دقیقه با دور 4000 (rpm) مخلوط شده، پاستوریزاسیون در دمای 85 °C به مدت 30 دقیقه، خنک کردن تا دمای 42-43 °C، افزودن 2% مایه تلقیح CH-1 به مخلوط، گرمخانه گذاری تا رسیدن به pH کمتر از 4/6 در دمای 42-43 °C انجام شد. دوغ تهیه شده در آزمایشات مقدماتی با استفاده از تیمارهای ترکیبی شامل دمای ورودی (100، 150 و 200 درجه سانتی گراد)، دبی سیال (5، 10 و 15 میلی لیتر در دقیقه) و دبی هوای ورودی (400، 600 و 800 لیتر در ساعت) خشک شد. سپس بر اساس بیشترین میزان حلالیت دمای 200 °C، دبی سیال 5 mL/min و دبی هوای ورودی 400L/h برای تولید پودر در مراحل بعدی انتخاب شد. در این تحقیق 4 فرمول پودر دوغ با استفاده از خشک کن پاششی (Mini spray dryer Buchi B-290) که از 4 نوع فرمول دوغ در آزمایشگاه تهیه و تولید شدند (جدول 1).

جدول 1 فرمول هریک از دوغ ها و نمونه شاهد

آزمون	چربی (درصد)	ماده خشک بدون چربی - بدون نمک (درصد)	نمک (درصد)
فرمول اول	0/5	3/5	0/7
فرمول دوم	1/5	3/5	0/7
فرمول سوم	0/5	4/5	0/7
فرمول چهارم	1/5	4/5	0/7
فرمول شاهد	0/5	3/5	0/7

2-2- اندازه گیری اسیدیته و pH، چربی، پروتئین، رطوبت و باقیمانده باکتریهای آغازگر پودر دوغ

به ترتیب به روش استاندارد ملی به شماره‌های، 1531 2852، 8781 639 و 7714 انجام گرفت [5-9].

2-3- اندازه گیری حلالیت نمونه های پودردوغ

توزین 0/5 گرم نمونه پودر دوغ داخل فالكون 50 میلی‌لیتری، 5 دقیقه مخلوط کردن، سپس سانتریفوژ کردن با دور 3000 و به مدت 5 دقیقه با دستگاه مدل Hettich/rotina 35r انجام شد. انتقال 25 میلی‌لیتر از مایع رویی به داخل ظرف مخصوص اندازه‌گیری محتوای رطوبت، نمونه بلافاصله در دمای 105°C به مدت 5 ساعت گرمخانه گذاری شد. در نهایت درصد حلالیت براساس تفاوت وزن محاسبه شد [10].

2-4- اندازه گیری دمای انتقال شیشه ای

به روش گرما سنجی روبشی تفاضلی با استفاده از دستگاه Tg مدل Perkin dimer ساخت انگلستان اندازه گیری شد. انتقال 2mg نمونه به ظرف آلومینیومی استاندارد و از یک ظرف خالی آلومینیومی به عنوان مرجع، اسکن کردن حرارتی از 20- تا 200°C با نرخ گرمادهی 10 °C/min انجام شد. عدد گزارش شده میانگین 3 تکرار می باشد [11].

2-5- اندازه گیری اندازه ذرات پودر دوغ

اندازه ذرات با دستگاه تعیین اندازه ذره مدل Malverin ساخت انگلستان تعیین شد. فشار توزیع کننده 1000 میلی‌بار، فرکانس و بیراتور 80Hz، قدرت و بیراتور 90% و فاصله‌ی زمانی بین لرزش و بیراتور و رد شدن نمونه از جلوی لیزر 15 ثانیه و زمان بین هر دو اندازه‌گیری 30 ثانیه بود. اندازه ذره ی گزارش شده برای هر نمونه، d50 و میانگین 5 تکرار بود [12].

2-6- تجزیه و تحلیل آماری

برای ارزیابی آماری داده ها از نرم افزار SPSS17 و روش ANOVA یک طرفه و در صورت مشاهده ی اختلاف معنی دار بین ویژگیهای اندازه گیری شده نمونه ها، از آزمون حداقل تفاوت معنی دار (LSD) استفاده شد.

3- یافته ها

3-1- بررسی ویژگیهای ترکیبات پودر دوغ:

ویژگیهای اندازه گیری شده 4 فرمول پودر دوغ در جدول 2 آمده است. تفاوت بین میزان چربی و پروتئین در 4 فرمول پودر دوغ به علت اختلاف میزان آنها در دوغ اولیه و تغلیظ در اثر خشک کردن معنی دار بود. اسیدیته و pH در نمونه های دوغ به عنوان شاخصی از فعالیت باکتریهای آغازگر در نظر گرفته شد. بر حسب استاندارد ملی ایران، pH همه ی نمونه ها در محدوده ی قابل قبول بود، اسیدیته و pH فرمول چهارم با سایر نمونه ها اختلاف معنی دار داشت ولی سایر نمونه ها با هم اختلاف معنی دار نداشتند (جدول 2).

جدول 2 میانگین و انحراف معیار میزان ترکیبات چهار فرمول پودر دوغ

آزمون	رطوبت %	چربی %	پروتئین %	pH	اسیدیته (D°)
فرمول اول	5/36±0/17c	10/54±0/14b	26/34±0/17c	4/22±0/025b	62±0/5a
فرمول دوم	4/72±0/17b	26/28±0/12d	21/48±0/2a	4/18±0/026b	63/83±0/28a
فرمول سوم	5/32±0/13c	8/77±0/12a	27/39±0/21d	4/2±0/069b	64/33±0/57a
فرمول چهارم	4/04±0/08a	22/54±0/19c	23/5±0/22b	4/1±0/015a	67/66±0/57b

حروف کوچک متفاوت در هر ستون نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح 95% ( $p < 0.05$ ) بین تیمارها می باشد.

## 3-2- بررسی حلالیت

حلالیت نمونه ها در محدوده ی 82/73-62/85 درصد قرار داشت. در تمام فرمولها میزان حلالیت در دو دمای 15°C و 25°C تفاوت معنی دار داشتند. در دمای 15°C و 25°C بیشترین میزان حلالیت مربوط به فرمول اول و کمترین میزان مربوط به نمونه چهارم بود و تمامی نمونه ها با یکدیگر اختلاف معنی دار داشتند (جدول 3).


جدول 3 میانگین و انحراف معیار میزان حلالیت در 4 فرمول

دما	15°C	25°C
فرمول اول	77/05±0/43Ad	82/11±0/62Bd
فرمول دوم	66/31±0/85Ab	70/87±0/99Bb
فرمول سوم	73/95±0/4Ac	79/14±0/59Bc
فرمول چهارم	63/18±0/33Aa	67/00±0/72Ba

حروف کوچک متفاوت (در هر ستون) و بزرگ متفاوت (در هر ردیف) نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح 95% ( $p < 0.05$ ) است.

## 3-3- بررسی اندازه ذرات

اندازه ذرات نمونه های پودر دوغ در محدوده  $11/386\mu\text{m}$ - $53/924$  قرار داشت (شکل 1)، بیشترین اندازه ذرات مربوط به فرمول سوم و کمترین مربوط به فرمول دوم بود. فرمول سوم با سایر نمونه ها تفاوت معنی داری داشت، سایر نمونه ها با یکدیگر تفاوت معنی دار نداشتند.



شکل 1 نمودار توزیع اندازه ذرات در 4 فرمول پودر دوغ


$d(0.1)\mu\text{m}$ : 10% ذرات اندازه گیری شده، اندازه ای کمتر از عدد گزارش شده داشتند.

$d(0.5)\mu\text{m}$ : 50% ذرات اندازه گیری شده، اندازه ای کمتر از عدد گزارش شده داشتند.

$d(0.9)\mu\text{m}$ : 90% ذرات اندازه گیری شده، اندازه ای کمتر از عدد گزارش شده داشتند.

## 3-4- بررسی دمای انتقال شیشه ای

فرمول اول کمترین ( $30/05^\circ\text{C}$ ) و فرمول چهارم بیشترین ( $42/14^\circ\text{C}$ ) دمای انتقال شیشه ای را داشتند (شکل 2). نتایج نشان داد که میزان دمای انتقال شیشه ای با افزایش میزان رطوبت کاهش می یابد. فرمول اول کمترین و فرمول چهارم بیشترین دمای انتقال شیشه ای را داشتند، فرمول اول و سوم تفاوت معنی داری نداشتند. فرمول دوم و چهارم با یکدیگر و سایر فرمولها تفاوت معنی دار داشتند.



شکل 2 نمودار دمای انتقال شیشه ای 4 فرمول پودر دوغ

## 3-5- بررسی میزان باقیمانده لاکتوباسیلوس

## بولگاریکوس

تغییرات میزان باقیمانده لاکتوباسیلوس بولگاریکوس تا پایان روز 30م روند کاهشی داشت (جدول 4). در فرمول چهارم و شاهد اختلاف معنی دار بین روز تولید با روز 30م مشاهده شد. در روز تولید بیشترین میزان، مربوط به نمونه شاهد بود که با سایر نمونه ها اختلاف معنی دار داشت. در روز 15م و 30م بیشترین میزان، مربوط به نمونه شاهد و پس از آن فرمول چهارم بود که هر دو با یکدیگر و سایر نمونه ها اختلاف معنی دار داشتند.

جدول 4 بررسی نتایج شمارش باقیمانده لاکتوباسیلوس بولگاریکوس

زمان	روز تولید	روز 15	روز 30
فرمول اول	5/54±0/064Aa	5/32±0/059Aa	5/19±0/11Aa
فرمول دوم	5/59±0/036Aa	5/31±0/026Aa	5/19±0/04Aa
فرمول سوم	5/60±0/04Aa	5/45±0/006Aa	5/37±0/05Aa
فرمول چهارم	5/66±0/032Aa	5/53±0/053Ab	5/47±0/044Ab
شاهد	7/29±0/07BCb	6/42±0/1ABc	6/31±0/09Ac

حروف کوچک متفاوت (در هر ستون) و بزرگ متفاوت (در هر ردیف) نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح 95% ( $p < 0.05$ ) است.

مشاهده شد. در روز تولید بیشترین میزان مربوط به نمونه شاهد بود که با سایر نمونه ها اختلاف معنی دار داشت. در روز 15 و روز 30م بیشترین میزان مربوط به نمونه شاهد و پس از آن مربوط به فرمول چهارم بود که هر دو با یکدیگر و سایر نمونه ها اختلاف معنی دار داشتند.

### 3-6- بررسی میزان باقیمانده استرپتوکوکوس

#### ترموفیلوس

روند تغییر میزان باقیمانده استرپتوکوکوس ترموفیلوس تا پایان روز 30م روند کاهشی داشت (جدول 5). در فرمول چهارم و شاهد اختلاف معنی داری بین روز تولید و روز 30 ام

جدول 5 بررسی نتایج شمارش باقیمانده استرپتوکوکوس ترموفیلوس

زمان	روز تولید	روز 15	روز 30
فرمول اول	6/60±0/06Aa	6/38±0/05Aa	6/24±0/11Aa
فرمول دوم	6/64±0/036Aa	6/45±0/026Aa	6/34±0/011Aa
فرمول سوم	6/66±0/04Aa	6/5±0/006Aa	6/42±0/05Aa
فرمول چهارم	6/71±0/032Aa	6/58±0/054Ab	6/52±0/044Ab
شاهد	8/34±0/07BCb	7/47±0/1ABc	7/36±0/092Cc

حروف کوچک متفاوت (در هر ستون) و بزرگ متفاوت (در هر ردیف) نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح 95% ( $p < 0.05$ ) است.

### 4- بحث

با توجه به نتایج به دست آمده، بررسی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی نمونه های پودردوغ نشان داد که تغییر میزان چربی و ماده خشک در فرمول دوغ اولیه سبب ایجاد تفاوت معنی دار در میزان چربی و پروتئین نمونه های پودر شد. که این تفاوت روی سایر ویژگیهای پودر نیز اثرگذار بود. عدم حلالیت کافی پودرهای لبنی مشکلاتی را در هنگام استفاده صنعتی از آنها ایجاد می کند. نقطه ذوب اسیدهای چرب شیر در محدوده ی 25 تا 45 درجه سانتیگراد قرار دارد و با توجه به دمای فرایند، این چربیها در حین خشک کردن در حالت مایع قرار دارند که به راحتی در سطح ذرات پودر قرار می گیرند و موجب افزایش چربی سطحی، ایجاد اتصال بین ذرات چربی (liquid bridge) در سطح پودر و کاهش حلالیت می شوند

[13، 14]. با توجه به نتایج به دست آمده میزان حلالیت در فرمولهای دوم و چهارم که نسبت به نمونه های اول و سوم چربی بیشتری داشتند کمتر بود. کازئینها در حالت طبیعی دارای مقدار زیادی آب می باشند (4/4 میلی لیتر آب در هر گرم کازئین) و اتصال با آب از طریق پیوندهای هیدروژنی با قسمت آبدوست زنجیره ی پروتئین برقرار می باشد. طی خشک کردن مقداری از قسمتهای آبدوست زنجیره پروتئینی تخریب می شود و طی بازسازی و با افزودن آب، جذب آب توسط کازئینها به میزان حالت طبیعی نخواهد بود این پدیده نیز یکی از علل کاهش حلالیت پودرهای لبنی می باشد [15]. علاوه بر آن کاهش pH میزان پروتئینهای نامحلول را که در اثر متراکم شدن و لخته شدن با لاکتوز تشکیل شده اند را افزایش می دهد [16]. بنابراین در نمونه های پودر دوغ با توجه به کاهش pH

چهارم با توجه به میزان چربی و ماده خشک بیشتر و اثر محافظتی آنها در برابر حرارت خشک کن بیشتر از سایر نمونه ها بود.

## 5- نتیجه گیری

با توجه به کاهش حلالیت و اندازه ذرات پودر دوغ در اثر افزایش چربی در فرمول استفاده از دوغ با چربی برابر یا کمتر از 5/0% جهت خشک کردن مناسب تر است.

## 6- منابع

- [1] Tamime AY, Robinson RK 1999. *Yoghurt: science and technology*: Woodhead Publishing.
- [2] Forooghi Nia S, Abbasi S, Hamidi Esfahani Z 2007. Individual and combined effect of addition of gum tragacanth and guar gum on stabilization of Doogh. *Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology*;2:15-25.
- [3] Mehrban Sang Atash M, Sarabi Jamab M 2011. Evaluation of Microbiological Contamination Sources on Swelling of Iranian Yoghurt Drink during Production Processes. *Food Science Researches Magazine*; 21(1): 45-56.
- [4] Riaz RA, Ali A 1986. Effect of pre heating and packaging on chemical and reconstititional characteristics of spray-dried whole milk. *Food Science and Technology*; 23(1): 36-44.
- [5] Anonymous, Milk and Milk products. Determination of titrable acidity and pH value- test method. ISIRI no 2852. 1<sup>st</sup> edition, Karaj: ISIRI; 2006 [in Persian]
- [6] Anonymous, Dried milk and dried milk products. Determination of fat content - Gravimetric method(Reference method). ISIRI no 1531. 2<sup>nd</sup> Revition, Karaj: ISIRI; 2010 [in Persian].
- [7] Anonymous, Milk and Milk products. Determination of total nitrogen content of milk (kjeldahl method)- test method. ISIRI no 639. 1<sup>st</sup> edition, Karaj: ISIRI; 1999 [in Persian].
- [8] Anonymous, Dried milk-Determination of moisture content (Reference method). ISIRI no 8781. 1<sup>st</sup> edition, Karaj: ISIRI; 2006 [in Persian].

به حدود 4/5 و کمتر از آن و همچنین استفاده از حرارت  $200^{\circ}\text{C}$  و دناوره شدن برگشت ناپذیر پروتئینها، حلالیت نمونه های دوغ در بهترین حالت حدود 83% بود. کاهش اندازه ذره هنگام خروج از اتمایزر مساحت سطح ذره را افزایش داده و به تبع آن میزان حلالیت نیز افزایش می یابد [17]. در این تحقیق با کاربرد اتمایزر با اندازه 1/4mm که کوچکترین اتمایزر موجود بود سعی گردید اندازه ذرات حین خروج از اتمایزر در کوچکترین حد ممکن نگه داشته شود. با افزایش میزان چربی در پودر اندازه ذرات به علت ذوب شدن چربی در دمای خشک کن و تخلیه بخارات موجود در ذرات پودر و چروکیده شدن آنها کاهش می یابد [18]. در این تحقیق نیز فرمولهای اول و سوم به علت دارا بودن چربی کمتر اندازه ذرات بیشتری داشتند (شکل 1). عامل دیگر موثر بر روی اندازه ذرات دمای ورودی خشک کن می باشد. هنگامی که دمای خشک کن به اندازه کافی بالا باشد رطوبت ذرات به سرعت تبخیر شده و پوسته آنها سخت و خشک می گردد، بنابراین فرصتی برای تخلیه بخار موجود در ذرات پودر وجود نخواهد داشت و تخلخل پودر بیشتر می شود [19,20]. در این تحقیق با کاربرد دمای ورودی  $200^{\circ}\text{C}$  از عامل دمای ورودی جهت افزایش اندازه ذرات استفاده شد. دمای انتقال شیشه ای یک ماده ی فوق اشباع و بی شکل به محدوده ی دمایی گفته می شود که ماده ی مورد نظر از حالت شیشه ای به حالت لاستیکی تغییر می کند [21].  $T_g$  آب خالص بسیار پایین و معادل  $-135^{\circ}\text{C}$  است و از اینرو اثر چشمگیری در پایین آوردن  $T_g$  کلی پودرهای لبنی دارد [22]. با توجه به نتایج حاصل از آزمون رطوبت فرمول چهارم با کمترین میزان رطوبت  $(4/04 \pm 0/08)$  بیشترین دمای انتقال شیشه ای را داشت و فرمول اول با بیشترین میزان رطوبت  $(5/36 \pm 0/17)$  دارای کمترین میزان دمای انتقال شیشه ای بود (شکل 2). میزان باقیمانده لاکتوباسیلوس بولگاریکوس نسبت به استرپتوکوکوس ترموفیلوس کمتر بود. میزان کمتر لاکتوباسیلوس بولگاریکوس پس از خشک کردن پاششی به علت اثر تخریبی حرارت روی دیواره سلولی باکتری و آسیب به غشای سیتوپلاسمیک این باکتری می باشد [23]. افزایش میزان چربی و ماده خشک به علت اثر محافظتی در برابر حرارت میزان زنده مانی باکتریهای آغازگر در حین خشک کردن پاششی را افزایش می دهد [24]. بر همین اساس میزان باقیمانده باکتریهای آغازگر در فرمول

- storage time on nonfat dry milk proteins. *Journal of Food Science*. 1989;54(5):1218-1221.
- [17] Clarke AR, Archenhold G, Davidson NC. A novel technique for determining the 3D spatial distribution of glass fibres in polymer composites. *Composites Science and Technology*. 1995;55(1):75-91.
- [18] Nijdam JJ, Langrish TAG. The effect of surface composition on the functional properties of milk powders. *Journal of Food Engineering*. 2006;77(4):919-925.
- [19] Chegini G, Ghobadian B. Spray dryer parameters for fruit juice drying. *World Journal of Agricultural Sciences*. 2007;3(2):230-236.
- [20] Banat F, Jumah R, Al-Asheh S, Hammad S. Effect of operating parameters on the spray drying of tomato paste. *Engineering in life sciences*. 2002;2(12):403-407.
- [21] Hogan SA, Famelart MH, O'Callaghan DJ, Schuck P. A novel technique for determining glass-rubber transition in dairy powders. *Journal of Food Engineering*. 2010;99(1):76-82.
- [22] Chuy Le, Labuza TP. Caking and stickiness of dairy-based food powders as related to glass transition. *Journal of Food Science*. 1994;59(1):43-46.
- [23] Kim SS, Bhowmik SR. Survival of lactic acid bacteria during spray drying of plain yogurt. *Journal of Food Science*. 1990;55(4):1008-1010.
- [24] Koc B, Yilmazer MS, Balkır P, Ertekin FK. Spray drying of yogurt: Optimization of process conditions for improving viability and other quality attributes. *Drying Technology*. 2010;28(4):495-507.
- [9] Anonymous, Yogurt-Yogurt manufacturer based identification of microorganisms .Colony count technique at 37 °C test method. ISIRI no 7714. 1<sup>st</sup> edition, Karaj: ISIRI; 2004 [in Persian].
- [10] Eastman JE, Moore CO; 1984. Cold-water-soluble granular starch for gelled food compositions. Patents US patents.
- [11] Shrestha AK, Howes T, Adhikari BP, Bhandari BR; 2007. Water sorption and glass transition properties of spray dried lactose hydrolysed skim milk powder. *LWT - Food Science and Technology*;40(9):1593-1600.
- [12] Amiri-Rigi A, Emam-Djomeh Z, Mohammadifar MA, Mohammadi M; 2012. Spray drying of low-phenylalanine skim milk: optimisation of process conditions for improving solubility and particle size. *International Journal of Food Science & Technology*. 47(1): 495-503.
- [13] Hardas N, Danvirivakul S, Foley J, Nawar W, Chinachoti P; 2008. Effect of relative humidity on the oxidative and physical stability of encapsulated milk fat. *Journal of the American Oil Chemists' Society*.151(2) 79-85.
- [14] Fitzpatrick JJ, Iqbal T, Delaney C, Twomey T, Keogh MK; 2004. Effect of powder properties and storage conditions on the flowability of milk powders with different fat contents. *Journal of Food Engineering*. 64(4):435-444.
- [15] Gaiani C, Scher J, Schuck P, Hardy J, Desobry S, Banon S; 2006. The dissolution behaviour of native phosphocaseinate as a function of concentration and temperature using a rheological approach. *International Dairy Journal*. 16(12):1427-1434.
- [16] Parris N, Barford R, White A, Mozersky S. Effect of processing temperature and

## Effects of fat and dry matter content on some properties of Doogh powder produced in laboratory scale

Rashidi, K. <sup>1</sup>, Mashayekh, M. <sup>2\*</sup>, Mortazavian A. M. <sup>3</sup>, Amiri, Z. <sup>4</sup>

1. M.Sc. in Food Science and Technology, National Nutrition & Food Technology Research Institute, Faculty of Nutrition Science and Food Technology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2. Assistant Prof, Dept. of Food Science and Technology, National Nutrition & Food Technology Research Institute, Faculty of Nutrition Science and Food Technology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3. Associate Prof, Dept. of Food Science and Technology, National Nutrition & Food Technology Research Institute, Faculty of Nutrition Science and Food Technology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4. Associate Prof, Dept. of Basic science, National Nutrition & Food Technology Research Institute, Faculty of Nutrition Science and Food Technology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

(Received: 91/8/16 Accepted: 92/3/8)

Production and export of Doogh as a Iranian fermented national drink have increased. Contamination of Doogh by yeasts and molds is one of the defects that results in spoilage and increasing the waste of the product. Drying and conversion of Doogh to its powder by spray dryer is one of the method for increasing the shelf life and decreasing the volume and the costs of transportation.

In this study Doogh samples with fat content ( 0.5% and 1.5%), dry matter without fat and salt (3.5% and 4.5%) and 0.7% salt were first dried in preliminary tests including inlet air temperature ( 100, 150 and 200 °C), liquid feed flow rate (5,10 and 15 mL min<sup>-1</sup>) and drying air flow rate ( 400, 600 and 800 L h<sup>-1</sup>). Best condition were adjusted according to the best results of solubility test and were conducted to drying the samples.

fat content and dry matter had significant effect on physical, chemical and microbial characteristics of Doogh powder. First and forth formula had highest and lowest solubility. The solubility of first and forth formula was 82.11±0.62% at 25 °C and 63.18±0.33% at 15 °C respectively.

Increasing the fat content results in decreasing the solubility, increasing the particle size and the rate of viable starter counts.

**Keywords:** Doogh, Fat, Solid matter, Spray drying

---

\* Corresponding Author E-Mail Address: [mortezamashayekh@yahoo.com](mailto:mortezamashayekh@yahoo.com)