

تعیین مقادیر عناصر معدنی سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، آهن، روی و مس در کبد و کلیه گاومیش های کشتار شده در کشتارگاه صنعتی ارومیه

حسین تاجیک^{1*}، محمدرضا پژوهی الموتی²، رزاق محمودی²،
سیامک عصری رضائی³

- 1- دانشیار گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه
 - 2- دستیار گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه
 - 3- استادیار گروه علوم بالینی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه
- (تاریخ دریافت: 87/5/5 تاریخ پذیرش: 88/3/5)

چکیده

کبد و کلیه گاومیش به مانند دیگر ضمام خوراکی بعنوان منابع پروتئینی در دسترس مورد استفاده قرار می گیرند. در این مطالعه به منظور اندازه گیری مقادیر عناصر معدنی سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، آهن، مس و روی در کبد و کلیه گاومیش های کشتار شده در کشتارگاه صنعتی ارومیه و ارزیابی تفاوت میزان آنها در جنس نر و ماده و دو گروه سنی نابالغ و بالغ، از روش هضم اسیدی به طریقه خاکستر خشک، استفاده گردید. در مجموع، نمونه های کبد و کلیه از 40 رأس گاومیش کشتار شده جمع آوری و بر اساس جنسیت و سن دسته بندی شدند. آنالیز نمونه های حاصل از هضم اسیدی بوسیله دستگاه جذب اتمی، کالیبره شده با کمک محلولهای استاندارد خالص عناصر معدنی، انجام گردید. بالاترین مقادیر عناصر معدنی اندازه گیری شده در کبد و کلیه به ترتیب مربوط به پتاسیم با 326,4 و 212,69 و سدیم با 72,2 و 172,32 میلیگرم در 100 گرم بافت تازه بود. همچنین بر اساس ارزیابی صورت گرفته هیچ گونه اختلاف آماری معنی داری بر اساس جنسیت و بلوغ در نمونه های مورد بررسی مشاهده نگردید.

کلید واژگان: عناصر معدنی، گاومیش، هضم اسیدی، جذب اتمی.

1- مقدمه

فرآورده های پروتئینی یکی از نیازهای اساسی و ضروری تغذیه انسان می باشند که از منابع سرشار عناصر معدنی بشمار می آیند [1]. از جمله فرآورده های پروتئینی می توان به ضمام خوراکی دام شامل کبد، کلیه، مغز، خون و غیره اشاره کرد که نشخوارکنندگان اهلی مهمترین موجودات تولید کننده آن در سراسر جهان هستند. جمعیت گاومیش در جهان بطور تقریبی در حدود 166/4 میلیون رأس می باشد که در حدود 161/4 میلیون

* مسئول مکاتبات: Tajik_h@yahoo.com

آنها در جنس نر و ماده و دو گروه سنی نابالغ و بالغ، با استفاده از روش هضم اسیدی به طریقه خاکستر خشک می باشد و نشان داده شود که ضمام خوراکی گاومیش و گاو ارزش غذایی برابری دارند.

2- مواد و روش ها

2-1- جمع آوری و آماده سازی نمونه ها

در این مطالعه از 40 رأس گاومیش (رودخانه ای) کشتار شده در کشتارگاه صنعتی ارومیه، نمونه های کبد و کلیه به وزن 5-10 گرم جمع آوری گردید. نمونه های کبد از لوب چپ کبد و نمونه های کلیه از لوبول های کلیه سمت راست حاوی مدولا و کورتکس، با اسکالپل تمیز، بر اساس نر و ماده و همچنین بالغ و نابالغ بودن دام (فرمول دندان) برداشته شده و داخل کیسه های پلی اتیلن تقسیم و بسته بندی شدند. تمام نمونه ها از لحاظ بهداشتی و سالم بودن قابلیت مصرف مورد تأیید بازرسی قرار گرفتند. نمونه ها در شرایط بهداشتی به آزمایشگاه منتقل و تا زمان انجام آزمایش در فریزر با دمای پایین تر از 20- درجه سانتیگراد نگهداری شدند. بعد از انجمادزدایی در 4 درجه سانتیگراد، بافت همبند و چربی همراه نمونه ها جدا گردیده و نمونه ها بطور کامل همگن شدند [9].

2-2- آنالیز عناصر معدنی

در این مطالعه برای هضم نمونه ها از روش خاکستر خشک استفاده گردید که به ترتیب مراحل همگن سازی نمونه ها، آگیری کامل نمونه ها به مدت 24-30 ساعت در دمای 105 درجه سانتیگراد، حذف چربی از نمونه های خشک شده به کمک اتر به مدت 12 ساعت، توزین نمونه های خشک شده به میزان 2 گرم در بوتله های چینی و قرار دادن آنها در کوره الکتریکی با دمای 550 درجه سانتیگراد به مدت 6 ساعت اجرا گردید [10]. با توجه به مطالعه انجام شده توسط Devatkal و همکاران (2004) که برای آنالیز مقادیر عناصر معدنی در کبد از روش خاکستر خشک استفاده شده بود. خاکستر سفید باقیمانده بعد از سرد شدن در اسید نیتریک غلیظ (Merck, Germany) حل گردیده و به کمک آب دیونیزه حجم آن در هر فلاسک به 10 میلی لیتر رسانده شد.

رأس (97/2 درصد) از آنها در آسیا یافت می شود. جمعیت گاومیش در ایران بطور تقریبی 523 هزار رأس تخمین زده می شود [2]. ترکیب شیمیایی، ارزش غذایی و بسیاری خواص دیگر گوشت گاومیش بیه به گوشت گاو بوده و در مناطقی که این دو نوع حیوان تحت شرایط یکسان پرورش داده شوند مصرف کننده هیچ اختلافی بین گوشت آنها پیدا نخواهد کرد [3]. از میان ضمام خوراکی دام، کبد و کلیه بدلیل طبع مشتری پسندشان بیشترین مصرف را دارند. کبد از نظر فیزیولوژی تغذیه بعلت دارا بودن مقادیر زیادی از ویتامین های گروه ب، آهن و کلیه اسیدهای آمینه ضروری واجد ارزش بیولوژیکی بالایی می باشد [1]. کبد گاومیش در مقایسه با کبد گاو درصد رطوبت و چربی بالاتر و پروتئین و کربوهیدرات پایین تری می باشد [9]. میزان رطوبت و کربوهیدرات کلیه بیشتر از بافت عضلانی می باشد [4]. کلیه دارای مقدار قابل توجهی پروتئین است، چربی آن از کبد بیشتر است و حاوی کلسترول بالاست. از طرف دیگر کلیه منبع خوبی از ویتامین های آ و گروه ب است [5]. عناصر معدنی نقش بسزایی در اعمال حیاتی بدن انسان دارند برای مثال آهن بعنوان اتم مرکزی در مولکولهای هم، نه تنها در سلولهای خونی بلکه در آنزیم هایی مانند کاتالاز و پراکسیداز نیز وجود دارد [6]. اگر چه مقادیر عناصر معدنی موجود در ضمام خوراکی دام ها از گونه ای به گونه ای دیگر متفاوت است اما باید به این نکته توجه داشت که نوع تغذیه و منطقه جغرافیای نیز روی میزان عناصر معدنی آن تأثیرگذار می باشند [7]. در کتابچه راهنمای USDA شماره 8-13 مقدار غلظت عناصر معدنی گوشت و غذاهای گوشتی رایج گردآوری شده است [8]. اما اطلاعات اندکی در مورد ارزش غذایی ضمام خوراکی گاومیش وجود دارد. با توجه به نقش گسترده عناصر معدنی در بدن و متضمن بودن سلامتی انسان به اخذ کافی این عناصر از غذاها، اطلاع داشتن از ترکیبات موجود در غذاهای مختلف نیازی بس مهم در تنظیم برنامه غذایی می باشد. کبد و کلیه گاومیش به مانند دیگر ضمام خوراکی بعنوان منابع پروتئینی در دسترس مورد استفاده قرار می گیرند. هدف از این مطالعه اندازه گیری مقادیر عناصر معدنی سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، آهن، مس و روی در کبد و کلیه گاومیش های کشتار شده در کشتارگاه صنعتی ارومیه و ارزیابی تفاوت میزان

و ماده و گروه های سنی نابالغ و بالغ ارزیابی گردید. سطح $p < 0,05$ معنی دار قلمداد گردید.

3- نتایج


ارزیابی نتایج بدست آمده در خصوص اندازه گیری مقدار میانگین عناصر معدنی در نمونه های کبد و کلیه گاومیش های کشتار شده در کشتارگاه صنعتی ارومیه بدون در نظر گرفتن سن و جنس به ترتیب در نمودار شماره 1 و 2 نشان داده شده است. با هدف مقایسه تاثیرات جنس و سن روی میزان عناصر معدنی، آنالیز واریانس و تست دو طرفه T-student برای داده های حاصل از اندازه گیری مقادیر عناصر معدنی در نمونه های کبد و کلیه انجام گردید، که با توجه به بررسی به عمل آمده هیچ گونه اختلاف آماری معنی داری در میزان عناصر معدنی نمونه های کبد و کلیه مورد آزمایش تحت تأثیر جنسیت و سن مشاهده نگردید.

همچنین مقادیر عناصر معدنی کبد و کلیه بر اساس گروه های جنسی نر و ماده به ترتیب در نمودارهای شماره 3 و 4 و بر اساس دو گروه سنی نابالغ و بالغ بطور مجزا در نمودارهای شماره 5 و 6 مورد مقایسه قرار گرفته شده است. بالاترین مقدار عناصر معدنی در کبد و کلیه مربوط به پتاسیم به ترتیب با 326,4 و 212,6 و کمترین میزان در کبد مربوط به آهن با 5,9 و در کلیه مربوط به مس با 0,4 میلیگرم در 100 گرم بافت تازه بود.


نمونه ماده شیمیایی مرجع (LUTS-1) که از NRCC (National Research Council of Canada) تهیه شده بود نیز طبق دستورالعمل در دمای 105 درجه سانتیگراد، خشک شده و سپس مراحل خاکستر شدن را مطابق نمونه های آزمایشی طی کرد. در پایان حجم نهایی همه نمونه ها با آب دیونیزه به 10 میلی لیتر رسانده شد. میزان بازیافت (Recovery) برای عناصر مورد مطالعه محاسبه و در اندازه گیری عناصر به تفکیک اعمال گردید. آنالیز نمونه های آماده شده به کمک دستگاه جذب اتمی (Shimadzu, AA-6800, Japan) با تکیه بر روش پیشنهادی (Pelkin-Elmer (1994) انجام گردید [11]. دستگاه به کمک محلولهای استاندارد آماده کالیبره گردید (Merck, Germany). مقدار عناصر معدنی بصورت میلیگرم در 100 گرم بافت تازه بیان گردید. طول موجهای 248,3 - 285,2 - 422,7 - 766,5 - 589,0 - 213,9 و 324,7 نانومتر، به ترتیب برای قرائت عناصر معدنی سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، آهن، روی و مس بوسیله دستگاه جذب اتمی استفاده شد.

2-3 آنالیز داده ها


در این مطالعه از نرم افزار آماری SPSS ویرایش 11 تحت ویندوز جهت انجام آزمون های آماری استفاده شد. به کمک آنالیز واریانس (ANOVA) تست توکی و آزمون دو طرفه T-student آزمون آماری آنالیز واریانس (تست ANOVA) و همچنین تست T-student مقادیر عناصر معدنی بین گروههای جنسی نر




نمودار 1 مقدار میانگین عناصر معدنی در نمونه های کبد گاومیش بر اساس وزن مرطوب




نمودار 2 مقدار میانگین عناصر معدنی در نمونه های کلیه گاومیش بر اساس وزن مرطوب




نمودار 3 تأثیر جنس در میانگین عناصر معدنی کبد گاومیش



نمودار 4 تأثیر جنس در میانگین عناصر معدنی کلیه گاومیش



نمودار 5 تأثیر سن در میانگین عناصر معدنی کبد گاو میش



نمودار 6 تأثیر سن در میانگین عناصر معدنی کلیه گاو میش

4- بحث

اساس وزن مرطوب (میلیگرم در 100 گرم) به ترتیب برای سدیم: 72,24 و 172,32، پتاسیم: 326,4 و 212,6، کلسیم: 6,46 و 5,1، منیزیم: 60,2 و 15,52، آهن: 5,91 و 5,84، روی: 6,49 و 1,4 و مس: 0,4 و 6,49 بود. در پژوهشی که توسط Devatkal و همکارانش بر روی کبد گاو میش های هند صورت گرفت میزان میانگین عناصر معدنی را در کبد گاو میش به ترتیب برای سدیم: 60,04، پتاسیم: 274، کلسیم: 5,6، منیزیم: 6,2، آهن: 20,86، روی: 5,16 و مس: 5,6 میلیگرم در 100 گرم اعلام نمودند [9]. نتایج بدست آمده از این مطالعه با مقادیر عناصر معدنی که Devatkal و همکارانش در مورد کبد گاو میش گزارش کرده بودند مشابه بود به استثنا میزان منیزیم و آهن کبد، که در بررسی ما به ترتیب 60,2

میزان عناصر معدنی موجود در کبد و کلیه تا حدودی بر گرفته از نقش فیزیولوژیکی آنها و میزان عناصر موجود در جیره غذایی دام، که منعکس کننده مقدار عناصر معدنی خاک منطقه نیز می باشد. کبد و کلیه گاو میش بعنوان منابع پروتئینی در رژیم غذایی مورد استفاده قرار می گیرند. عناصر معدنی نقش بسزایی در اعمال حیاتی بدن دارند از آن جمله می توان به نقش کاتالیزوری آهن، مس و روی، تأثیر پتاسیم در تنظیم ضربان قلب و نقش سدیم در افزایش فشار خون اشاره کرد [1]. از سویی، مقدار این عناصر در کبد و کلیه نشان دهنده ارزش تغذیه ای آنها برای قرار گیری در جیره غذایی می باشد. نتایج بدست آمده از روش خاکستر خشک و جذب اتمی در مورد میزان میانگین عناصر معدنی کبد و کلیه گاو میش بر

- [4] Liu, D. C, and Ockerman, H. W. (2001). Meat Co-Products. In: Hui, Y. H., Nip, W. K. , Rogers, R. W, and Young, O. A. Meat Science and Applications. PP: 581-587 (Marcel Decker, Inc. New York).
- [5] Mohammadiha, H. (1989). Principles of Nutrition and Food Compounds for medical students. University of Tehran Press. PP: 71-89.
- [6] Saadat-Nori, M. (1984). Principles of Modern Nutrition in Health and Disease, Ashraf Press. PP: 245-272.
- [7] Lawrie, R. A. (1998). Lawrie's Meat Science . (6th ed.) PP: 258-264 (Wood Head Publishing Limited, Cambridge England).
- [8] Anderson, B. A., Lauderdale, G. L., and Hoke, I. M. (1986). Composition of foods, Beef products: Raw, Processed, Prepared. 1. USDA handbook NO: 8-13. Washington, DC: US Department of Agriculture.
- [9] Devatkal, S., Mendiratta, S. K., Kondaiah, N., Sharma, M. C. and Anjaneyulu, A. S. R. (2004). Physiochemical, functional and microbiological quality of buffalo liver. Journal of Meat Science, 68(1): 79-86.
- [10] Association of Official Analytical Chemists (1990). Official methods of analysis of AOAC, Vol. II. Association of official analytical chemist (15th ed.). Washington, DC.
- [11] Pelkin-Elmer (1994). Analytical Methods for atomic absorption spectrophotometry, Norwalk, Connecticut, USA.
- [12] Khan, A. T., Diffay. B. C., Forester. D. M., Thompson, S. J. and Mielke, H. K. (1995). Trace element concentrations in tissues of goats from Albama. J Vet Hum Toxicol, 37(4): 327-329.
- [13] Lopez, A. M., Benedito, J. L., Miranda, M., Castillo, C., Hernandez, J. and Shore, R. F. (2000). Toxic and trace elements in liver, kidney and meat from cattle slaughtered in Galicia (NW Spain). J Food Addit Contam, 17(6): 447-457.
- و 5,9 میلیگرم در 100 گرم بود. طبق مطالعه ای که توسط Lopez و همکارانش (2000) بر روی عناصر معدنی گوشت و ضمامن خوراکی گاوهای کشتار شده در شمال شرقی اسپانیا صورت پذیرفت میزان میانگین عناصر روی و مس کبد و کلیه در گاو براساس سن، در گروه سنی 6-10 ماهه در کبد و کلیه به ترتیب برای روی 5,98 و 2 و مس 6,03 و 0,36. در گروه سنی 16-2 ساله به ترتیب برای روی 4,78 و 1,44 و مس 6,44 و 0,49 میلیگرم در 100 گرم بود، که با مقایسه مقادیر عناصر معدنی، تأثیر سن کمتر تظاهر پیدا می کرد [12]. در بررسی دیگری که Khan و همکاران (1995) بر روی غلظت عناصر آهن، روی و مس در عضلات، کبد و کلیه بز بر اساس جنس و سن انجام داده بودند، دریافتند که اختلاف آماری معنی داری تحت تأثیر جنسیت و سن در میزان عناصر عضلات، کبد و کلیه وجود ندارد [13]. بر اساس نتایج بدست آمده در این مطالعه اختلاف آماری معنی داری در میزان عناصر معدنی کبد و کلیه گاو میش، تحت تأثیر جنسیت، بالغ و نابالغ بودن دام در نمونه های مورد ارزیابی دیده نشد. با توجه به میزان عناصر معدنی موجود در کبد و کلیه گاو میش، از آن می توان بعنوان مکملی برای جیره های غذایی با سدیم و پتاسیم پایین استفاده کرد. در ادامه با توجه به این مسئله که نمونه های جمع آوری شده در این بررسی بصورت تصادفی از کشتارگاه انتخاب شده بودند، پیشنهاد می شود نمونه برداری برای بررسی های بعدی از دام هایی صورت بگیرد که اولاً جیره غذایی آنها کنترل شده و حتی المقدور خاک مناطق پرورش آنها نیز از نظر غلظت عناصر معدنی مورد ارزیابی قرار گیرد.

5- منابع

- [1] Rokni, N. (2003). Science and Technology of Meat. University of Tehran Press. PP: 4-14, 182-184.
- [2] Food and Agricultural Organization (2002). FAOSTAT Statistics Database. Rome: FAO. <http://apps.fao.org>.
- [3] Farhoomand, P. (2001). Buffalo production. University of Urmia Press. PP: 41, 124-144.

Determination of mineral contents of Na, K, Ca, Mg, Fe, Zn, and Cu in liver and kidney of slaughtered Iranian water buffalos in Urmia industrial slaughterhouse

Tajik, H. ^{1*}, Pajouhi, M. R. ², Mahmodi, R. ², Asri Rezaei, S. ³

1- Associate Professor of Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University.

2- Assistance of Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University.

3- Assistante Professor of Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University.

Liver and kidney of Iranian water buffalo used to consume as protein sources. The aim of this study was to evaluate macro- and micro-elements content of liver and kidney of water buffalo. The samples were collected from both sexes of slaughtered buffalos (n=40) from two different age groups (mature and immature). A sequence of steps including drying, weighting, dry ashed and acid extract was used to determine mineral composition in liver and kidney.

Analysis of the acid digested samples were measured by a atomic absorption apparatus calibrated with standard solutions of the minerals. The results indicated that Potassium is the uppermost mineral found in liver and kidney (326.4 and 212.69 mg/100gr fresh tissue, respectively). Sodium was the second highest mineral was found in liver and kidney (72.2 and 172.32 mg/100gr fresh tissue, respectively). There was no significant differences in mineral of liver and kidney between different sexes of the buffalos. No significant differences in mineral content of both organs were found between mature and immature buffalos.

Keywords: Mineral, Buffalo, Acid digestion, Atomic absorption.

* Corresponding Author E-mail address: Tajik_h@yahoo.com