

بررسی اثر ضد میکروبی فیلم خوراکی کازئینی حاوی اسانس آویشن شیرازی بر سه میکروارگانیسم بیماریزای غذائی

عاطفه برومند^۱، منوچهر حامدی^۲، زهرا امام جمعه^{۲*}، سید هادی رضوی^۳

۱- دانشجوی دکتری گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تهران

۲- استاد گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تهران

۳- دانشیار گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تهران

(تاریخ دریافت: ۸۸/۴/۲۰ تاریخ پذیرش: ۸۸/۷/۹)

چکیده

اثر ضد میکروبی فیلم حاوی اسانس آویشن شیرازی بر روی سه میکروارگانیسم مهم بیماریزای مواد غذایی سالمونلا تیفی موریوم (ATCC 14028)، اشرشیاکلی O157:H7 (ATCC 35218) و استافیلوکوکوس اورئوس (PTCC 1431) مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این کار ابتدا کمترین غلظت بازدارنده (MIC) و کمترین غلظت کشته (MBC) اسانس آویشن شیرازی در ۶ سطح غلظتی ۴۰۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۴۰۰۰ ppm با استفاده از روش آزمایش رقت در محیط مایع برای هر یک از میکروارگانیسم های ذکر شده تعیین گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که اسانس آویشن شیرازی اگر چه بر هر سه باکتری موثر است، ولی بیشترین تاثیر آن بر استافیلوکوکوس اورئوس با MIC و MBC برابر با ۲۵۰ ppm بود. میزان MIC و MBC برای دو میکروارگانیسم دیگر ۵۰۰ ppm به دست آمد. ارزیابی خاصیت ضد میکروبی فیلم با کمک روش دیسک های انتشاری انجام گرفت. در این آزمون نیز نشترین قطر هاله بازدارنده مربوط به استافیلوکوکوس اورئوس با متوسط قطر هاله برابر با ۱۷/۲۵ میلی متر بود. متوسط قطر هاله برای سالمونلا تیفی موریوم و اشرشیاکلی O157:H7 برابر با ۱۵/۰۲ و ۱۷/۶۲ میلی متر اندازه گیری شد.

کلید واژگان: فیلم ضد میکروبی، اسانس آویشن شیرازی، سالمونلا تیفی موریوم، اشرشیاکلی O157:H7، استافیلوکوکوس

*مسئول مکاتبات: emamj@ut.ac.ir

ایجاد طعم در بسیاری از غذاهای ایرانیست^[۱۶]. مهمترین اجزای تشکیل دهندهٔ اسانس آویشن شیرازی ترکیبات فنولیک به ویژه کارواکرول و تیمول می‌باشند^[۱۷]. لازم به ذکر است که این دو ترکیب در بین ترکیبات فنلی دارای بیشترین خاصیت ضد میکروبی هستند و به همین دلیل به عنوان مادهٔ ضد میکروبی طبیعی در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. از میان تحقیقاتی که در این زمینه انجام گرفته‌اند توان به موارد زیر اشاره کرد: پراناتو^۴ و همکاران (۲۰۰۴) قدرت ضد میکروبی فیلم کیتوزان حاوی روغن سیر را با فیلم‌های حاوی سوربات پتاسیم و نیسین عنوان دو نگهدارندهٔ متداول مورد استفاده در مواد غذایی، مقایسه نمودند. در این تحقیق برای ارزیابی قدرت ضد میکروبی فیلم‌ها از روش انتشار در سطح آگار^۵ استفاده گردید و سپس قطر ناحیه بازدارنده‌ی اندازه‌گیری شد. بیشترین ناحیه بازدارنده‌ی برای فیلم کیتوزان حاوی روغن سیر مرتبط با باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس، لستریا مونوستیوژنز و باسیلوس سرئووس بود، همچنین کاهش رشد میکروبی در مورد اشرشیاکلی و سالمونلاتیفی موریوم مشاهده گردید و ناحیه بازدارنده‌ی افزایش مقدار روغن سیر افزایش پیدا می‌کرد^[۱۹].

این محققین همچنین در سال ۲۰۰۵ خواص ضد میکروبی فیلم آژنیات حاوی ۷/۷۰۴ روغن سیر^۶ را بر روی چهار باکتری پاتوژن غذایی اشرشیاکلی، سالمونلاتیفی موریوم، استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سرئووس مورد مطالعه قرار دادند. برای ارزیابی خواص ضد میکروبی بار دیگر از روش انتشار در سطح آگار استفاده کردند، فیلم تولید شده در مقابل استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سرئووس فعالیت ضد میکروبی قابل قبولی از خود نشان داد و در کل این نتایج آشکار می‌کرد که روغن سیر دارای شرایط خوبی برای مخلوط شدن با آژنیات و تولید فیلم و یا پوشش خوراکی مناسب در انواع کاربردهای غذایی می‌باشد^[۲۰].

سیدیم و ساریکوز^۷ (۲۰۰۶) فعالیت ضد میکروبی فیلم‌های حاصل از پروتئین‌های آب پنیر حاوی سه روغن اساسی

۱- مقدمه

نسل جدید بسته بندی‌ها با نام بسته بندی فعال، مدتی است که به بازار مواد غذایی معرفی و در جهت اینمی و کیفیت ماده غذایی به کار برده می‌شود. بسته بندی‌های ضد میکروبی شکلی از بسته بندی‌های فعال هستند که حاوی موادی با خاصیت ضد میکروبی می‌باشند^[۱]. بسته بندی‌های ضد میکروبی همچنین ممکن است در جهت کاهش، جلوگیری و به تعویق انداختن رشد میکرووارگانیسم‌هایی که در ماده غذایی بسته بندی شده یا خود ماده بسته بندی حضور داشته باشد عمل کنند و بدین ترتیب علاوه بر افزایش زمان ماندگاری سبب کاهش خطرات ناشی از حضور میکرووارگانیسم‌های بیماریزا شوند. فیلم‌ها و پوشش‌های خوراکی دارای استعداد بالقوه در کنترل انتقال جرم بین غذا و محیط و همچنین بین اجزای مختلف فرآورده‌های غذایی هستند بنابراین در طی فرآوری، انبارداری حمل و نقل و توزیع، نه تنها فسادهای زیان آور غذا را به تأخیر می‌اندازد بلکه همچنین ممکن است کیفیت ماده غذایی را بهبود بخشدند^[۲۱]. فیلم‌های خوراکی با قرارگرفتن بر سطح ماده غذایی و محدود کردن مهاجرت رطوبت، لیپید، طعم، آroma و رنگ سبب حفظ کیفیت ماده غذایی می‌شوند^[۱، ۳-۵]. یکی از موادی که می‌تواند به عنوان ماده فعال در ساختار فیلم‌های خوراکی ضد میکروبی به کار رود اسانس‌ها روغنسی^۸ گیاهی هستند که به صورت طبیعی دارای خواص ضد میکروبی قابل ملاحظه می‌باشند. تعداد زیادی از محققین بر روی خواص ضد میکروبی این ترکیبات مطالعات گسترده‌ای داشته‌اند^[۱۵-۱۶]. این مواد به طور گسترده در فرمولاسیون فیلم‌های ضد میکروبی به کار می‌روند و کاربرد آنها نتایج خوبی نیز به همراه داشته است.

زاتاریا مولتی فلورا^۹ یکی از گیاهان متعلق به خانوادهٔ لامیناسه^{۱۰} است که از لحاظ جغرافیایی تنها در ایران، پاکستان و افغانستان رشد می‌کند. اسم محلی این گیاه در ایران آویشن شیرازی است و به صورت سنتی به عنوان ضد عفونی کننده و شل کنندهٔ عضلات استفاده می‌شود. این گیاه همچنین یکی از مواد مهم

4. Pranato et al.
5. disk diffusion method
6. garlic oil
7. Seydim and Sarikus

1. essential oils
2. Zataria multiflora Bioss
3. Laminaceae

سویه های میکروبی و محیط کشت ها (ATCC 14028) و اشرشیاکلی O157:H7 (ATCC 35218) از دانشکده دامپژوهشی دانشگاه تهران و استافیلوکوکوس اورئوس (PTCC 1431) از سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران تهیه شدند. جهت انجام آزمایش ها از محیط های مولر هیلتون آکار^۴ و مولر هیلتون براث^۵ (ساخت شرکت MAST انگلستان) و مک کانگی آکار، بربین هارت آکار (BHA) و نوترینت آکار (ساخت شرکت مرك آلمان) استفاده شد.

۲-۲ روش ها

۲-۲-۱- تهیه کشت تازه (در فاز لگاریتمی) از میکرووارگانیسم ها

هر یک از سویه های باکتریابی روز قبل از انجام آزمون MIC و MBC و نیز پیش از ارزیابی فعالیت ضد میکروبی فیلم های ساخته شده، بر روی محیط کشت های مربوطه کشت سطحی داده شدند. تا این که میکرووارگانیسم ها پس از یک شب گرمخانه گذاری در هنگام تهیه سوسپانسیون میکروبی در فاز لگاریتمی قرار داشته باشند [۲۸].

۲-۲-۲ روش تهیه فیلم ترکیبی کازئینات سدیم دارای اسیدهای چرب اولئیک و استئاریک

جهت تهیه فیلم، ۵gr کازئینات سدیم (حاوی ۸۳٪ پروتئین ۱۲٪ چربی و ۱۸٪ خاکستر) به ۱۰۰ gr آب مقطر حاوی ۱/۵ gr گلیسرول (نسبت گلیسرول به کازئینات سدیم ۱/۵:۵) یا ۰/۳۶ (Gly/pro=۵) در دمای ۵ \pm ۶۰ درجه زدن ۵۵۰ rpm اضافه شود، پس از اینکه کازئینات سدیم به طور کامل حل شد، دما تا ۰ \pm ۵ درجه افزایش داده شد. مخلوط به مدت ۱h در این دما و شرایط هم زدن مذکور نگهداری شد. در یک بشر مقدار معین از اسیدهای چرب اولئیک و استئاریک (نسبت ۱/۰۵ pro/lipid=۱۷٪ استئاریک و ۸۳٪ اسید اولئیک) توزیں گردید. به میزان ۴۰٪ وزن روغن از دو امولسیفایر اسپان ۸۰ و اسپان ۸۵ با نسبت معین (۸٪ اسپان ۸۰ و ۹۲٪ اسپان ۸۵) برای بدست آوردن HLB مناسب به مخلوط افزوده شد. به علت اینکه اسید استئاریک در دمای محیط جامد است پیش از افزودن امولسیون

اورگانو^۶، رزماری^۷ و سیر را مورد بررسی قرار دادند. این محققان اثر ضد میکروبی فیلم های حاوی W/V ۱۰-۴٪ از انسان های روغنی نام برده را در مقابل ۵ بacterی اشرشیاکلی O157:H7 (ATCC35218)، ATCC43300، استافیلوکوکوس اورئوس (ATCC13076)، لیستریا مونوسپیتوژن (DSM20174) و لاکتوباسیلوس پلاتستاروم (NCTC2167) آزمایش کردند. نتایج به دست آمده با کمک روش دیسک های انتشاری^۸ نشان داد که فیلم های ضد میکروبی حاوی انسان روغنی اورگانو در غلط ۲٪ نسبت به انواع فیلم های حاوی روغن های سیر و رزماری بر علیه میکرووارگانیسم های مورد آزمون موثرترین بودند (p<0.05) [۲۱].

در حال حاضر فیلم های خوراکی تهیه شده از پروتئین های شیر به لحاظ ارزش غذایی، ویژگی های قابل قبول مکانیکی و همچنین خواص بسیار خوب حسی مورد توجه قرار گرفته اند [۲۲-۲۵]. به همین دلیل ما در این پژوهش از کازئینات سدیم جهت تهیه فیلم ضد میکروبی استفاده کردیم. در ضمن چون از انسان آویشن شیرازی تا کنون به عنوان ماده ضد میکروبی در تهیه فیلم به کار برده نشده بود از این ماده در فیلم مذکور استفاده گردید و تاثیر آن بر سه باکتری بیماریزای غذایی مطالعه گردید. هدف از این پژوهش تولید فیلم ضد میکروبی حاوی انسان آویشن شیرازی و بررسی تاثیر خواص ضد میکروبی آن بر سه میکرووارگانیسم استافیلوکوکوس اورئوس، سالمونلا تیفی موریوم و اشرشیاکلی O157:H7 بود.

۲- مواد و روش ها

۲-۱- مواد اولیه

پودر کازئینات سدیم درجه غذایی از بازار تهیه گردید. و انسان آویشن شیرازی با روش تقطیر با بخار آب از گیاه مذکور رد گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه تهران تهیه [۲۷]. امولسیون کننده ها و اسپان ساخت شرکت مرك آلمان بودند.

1. oregano
2. rosemary
3. disk diffusion method

4. Mueller- Hinton Agar
5. Mueller- Hinton Broth

۵-۲-۲-تهیه سوسپانسیون میکروبی

به منظور تهیه ی سوسپانسیون میکروبی مورد استفاده در آزمون MIC و MBC^۱. یک لوب پر از هر سویه ی میکروبی تحت شرایط استریل (بین دو شعله) به ۲۵ میلی لیتر محیط کشت مولرهایتون براث جهت تهیه سوسپانسیون غلیظ میکروبی اضافه گردید. سپس تا هنگام برابر شدن دانسیته نوری (OD)^۲ آن با محلول ۱ مک فارلن^۳ توسط محیط کشت (MHB) رقیق شد. برای بدست آوردن مقدار 1×10^6 میکروارکانیسم در میلی لیتر MHB تحت شرایط استریل به نسبت ۱:۵۰۰^۴ با محیط کشت مخلوط شد. جهت تهیه سوسپانسیون ۰/۵ مک فارلن^۳ برای استفاده در تعیین خواص ضد میکروبی فیلم نیز به روش بالا عمل شد [۲۸].

۶-۲-۲- ارزیابی فعالیت ضد میکروبی اسانس ها با

استفاده از روش آزمایش رقت در محیط مایع^۵

به منظور تعیین MIC و MBC^۱ شش سطح غلظت از اسانس (۴۰۰، ۲۰۰، ۱۰۰، ۵۰، ۲۵، ۱۰ ppm) تهیه شد. از روش آزمون حساسیت رقت مایع استفاده گردید [۲۸].

۷-۲-۲- بررسی خاصیت ضد میکروبی فیلم ها با

استفاده از روش دیسک های انتشاری^۶

برای بررسی خصوصیات ضد میکروبی فیلم از روش دیسک های انتشاری^۵ استفاده شد. به این منظور دیسک های به قطر تقریباً ۶ mm از فیلم ضد میکروبی به وسیله یک پانچ استریل تهیه شد. این دیسک ها سپس روی سطح پلیت های حاوی محیط کشت مولرهایتون آگار که قبلاً با سوسپانسیون میکروبی معادل MF ۰/۵ تلقیح شده بودند به صورت ۴ دیسک در هر پلیت قرار داده شدند. و سپس به مدت ۱۸h در ۳۷°C گرمانخانه گذاری شد و قطر ناحیه بازدارندگی^۷ پیرامون دیسک ها اندازه گیری شد [۲۸]. برای کنترل مثبت از دیسک های بون اسانس استفاده شد.

۲-۳- آنالیز آماری

آزمایش های اندازه گیری خاصیت ضد میکروبی فیلم در ۳ تکرار انجام شد و داده های به دست آمده با کمک نرم افزار SAS و با استفاده از آزمون های دانکن و LSD آنالیز گردید.

کننده ها دمای ظرف حاوی اسیدهای چرب 50°C تا 45^{\pm} افزایش داده شد. سپس مخلوط امولسیون کننده ها به آمیزه ی اسیدهای چرب اضافه گردید و هم زدن ملایم صورت گرفت (فیلم شاهد از این مخلوط قالب گیری شد)، اسانس گیاهی مورد نظر نیز در همین مرحله به میزان تعیین شده به فرمولاسیون افزوده شد. محلول کازئینات در دمای 50°C به مخلوط امولسیفایرها و اسیدهای چرب اضافه گردید و (IKA[®]RCT basic) ساخت آلمان) با دور rpm ۵۵۰ به مدت ۵ دقیقه انجام گرفت. مخلوط تهیه شده سپس به مدت ۳ دقیقه دیگر در ۲۰.۰۰۰rpm توسط مخلوط کن همگون ساز (IKA T25-digital ultra turax) همگون گردید. میزان استفاده از اسانس گیاهی از طریق آزمون اندازه گیری خاصیت ضد میکروبی تعیین شد. در مرحله ی بعد مخلوط همگون شده برای خروج حباب های هوا، با استفاده از یک دیسکاتور و پمپ خلاء هوایگیری شد. آنگاه مقدار معینی از امولسیون (۳۵ml) در قالب های سیلیکونی ریخته $\times 23$) و در یک آون در $42 \pm 5^{\circ}\text{C}$ (جهت جلوگیری از جدا شدن اسید استثاریک و شکستن امولسیون) به مدت ۱۳.۵h ساعت خشک گردید.

۲-۲-۳- تهیه امولسیون آبی اسانس ها امولسیون هایی با غلظت های ppm ۱۲۵، ۲۵۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۴۰۰۰ اسانس آویشن شیرازی تهیه شد.

۲-۲-۴- تهیه سوسپانسیون ۰/۵ و ۱ مک فارلن^۱

سوسپانسیون های استاندارد ۰/۵ و ۱ مک فارلن^۳ با استفاده از از محلول های آبی کلرید باریم سولفوریک تهیه گردید. کدورت ایجاد شده توسط سوسپانسیون های ۰.۵ و ۱MF^۸ به ترتیب دانسیته سلولی تقریباً معادل با $1/5 \times 10^8$ و 3×10^8 سلول در میلی لیتر ایجاد می کند. سپس کدورت آن با استفاده از دستگاه اسپکترو فتومنتر (CECIL 2502-Instruments) در طول

(Cambridge England Serial No. 125-624) موج nm ۶۲۵ اندازه گیری شد.

- 2. Optical Density (OD)
- 3. Broth Dilution Susceptibility test
- 4. disk diffusion method
- 5. Disk Diffusion Method
- 6. inhibitory zone

- 1. MC Farland

دلیل ساختار غشا باکتری های گرم مثبت است. به نظر می رسد که علت مقاومت بیشتر باکتری های گرم منفی به روغن های اساسی گیاهی احتمالاً پیچیدگی بیشتر غشای مضاعف سلولی این ارگانیسم ها در مقایسه با غشای یگانه گلیکوپروتئینی / تکوئیک^۱ اسید باکتریهای گرم مثبت است. همچنین به نظر می رسد مقاومت سلول های میکروبی به سرعت و میزان حل پذیری مواد ضد میکروبی در بخش لبیدی غشای سلولی بستگی دارد. اگرچه این مسئله نمی تواند توضیح کاملی برای شرح اختلاف در حساسیت باکتریهای گرم مثبت و منفی باشد به همین علت اختلاف در آبگریزی سطح غشای سلول نیز عنوان یک عامل مؤثر پیشنهاد شده است [۱۳].

لازم به ذکر است که در این مطالعه با توجه به روش آزمون و انتخاب سطح غلظت های انتخاب شده اثر بازدارندگی و کشنده ای انسانس آویشن شیرازی بر روی سه میکرووارگانیسم MIC و MBC این انسانس ها بر روی آنها نزدیک به هم است به این معنی که به حتمال زیاد این انسانس در غلظت های کمی بالاتر MIC دارای اثر کشنده ای است. از آن جائی که وجود انسانس در فیلم های خوراکی بر طعم آنها موثر است. بنابراین تعیین کمترین غلظت که بتواند میکرووارگانیسم های مورد نظر را غیرفعال کند ضروری به نظر می رسد.

جدول ۱ نتایج اثر ضد میکروبی انسانس آویشن شیرازی بر روی میکرووارگانیسم های آزمون

رقت های انسانس آویشن شیرازی بر حسب ppm								
								نوع
								میکرووارگانیسم
۴۰۰۰	۲۰۰۰	۱۰۰۰	۵۰۰	۲۵۰	۱۲۵	-	++	استافیلوکوکوس
-	-	-	-	-	-	+	++	اورئوس
-	-	-	-	-	+	+	++	اشرشیاکلی O157:H7
-	-	-	-	-	+	+	++	سالمونلاتیفی
								موریوم

++ نشان دهنده رشد زیاد میکرووارگانیسم، + نشان دهنده رشد کم میکرووارگانیسم، - نشان دهنده عدم رشد می باشد. نتایج عنوان شده حاصل سه تکرار است.

1. techoic acid

۳- نتایج و بحث


۱-۳- ارزیابی ویژگی های ضد میکروبی انسانس آویشن شیرازی

MIC کمترین غلظت از ماده ضد میکروبی است که دارای اثر بازدارندگی بر یک میکرووارگانیسم خاص باشد، تحت این شرایط میکرووارگانیسم دیگر قادر به رشد نخواهد بود، MBC کمترین غلظتی از ماده ضد میکروبی است که سبب مرگ میکرووارگانیسم می شود به این ترتیب هیچ میکرووارگانیسم زنده ای نباید تحت این شرایط در محیط حاوی غلظت MBC حضور داشته باشد.

نتایج حاصل از تعیین MIC و MBC انسانس آویشن شیرازی با استفاده از روش آزمایش رقت در محیط مایع در مقابل هر دو نوع میکرووارگانیسم گرم مثبت و گرم منفی بیماریزای غذایی در جدول ۱ نشان داده شده است. جدول مذکور نشان می دهد که از میان میکرووارگانیسم های مورد استفاده حساس ترین به این انسانس، استافیلوکوکوس اورئوس با MIC و MBC برابر با ۲۵۰ ppm است. مقادیر ذکر شده برای اشرشیاکلی O157:H7 و سالمونولا تیفی موریوم برابر با ۵۰۰ ppm است. نتایج به دست آمده با نتایج حاصل از پژوهش انجام گرفته توسط فاضلی و همکاران (۲۰۰۶) بر روی عصاره الکلی (۷/۷٪) تهیه شده از روش دیسک های انتشاری همخوانی دارد. طی این آزمون نیز مشخص شد که باکتری های گرم مثبت از جمله استافیلوکوکوس اورئوس حساسیت بیشتری به عصاره الکلی آویشن شیرازی نشان می دهند [۲۹]. آخوندزاده بسته و همکاران (۲۰۰۷) نیز نشان دادند در غلظت های مختلف انسانس آویشن شیرازی استافیلوکوکوس اورئوس به این انسانس حسایت بیشتری دارد. در این پژوهش اثرات توام دما، pH و غلظت انسانس آویشن شیرازی را بر دو میکرووارگانیسم سالمونولا تیفی موریوم و استافیلوکوکوس اورئوس مورد بررسی قرار گرفته شد و نتایج نشان داد با افزایش غلظت انسانس در صورت ثابت بودن دو فاکتور دیگر اثر ضد میکروبی افزایش می یابد [۳۰]. به طور کلی نتایج تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد، باکتری های گرم مثبت در مقایسه با انواع گرم منفی در برابر انسانس های گیاهی مقاومت کمتری نشان می دهند که این مسئله احتمالاً به

بررسی اثر ضد میکروبی فیلم خوراکی کازئینی حاوی اسانس...

نشان می دهد این دو میکروارگانیسم مقاومت بیشتری به اسانس به کار برده شده دارند. متوسط قطر هاله اندازه گیری شده برای اشريشياکلی *O157:H7* و سالمونلاتیفی موریوم به ترتیب 17.62mm و 16.20mm بود. با اینکه تفاوت در اندازه قطر ناحیه بازدارندگی مربوط به اشريشياکلی *O157:H7* و سالمونلاتیفی موریوم زیاد نیست اما این تفاوت معنی دار است ($p \leq 0.01$). (شکل ۲).



شکل ۲ مقایسه ای اثر و قطر هاله های ایجاد شده بر روی سه میکروارگانیسمهای مورد آزمون

E: استافیلوکوکوس اورئوس، STM: سالمونلاتیفی موریوم، St: اشريشياکلی. بر طبق نتایج بدست آمده اختلاف بین سه گروه با احتمال 99.99% معنی دار است.

بنابراین می توان نتیجه گرفت که سالمونلاتیفی موریوم مقاوم ترین میکروارگانیسم در میان سه میکروارگانیسم دیگر می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون های MIC و MBC و دیسک های انتشاری مشاهده می شود که مواد ضد میکروبی به طور آشکاری (با توجه به MBC و قطر هاله ی به دست آمده) در برابر باکتری های گرم مثبت موثرتر از باکتری های گرم منفی هستند.

در پژوهشی دیگر (پراناتو و همکاران، ۲۰۰۴) از اسانس رونگزی سیر به عنوان ماده ضد میکروبی در تهیه فیلم ضد میکروبی کیتوزان در 4% سطح غلاظتی استفاده شد بیشترین اثر ضد میکروبی بر باکتری های گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سرئوس مشاهده گردید در حالی که اشريشياکلی و سالمونلاتیفی موریوم کاملاً به چهار سطح غلاظتی موردن استفاده مقاومت نشان

۲-۳- فیلم ضد میکروبی

فیلم ضد میکروبی تولید شده به علت وجود اسانس از لحاظ ظاهری دارای ظاهری مات تر از فیلم شاهد بود که به نظر می رسد ناشی از افزایش پراکنش نور به علت تاثیر گذاری اسانس است (شکل ۱).



شکل ۱ مقایسه ای شکل ظاهری فیلم های شاهد (فیلم B) و ضد میکروبی (فیلم C)

۳- ارزیابی خواص ضد میکروبی فیلم

نتایج حاصل از ارزیابی فعالیت ضد میکروبی فیلم حاوی اسانس آویشن شیرازی در شکل ۲ به صورت نمودار ارائه شده است. فعالیت بازدارندگی بر پایه اندازه گیری قطر ناحیه شفاف اطراف دیسک های بریده شده از فیلم ها تهیه شده ارزیابی گردید. اگر هیچ ناحیه ی شفافی در اطراف دیسک ها وجود نداشته باشد به این معنی است که هیچ اثر ضد میکروبی وجود ندارد. در واقع در داخل ناحیه شفاف، ما هیچ گونه رشد میکروبی نداریم. در مقابل دیسک های حاصل از فیلم شاهد هیچ اثر بازدارندگی در مقابل رشد میکروارگانیسم های مورد آزمون مشاهده نشد. در حالیکه فیلم دارای اسانس آویشن شیرازی هاله ی به قطر متوسط 25.17mm در برابر استافیلوکوکوس اورئوس شد. در واقع استافیلوکوکوس اورئوس به عنوان یک باکتری گرم مثبت حساس ترین میکروارگانیسم به فیلم ضد میکروبی بود. ناحیه بازدارندگی برای اشريشياکلی *O157:H7* و سالمونلاتیفی موریوم کوچکتر از ناحیه ایجاد شده برای استافیلوکوکوس اورئوس بود که این

۵- تشكیر و قدردانی

نویسندها از آقای دکتر رضایی و آقای مهندس گکمکانی برای در اختیار قرار دادن اسانس آویشن شیرازی کمال تشكیر را دارند.

۶- منابع

- [1] Appendini, P. and Hotchkiss, J. H. (2002). Review of antimicrobial food packaging. *Innov. Food Sci. Emerg.* 3, 113-126.
- [2] Rojas-Graü, M. A., Avena-Bustillos, R. J., Olsen, C., Friedman, M., Henika, P. R., Martí Beloso, O., Pan, Z., Mchugh, T. H. (2007). Effect of plant essential oils and compounds on mechanical, barrier and antimicrobial properties of alginate-apple purees edible films. *Journal of Food Engineering*, 81: 634-641.
- [3] Quintavalla, S. and Vicini, L. (2002). Antimicrobial food packaging in meat industry. *J. Meat science*, 62:373-380.
- [4] Oussalah, M., Caillet, S., Saucier, L. and Lacroix, M. (2007). Inhibitory effects of selected plant essential oils on the growth of four pathogenic bacteria: *E. coli* 0157:H7, *Salmonella typhimurium*, *Staphylococcus aureus* and *Listeria monocytogenes*. *Food Cont.* 18, 414-420.
- [5] Cha, D. S. and Chinnan, M. S. (2004). Biopolymer-Based Antimicrobial Packaging: A Review. *J. Food Science and Nutrition*, 44:223-237.
- [6] Kim, J., Marshall, M. R. and Wei, C. I. (1995). Antibacterial activity of some essential oil components against five food borne pathogens. *J. agric. Food Chem.* 43, 2839-2845.
- [7] Tassou, C., Koutsoumanis, K. and Nychas, G. J. E. (2000). Inhibition of salmonella enteritidis and staphylococcus aureus in nutrient broth by mint essential oil. *Food Res. Int.* 33, 27-280.
- [8] Lambert, R. J. W., Skandimis, P. N., Coot, P. and Nychas, G. J. E. (2001). A study of the minimum inhibitory concentration and mode of action of oregano essential oil, thymol and carvacrol. *J. Appl. Microbiol.* 91, 453-462.
- [9] Delaquais, p. j., Stanich, K., Girard, B. and Mazza, G. (2002). Antimicrobial activity of individual and mixed fractions of dill, cilantro, coriander and eucalyptus essential oils. *Int J. Food microbiol.* 74, 101-109.
- [10] Rasooli, I. and Mirmostafa, S. A. (2002). Antibacterial properties of Thymus pubescens

دادند که نتایج ما را تائید می کند [۱۹]. همین پژوهش گران نتایج مشابهی را با فیلم ضد میکروبی آژینات حاوی اسانس روغنی سیر به دست آورده است [۳۱].

در مقابل سیدیم و ساریکوز (۲۰۰۶) اثر ضد میکروبی فیلم های حاصل از پروتئین های آب پنیر جداسازی شده را در ترکیب با روغن های اساسی اورگانو، سیر و رزماری در برابر ۵ میکرووارگانیسم برابر اشریشیاکلی O157:H7، استافیلوکوکوس اورئوس، لیستریا مونوستیوئنر، سالمونلا ایتریتیدیس^۱ و لاکتوپاسیلوس پلانتاروم^۲ در چهار سطح غلظتی مورد مطالعه قرار دادند. در این پژوهش سه میکروارگانیسم استافیلوکوکوس اورئوس، لیستریا مونوستیوئنر و سالمونلا ایتریتیدیس و اکنش مشابهی داشته و در برابر اسانس های سیر و اورگانو حساسیت O157:H7 بیشتری از بقیه نشان دادند، در حالی که اشریشیاکلی و لاکتوپاسیلوس پلانتاروم مقاومت بیشتری داشتند و سطح بازدارندگی کمتری نشان دادند که در این میان لاکتوپاسیلوس پلانتاروم به عنوان یک باکتری گرم مثبت با داشتن کمترین سطح بازدارندگی بیشترین مقاومت را از خود نشان داد. لازم به ذکر است که فیلم حاوی اسانس رزماری هیچ گونه اثر ضد میکروبی بر ۵ میکرووارگانیسم ذکر شده نداشت [۲۱].

۴- نتیجه گیری کلی

نتایج آزمایش های انجام شده با اسانس آویشن شیرازی نشان داد که بیشترین اثر ضد میکروبی MIC و MBC برابر برای استافیلوکوکوس اورئوس معادل با ppm ۲۵۰ داشته است و برای دو میکرووارگانیسم دیگر ppm ۵۰۰ بود. در مورد خاصیت ضد میکروبی فیلم حاوی اسانس نیز بیشترین قطر هاله های بازدارندگی فیلم دارای خاصیت ضد میکروبی برای استافیلوکوکوس اورئوس، بر اشریشیاکلی O157:H7 و سالمونلا تیفی موریوم به ترتیب ۱۷/۱۷، ۲۵/۲۰ و ۱۷/۶۲ و ۱۵/۲۰ میلی متر بود. به این معنی که بیشترین اثر ضد میکروبی بر استافیلوکوکوس اورئوس و کمترین آن بر سالمونلا تیفی موریوم بود.

1. *Salmonella enteritidis*
2. *Lactobacillus plantarum*

- [21] Seydim, A.C. and Sarikus, G. 2006. Antimicrobial activity of whey protein based edible films incorporated with oregano, rosemary and garlic essential oils. *Food Res. Int.* 39, 639–644.
- [22] Chen, H. (1995). Functional properties and applications of edible films made of milk proteins. *J. Dairy Sci.*, 78:2563-2585.
- [23] Chen, H. (2002). Formation and Properties of Casein Film and Coating, ch7. In: Protein based edible film & coating, Gennadios, A., (ed). CRC Press.
- [24] Chick, J. and Hernandez, R. J. (2002). Physical, thermal, and barrier characterization of casein- wax- based edible films. *Journal of food science*, 67:1073-1079.
- [25] Khwaldia, K., Perez, C., Banon, S., Desobry, S., and Hardy, J. (2004). Milk proteins for edible film and coatings. *J. Food Science and Nutrition*, 44:239-251
- [26] Longares, A., Monahan, F. J., O'Sullivan, M. (2004). Physical properties and sensory evaluation of WPI films of varying thickness. *J. LWT*, 37:545-550
- [27] Golmakani M. T. and Rezaei, K. (2008). Microwave-assisted hydrodistillation of essential oil from Zataria multiflora Boiss. *Eur. J. Lipid Sci. Technol.*, 110, 448-454.
- [28] Barnon, E.J. and Finegold, S.M. (1990). Method for testing antimicrobial effectiveness. In: Diagnostic Microbiology, 8th Ed. The Moby Company. pp. 172-184.
- [29] Akhondzade Basti, A., Misaghi, D. and Khaschabi, D. (2007). Growth response and modeling of the effects of Zataria multiflora Boiss. Essential oil, pH and temperature on *Salmonella typhimurium* and *Staphylococcus aureus*. *LWT*, 40, 973-981.
- [30] Fazeli, M. R., Amin, GH., Amadian Attari, M. M., Ashtiani, H., Jamifar, H. and Samadi, N. (2007). Antimicrobial activities of Iranian sumac and avishan-e shirazi (Zataria multiflora) against some food borne bacteria. *Food Control*, 18, 646-649.
- [31] Pranato, Y., Salokhe, V.M., and Rakshit, S. K. (2005). Physical and antibacterial properties of alginate- based edible film incorporated with garlic oil. *J. Food research international*, 38: 267-272.
- and Thymus septum essential oils. *J. Fitoterapia*. 73, 244-250.
- [11] Burt, S. A. and Reinders, R.D. (2003). Antibacterial activity of selected plant essential oil against *Escherichia coli* O175:H7. *Lette. appl. Microbial.* 36, 162-167.
- [12] Lanciotti, M. R., Gardini, A., Patrigani, F., Belletti, N., Guerzoni, M. E. and gardini, F. (2004). Use of natural aroma compounds to improve shelf- life and safety of minimally processed fruits. *Trends in Food Sci. Technol.* 15, 201-208.
- [13] Holley, R. A. and Pate, D. (2005). Improvement in shelf life and safety of perishables food by plant essential oils and smoke antimicrobials. *Food Microbial.* 22, 273-292.
- [14] Lee, M. L., Kwon, H. A., Kwon, D. Y., Park, H., Sohn, D. H., Kim, Y. C., Eo, S.K., Kang, H. Y., Kim, S. W. and Lee, J. H. (2006). Antibacterial activity of medicinal herb extracts against salmonella. *Food Microbiol.* 111, 270-275.
- [15] Oussallah, M., Caillet, S., Salmieri, S., Saucier, L., & Lacroix, M. (2004). Antimicrobial and antioxidant effects of milk protein based film containing essential oils for the preservation of whole beef muscle. *Journal of Agriculture and Food Chemistry*, 52, 5598–5605.
- [16] Misaghi A. and Akhondzade Basti, A. (2007). Effect of Zataria multiflora Boiss essential oil and nisin on *Bacillus cereus* ATCC 11778. *Food Cont.* 18, 1043-1049.
- [17] Shafiee, a. and Javidnia, K. (1997). Composition of essential oil of Zataria multiflora. *Plan. Medici.* 65, 371-372.
- [18] Ali, M. S., Saleem, M., Ali, Z. and Ahmad, V. U. (2000). Chemistry of *Zataria multiflora* (Lamiaceae). *Phyt. Chem.* 55:933-936.
- [19] Pranato, Y., Rakshit, S. K. and Salokhe, V.M. (2004). Enhancing antimicrobial activity of chitosan films by incorporating garlic oil, potassium sorbet and misin. *J. LWT*, 38:859-865.
- [20] Pranato, Y., Salokhe, V.M., and Rakshit, S. K. (2005). Physical and antibacterial properties of alginate-based edible film incorporated with garlic oil. *J. Food research international*, 38: 267-272.

Investigation on the antimicrobial effect of caseinate edible film containing the essential oil of *Zataria multiflora*

Boroumand, A. ^{1*}, Hamedi, M. ², Emamjome, Z. ³, Razavi, S. H. ³

1. MSc Graduate in Food science & Engineering, Faculty of Biosystem Engineering the University of Tehran
2. Professor, Department Food science & Engineering, Faculty of Biosystem Engineering the University of Tehran
3. Associate Professor, Department Food science & Engineering, Faculty of Biosystem Engineering the University of Tehran

(Received:88/4/20 Accepted: 88/7/9)

Antimicrobial effect of caseinat edible film containing the essential oil of *Zataria multiflora* Bioss was investigated against tow gram-negative bacteria named *Salmonella typhymurium* (ATCC14028), *Escherichia coli* O157:H7 (ATCC35218) and a gram-positive bacteria *Staphylococcus aureus* (PTCC1431). The Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and Minimum Bactericidal Concentration (MBC) of the tested essential oil were determinate by using a broth dilution susceptibility test at 6 different concentrations (125, 250, 500, 1000, 2000 and 4000 ppm). The essential oil from *Avishan Shirazi* (*Zataria multiflora* Bioss) was most effective against *S. aureus*, the MIC and MBC values in the presence of *E. coli* O157:H7 and *S. typhymurium* were 500 for both of them. The antimicrobial effect of caseinate film was studing using disk diffusion method. Our result showed that the larger inhibitory diameter was belonged to *S. aureus* (mean=25.17mm) mean diameters of inhibitory effect for *S. typhymurium* and *E. coli* O157:H7 were 15.20 and 17.62 mm respectively.

Key words: *Antimicrobial film, Essential oil of Zataria multiflora Bioss, Salmonella typhymurium, Escherichia coli O157:H7 and Staphylococcus aureus*

* Corresponding Author E-Mail address: emamj@ut.ac.ir