

# کاربرد طیف‌سنجی رامان در بررسی غیرمخرب پارامترهای کیفی گوجه فرنگی

علی محمد نیک بخت<sup>۱</sup>، تیمور توکلی هشجین<sup>۲\*</sup>، رسول ملک فر<sup>۳</sup>، برات قبادیان<sup>۲</sup>

۱- دانشجوی دکتری تخصصی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس (هیئت علمی دانشگاه ارومیه)

۲- استاد و دانشیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

۳- دانشیار گروه فیزیک اتمی - مولکولی، دانشگاه تربیت مدرس

(تاریخ دریافت: ۸۷/۷/۳ تاریخ پذیرش: ۸۷/۹/۳)

## چکیده

روشهای غیرمخرب در کشاورزی از این جهت حائز اهمیت می‌باشد که محصول مورد بررسی به چرخه عرضه و مصرف برگشته و نیز مشکلات نمونه‌گیری روشهای مخرب را ندارند. بنابراین مهمترین مساله در کیفیت سنجی روی خط (on/in line) در مقیاس صنعتی این است که نباید هیچ گونه آسیبی به میوه‌جات و سبزیجات وارد شود. کوچکترین آسیب چه مشهود و چه غیرمشهود، باعث بوجود آمدن مشکلاتی در فرآوری، انبارداری و یا گسترش بیماری خواهد شد. در سالهای اخیر پردازش تصویری، روشهای نوری مانند طیف‌بینی رامان، NIR و NMR انتشار صوت، روش فراصوت وغیره، در حال گسترش و توسعه می‌باشد که هر کدام برای اندازه‌گیری سریع، غیرمخرب و دقیق عامل‌های کیفی میوه‌ها از جمله میوه گوجه فرنگی نظیر میزان مواد جامد اغلب آنها مخرب و یا کند می‌باشند ولی اندازه‌گیری سریع، غیرمخرب و دقیق عامل‌های کیفی میوه‌ها روش رامان برای اندازه‌گیری غیرمخرب این خصوصیات در گوجه‌فرنگی محلول، pH و رنگ از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. برای همین منظور از روش رامان برای اندازه‌گیری غیرمخرب این خصوصیات در گوجه‌فرنگی استفاده شد. قندهای موجود در گوجه‌فرنگی نیز در آزمایش HPLC بررسی شدند و طیف‌گیری از این قندها توسط دستگاه رامان انجام شد. نتایج حاصل حاکی از اینست که طیف‌های بدست آمده از پراکنده‌گیری رامان می‌توانند نوارهای بسیار مهمی را بروز دهند. این نوارها را می‌توان به ارتعاش‌های v<sub>1</sub> و v<sub>2</sub> و v<sub>3</sub> کارتوئیدهای  $\alpha$ -carotene و  $\beta$ -carotene نسبت داد که به دلیل ارتعاشات کشنشی کربن - کربن (C-C و C=C) در زنجیره اصلی بوجود می‌آیند و بیانگر رنگ میوه می‌باشند. همچنین با مقایسه طیف‌های قند خالص و طیف‌های گرفته شده از میوه به صورت غیرمخرب می‌توان اثر انگشت‌های طیفی مربوط به قندها را نیز در محدوده طیفی  $3000\text{ cm}^{-1}$  و  $2300\text{ cm}^{-1}$  کاوش نمود. بطور کلی می‌توان طیف‌سنجی رامان را به عنوان روشی مطمئن، سریع و کارا در اندازه‌گیری عامل‌های کیفی میوه‌ها اعم از خصوصیات داخلی (قنده) و خارجی (رنگ) پیشنهاد نمود.

کلیدواژگان: طیف‌سنجی رامان، گوجه‌فرنگی، ارزیابی غیرمخرب، عامل‌های کیفی

\*مسئول مکاتبات: ttavakoli@modares.ac.ir

## 1 - مقدمه

محصول تغییر می کند، می توان از طیف سنجی های مختلف برای اندازه گیری برخی خواص مختلف از جمله رنگ آنها استفاده نمود [1]. این روش به همراه روش های دیگر در دو دهه اخیر، مبنای آزمایش های غیر مخرب جهت تعیین و اندازه گیری عامل های کیفی محصولات کشاورزی بوده و اهمیت بالایی را از نظر زمینه های تحقیقی کسب کرده اند.

در بین روش های یاد شده در جدول 1، طیف سنجی لیزری پراکنده گی رامان جذابیت فوق العاده ای در میان محققان علوم پزشکی، دارویی و علوم زیستی پیدا نموده است، بطوریکه قویترین روش از بین روش های فوق قلمداد می شود [2و 4]. وقتی نور فروندی (که در رامان یک نوع لیزر می باشد) با یک مولکول دو ارتعاش کننده وارد برهم کنش می گردد، مدل کلاسیک پیدایه پراکنده گی را می توان با استفاده از ممان دوقطبی القایی نشان داد [5]:

$$P = a_0 E_0 \cos 2p\eta t + \frac{1}{2} \left( \frac{\partial a}{\partial q} \right) q_0 E_0 [\cos \{2p(n_0 + n_m)t\} + \cos \{2p(n_0 - n_m)t\}] \quad (1)$$

که در آن،  $P$  ممان دو قطبی القایی،  $\eta$  قطبش پذیری مولکول مرتיעش نشده، میدان الکتریکی، تغییرات قطبش پذیری نسبت به فاصله دو اتم، دامنه ارتعاش، فرکانس نور فروندی، فرکانس مولکول و  $t$  زمان است. معادله 1 نشان می دهد موقعی که موج نوری با یک مولکول دو اتمی ارتعاش کننده برهم کنش می کند، ممان دوقطبی القایی ( $P$ ) دارای سه جزء وابسته به زمان شامل پراکنده گی رایلی، رامان استوکس و آنتی استوکس می باشد [5]. در این تحقیق از جزء رامان استوکس جهت کاوش خصوصیات مولکولی استفاده شده است.

طیف سنجی پراکنده گی رامان نسبت به طیف سنجی رایج IR (که کاربردهای وسیعی در کشاورزی پیدا کرده است) مزایای برجسته ای دارد از آن جمله:

- پیدایه رامان تکنیکی ایده آل برای مطالعات بیولوژیکی است، چراکه آب یک پخش کننده رامان ضعیف به شمار می رود و در نتیجه تأثیر آن در ایجاد خطای سیار اندک است. این مسئله به خصوص در مورد محصولات کشاورزی که بخش اعظمی از مواد آنها را آب تشکیل می دهد، اهمیت ویژه ای پیدا می کند (برای مثال بیش از 90% از جرم گوجه فرنگی را آب تشکیل می دهد).

- رامان می تواند محدوده وسیعی از نواحی طیفی را ( $10 \text{ cm}^{-1}$  تا  $4000 \text{ cm}^{-1}$ ) در یک بار ثبت طیفی پوشش دهد. این در حالیست که

اندازه گیری پارامترهای کیفی و کمی در محصولات کشاورزی به صورتی که میوه یا محصول مورد نظر هیچ گونه آسیبی ندیده و دوباره به چرخه مصرف برگردد، را آزمون غیر مخرب گویند [1].

آزمایش هایی غیر مخرب محسوب می شوند که اثرات مخرب فتو فیزیکی، حرارتی، شیمیایی، مکانیکی و فتو شیمیایی نداشته باشند [2]. روش های متعددی تاکنون برای کیفیت سنجی غیر مخرب محصولات کشاورزی ابداع شده اند که تنها برخی از آنها توانسته شرایط فوق را برآورده ساخته و از لحاظ فنی و صنعتی توجیه داشته باشند (جدول 1).

جدول 1 روش های مختلف اندازه گیری غیر مخرب پارامترهای کیفی

### محصولات کشاورزی [3]

| مبانی فیزیکی          | روش اندازه گیری  | خصوصیات قابل اندازه گیری             | نوری        | پردازش و تحلیل |
|-----------------------|--|--------------------------------------|-------------|----------------|
| طیف سنجی              | رنگ، عیوب ظاهری  | اندازه، شکل، رنگ، عیوب ظاهری         | تصویر       |                |
| عبوری، بازتابی و جذبی | رنگ، عیوب داخلی، قند، اسیدیته، SSC                         |                                      |             |                |
| طیف سنجی              | عيوب ظاهری، سفتی   |                                      |             |                |
| لیزری                 |  |                                      |             |                |
| X                     | اعشه X   | حفره های داخلی، ساختار و درجه رسیدگی |             |                |
| اصعدی                 | سفتی، رسیدگی، ویسکوالاستیزیته                              |                                      |             |                |
| مکانیکی               | سفتی، رسیدگی، ویسکوالاستیزیته، حفره های داخلی، قند و چگالی |                                      |             |                |
| صوتی و فرaco          | صوتی و فرaco   | حفره های داخلی، ساختار و درجه رسیدگی |             |                |
| NMR و MRI             | NMR و MRI  | روطیت، قند، حفره های داخلی           | کترومغناطیس |                |

روش های نوری، مکانیکی، شیمیایی و امواج الکترومغناطیسی و صوتی در توسعه آزمون های غیر مخرب نقش اساس داشته اند. اما روش های به کار رفته قادرند پارامترهای محدودی از میوه ها را کاوش کنند. بنابراین، لازم است شرایط حاکم در این روشنها به دقت بررسی شده و در گزارش یا ثبت نتایج آزمایش لحاظ شوند. استفاده از تابش های منعکس شده، عبوری و پراکنده شده به منظور اندازه گیری خواص داخلی و خارجی میوه جات از دیر باز مطرح بوده است. به تازگی طبقه بندی میوه ها و برخی سبزیجات بر حسب رنگ آنها رواج پیدا کرده است و چون با تغییر رنگ قابلیت بازتابش و عبوردهی نور از یک

فن آوری حتی در سازمان ناسا نیز برای تشخیص مواد در مریخ و ماه استفاده می شود [10]. حتی طیف‌سنج‌های دستی رامان به مرحله تولید صنعتی رسیده‌اند و استفاده می‌شوند [10].

میوه گوجه‌فرنگی (*Lycopersicon esculentum* L.) (منبع غنی از آنتی‌اکسیدان، ویتامین‌ها و ترکیبات غذایی می‌باشد [11] و تشخیص و بررسی دقیق میزان این ترکیبات در ارزیابی کیفی محصول عرضه شده به بازار نقش عمده‌ای دارد [12]. از طرفی ارزیابی معمول این خصوصیات در آزمایشگاه مخبر بوده و میوه مورد آزمایش از بین می‌رود. همچنین روشهای آزمایشگاهی مرسوم بسیار وقت‌گیر بوده و علاوه بر آن، به واسنجی و اندازه‌گیری‌های متعدد نیازمند است. طیف‌سنجی پراکنده‌گی رامان به عنوان یک تکنیک رو به رشد و قادرمند می‌تواند گزینه مناسبی برای آزمون غیر مخبر خصوصیات کیفی محصول از جمله میزان قند، pH و رنگ باشد. میزان قند محلول و اسیدیته مشخصه‌های مهمی برای ارزیابی رسیدگی و کیفیت میوه‌ها به شمار می‌رود. مهمترین ویژگی ظاهری رسیدگی گوجه‌فرنگی رنگ می‌باشد که فاکتور مهمی در تصمیم گیری مشتری برای خرید آن است. درجه رسیدگی نیز معمولاً با استفاده از چارت‌های رنگی تعیین می‌شود [13]. لازم به ذکر می‌باشد که تا حال اندازه‌گیری بیش از یک عامل کیفی با استفاده از روشهای طیف‌سنجی به دلیل پیچیدگی تفسیر و حجم زیاد متغیرها انجام نشده‌است. همچنین استفاده از پراکنده‌گی رامان در اندازه‌گیری خصوصیات کیفی گوجه‌فرنگی و بخصوص رنگ و قند در منابع گزارش نشده‌است. هدف از این تحقیق بررسی طیف‌سنجی رامان در کاوش عاملهای کیفی گوجه‌فرنگی و پتانسیل سنجی کاربرد آن در تشخیص غیر مخبر این عامل‌ها می‌باشد.

## 2- مواد و روشهای

دستگاه طیف‌سنج Thermo Nicolet از نوع پاشنده (dispersive) برای بدست‌آوردن طیف‌های رامان مورد استفاده قرار گرفت. لیزر 532 نانومتر با توان حدکثر 100 میلی‌وات به عنوان منبع نوری برکار گرفته شد اما به دلیل جلوگیری از اثرات فتوشیمیایی و فتوفیزیکی نور تک فام لیزر، به صورت نرم افزاری از توان منع نوری کاسته شد و در تمام آزمایش‌ها از توان 30 میلی‌وات استفاده شد. وضوح طیف‌های گرفته شده  $2 \text{ cm}^{-1}$  بوده که در طیف‌سنجی یک وضوح ایده‌آل به شمار می‌رود، و پهنای نوار علامت‌های گرفته شده بین عدد موجه‌ای  $\text{cm}^{-1}$

برای پوشش جنین محدوده‌ای با تکنیک IR به شبکه‌های پخش کننده، صافی‌ها و آشکارسازهای متنوعی نیاز هست و باید برای هر محدوده این تجهیزات را تغییر داد [6].

- قطر اشعه لیزری که به عنوان منبع نوردهی در دستگاه طیف‌سنج رامان استفاده می‌شود، در حدود  $0/2$  تا  $2$  میلی‌متر است. به عبارت دیگر می‌توان با نمونه‌های بسیار ریز و با حجم کم هم کار کرد و یا مناطق کوچک روی میوه را هم کاوش نمود [7]. علاوه بر آن، حساسیت بالا، زمان کوتاه آزمایش، عدم نیاز به آماده‌سازی نمونه و غیر مخبر بودن این تکنیک، مزایای دیگری هستند که بر جذابیت استفاده از طیف‌سنجی پراکنده‌گی رامان افزوده‌اند [7]. با این توصیف تکنیک رامان، روشنی رو به رشد است و هر روز بعد جدیدی از کاربردهای آن برای محققان روشن می‌شود [5].


در حیطه کاربرد طیف‌سنجی در ارزیابی مواد کشاورزی تحقیقات فراوانی بویژه با تکنیک IR انجام گرفته است، اما کاربرد روش رامان در ارزیابی غیر مخبر محصولات کشاورزی، زمینه نوینی است که همچنان رو به رشد می‌باشد. با استفاده از تصاویر طیفی (396 تا 736 نانومتر) درجه رسیدگی گوجه‌فرنگی در مراحل مختلف مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج حاکی از آنست که روش مذکور در مقایسه با تصاویر RGB<sup>1</sup> (نوعی از تصویر دیجیتال که در آن مقادیر پیکسل‌ها شدت‌های سه رنگ قرمز، سبز و آبی تصویر می‌باشند) نتیجه مطلوب‌تری را ارائه می‌دهد [8]. لهیدگی میوه سبب با طیف‌سنجی پراکنده‌گی رامان، در تحقیقی به صورت غیر مخبر اندازه‌گیری شده است. در این تحقیق سبب‌ها از ارتفاع معینی سقوط داده شدن تا لهیدگی ظاهر شود، سپس با استفاده از دستگاه رامان Thermo Nicolet، طیف‌های بدست آمده مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بررسی مطلوب گزارش شده است [9]. از طیف‌های رامان برای تشخیص میزان آفت‌کش‌ها بر روی سطح ظاهری میوه‌ها استفاده شده است. در این کار دو نوع لیزر در طول موج‌های مختلف بکار برده شد و تأثیر آنها در کاوش میزان آلدگی سطحی میوه بررسی شد. لیزر با طول موج 1064 nm نتیجه قابل قبولی ارائه کرد [7]. استفاده از رامان در پژوهشی به مراتب از کشاورزی وسیع‌تر بوده است بطوریکه موسسات علمی و آزمایشگاه‌های تشخیص دارویی بسیاری در حال استفاده از فن آوری پدیده رامان در تشخیص لوازم دارویی و بهداشتی می‌باشند. این

1. Red-Green-Blue

شده. تزریق استانداردها در غلظتهای ppm 2000 تا 10000، انجام شد و سطح زیر پیکهای مربوطه به عنوان شاخص اصلی محاسبه گردید. منحنی استاندارد بر اساس این مقدار برای غلظتهای مختلف رسم شد و در نهایت نمونه‌های تهیه شده در سه تکرار به دستگاه HPLC تزریق شد و با توجه به زمان بازداری، سطح زیر پیک هر قند، نوع و غلظت هر کدام تعیین گردید.

### 3-نتایج و بحث

مطابق تحقیقات قبلی که توسط طیف‌سنجی رزونانسی رامان (RRS<sup>1</sup>) بر روی کارتونیدهای برنخی محصولات کشاورزی انجام شده است، این نوارها را می‌توان به ارتعاش‌های  $\nu_1$ ,  $\nu_2$  و  $\nu_3$  کارتونیدهای  $\alpha$ -کربن - کربن - کربن (C-C و C=C) در زنجیره اصلی بوجود می‌آیند [14]. به طور کلی طیف‌های ارتعاشی کارتونیدها سه منطقه مشخصه ارتعاش‌های کششی C-C را دارا هستند. همانطور که در شکل‌های 1 و 2 دیده می‌شود، نوارهای اصلی هر سه منطقه در محدوده عدد موجه‌ای 1030، 1080 و 1540 در تمامی طیف‌ها ظهر کرده است. از طرفی میوه گوجه فرنگی قرمز معمولی حاوی lycopene و  $\beta$ -carotene و  $\gamma$ -carotene می‌باشد [15].




شکل 1 طیف‌های رامان در گوجه‌فرنگی، میوه در مرحله رسیدگی قرمز شدن (صورتی)

1. Resonance Raman Spectroscopy


400 و  $4000\text{ cm}^{-1}$  انتخاب شد که در محدوده مادون قمز قرار گرفته و بهترین گستره جهت نمایش ترکیبات مولکولی می‌باشد. آب میوه نمونه‌های مورد آزمایش پس از انجام آزمایش‌های نوری به آزمایشگاه صنایع غذایی منتقل شده و آزمون‌های pH، قند محلول و رنگ بر Metrohm (827 pH Lab, UK) روی آنها انجام شد. از دستگاه HPLC برای اندازه‌گیری pH نمونه‌ها و از رفرکتومتر DR-ATAGO مدل-A1(ATAGO, CO. Ltd. Japan) برای اندازه‌گیری میزان مواد جامد محلول به صورت Brix استفاده شد. تجزیه و تحلیل طیف‌های بدست آمده ابتدا در نرمافزار OMNIC NICOLET انجام شد که به صورت بسته نرمافزاری در کنار دستگاه طیفسنج قرار دارد و سپس Matlab طیف‌ها به صورت عالائم یکبعدی وارد محیط Excel شده و مورد پردازش قرار گرفتند. بدین ترتیب پیش‌زمینه فلورسانسی که به عنوان مهمترین مشکل پردازشی مطرح می‌باشد، حذف شد. همچنین جهت یافتن نوارهای مهم و تعیین کننده، مشتق گیری طیف‌ها انجام شد. در نهایت اشکال بخش نتایج به صورت واضح توانستند نوارهای موثر و مهم تعیین کننده خصوصیات داخلی میوه را بروز دهند.

برای هر 100 گرم میوه گوجه فرنگی، منابع صنایع غذایی ترکیبات مختلفی را گزارش نموده‌اند که البته تفاوت چندانی با همدیگر نداشته و می‌توان به طور تقریبی از آنها استفاده نمود. بر این اساس، باید در میوه مورد نظر و طیف‌های گرفته شده، در جستجوی نوارهای مربوط به کربوهیدرات‌ها (که در گوجه‌فرنگی همان قندها گزارش شده است) نیز بود. از این‌رو در یک آزمایش جداگانه، با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) میزان این قندها (فروکتوز، ساکاروز، گلوكوز) تعیین شدند. با توجه به حساسیت این روش و به منظور به حداقل رساندن خطأ در اندازه گیری نمونه‌ها، باید نمونه تا حد ممکن شفاف باشد. به این منظور جهت حذف ذرات معلق، ابتدا SIGMA 4 K 15 مدل در مدل 1000 rpm سانتریفیوز شد. پس از سانتریفیوز، نمونه‌ها در دو مرحله کاملاً صاف شده و در نهایت 20 میکرونیتر از این نمونه صاف شده به دستگاه HPLC (WATERS 600, E USA) میکروولیتر از این نمونه ستون (WATERS 600, E USA) Bondapack<sup>TM</sup> C18 (250mm×4.6 mm) تزریق شد. حلال استونیتریل/آب (25-75) و سرعت جریان 1 میلی لیتر بر دقیقه به عنوان فاز متحرك استفاده شد. عمل جداسازی در دمای اتاق و با آشکارساز RI (Refractive Index) از شرکت WATERS انجام

نتایج حاصل از آزمایش HPLC نشان داد که عمدۀ ترکیبات قندی در میوه گوجه فرنگی مربوط است به گلوکز و فروکتوز، بطوریکه در هر 100 گرم میوه کامل به طور متوسط 3 تا 4 گرم گلوکز و فروکتوز (به صورت مجموع) وجود دارد، به منظور یافتن اثر انگشت‌های طیفی مربوط به این ترکیبات، استانداردهای تهیه شده با غلظت‌های 2000، 10000، 8000، 6000، 4000 ppm از هر سه قند مورد آزمایش طیف‌سنجی به صورت خالص قرار گرفتند. در نهایت طیف‌های بدست آمده مطابق شکل 4 (به عنوان نمونه) مورد بررسی قرار گرفتند.




شکل 4 طیف رامان بدست آمده از فروکتوز و گلوکز با غلظت 2000 ppm این طیف‌ها اطلاعات بسیار مفیدی در اختیار گذاشت. با مقایسه این طیف‌ها و طیف‌های گرفته شده از میوه به صورت غیرمخرب (شکل‌های 1 و 2)، می‌توان اثر انگشت‌های طیفی مربوط به قندها را نیز در طیف‌ها پیدا کرد. از جمله در محدوده طیفی  $3000\text{ cm}^{-1}$  و  $2300\text{ cm}^{-1}$  می‌توان باند‌های مربوط به قندها را نیز کاوش نمود. موقعیت




شکل 2 میوه کاملاً رسیده، ارتفاع پیک‌های مربوط به کارتنتوئیدها قابل توجه است

در شکل 3 مشاهده می‌شود که عدد موج  $\nu_1$  در کارتنتوئیدها با افزایش تعداد پیوندهای دوگانه  $\text{C}=\text{C}$  در زنجیره اصلی این ترکیبات (N) کاهش می‌یابد که این کاهش سیر نسبتاً خطی نیز دارد [14]. این راهنمای خوبی است برای کاوش موقعیت باند‌های مربوط به کارتنتوئیدها در این تحقیق. چراکه مطابق رسم تحقیقات طیف‌سنجی یا باید از آزمایش استانداردهای موجود با استفاده از روش‌های تجزیه دستگاهی و سپس بررسی طیفی این استانداردها به موقعیت باند‌ها پس برد، و یا اینکه از روش‌های دیگر از جمله پایگاه طیفی بهره جست. از طرفی می‌دانیم که لیکوپن در زنجیره اصلی خود حاوی تعداد بیشتری پیوندهای دوگانه کربن می‌باشد تا کاروتون‌ها. بنابراین بررسی دقیق تر نوار  $\nu_1$  در  $1540\text{ cm}^{-1}$ ، حضور کاروتون‌ها را بیشتر توجیه می‌کند تا لیکوپن، در حالیکه  $\nu_2$  در  $1180\text{ cm}^{-1}$  (C-C) یا  $2949\text{ cm}^{-1}$  (C-CH<sub>3</sub>) نسبت داده شده است [3].




شکل 3 رابطه بین موقعیت عدد موج و تعداد پیوندهای دوگانه  $\text{C}=\text{C}$  در زنجیره اصلی کارتنتوئیدها



شکل 6 مقایسه کمی دو میوه نیمه رسیده (a) و بیش رسیده (b). اختلاف شدت باندها بعد از نرمالیزاسیون داده‌ها کاملاً مشهود است به طور مثال شدت باند اول در میوه نیمه رسیده 0/00178 و در میوه بیش رسیده 0/00226 می باشد (اعداد نشان داده شده بعد از اعمال نرمالیزاسیون بوده و بنابراین مقدارشان کاهش یافته است). با جمع‌بندی دلایل فوق، طیف‌سنجی رامان روش مناسبی است برای اندازه‌گیری کمی و کیفی رنگ موادی که حاوی رنگدانه‌های از جنس کارتینوئیدها می‌باشند. بنابراین به طور قطع می‌توان از این روش جدید در حوزه تشخیص رنگ مواد به صورت غیرمخرب بهره برد. اساساً به همین جهت است که روش طیف‌سنجی رامان در بسیاری از تحقیقات مربوط به رنگدانه‌ها حتی در مباحث غیر کشاورزی مانند نقاشی‌های هنری و پژوهشکی گزارش شده است [16]. نکته قابل توجه دیگر این است که طیف‌های گرفته شده روی گوجه فرنگی و متعاقباً باندهای مربوط به کارتینوئیدها که نمایانگر رنگ در محصول می‌باشند، در توان‌های بالای

باند اول و دوم تفاوت معنی‌داری در طیف‌های بدست آمده از دو نوع قند نشان ندادند.

باند  $891\text{ cm}^{-1}$  که در شکل 5 ظاهر شده است، را می‌توان به ارتعاش CH نسبت داد که می‌بین کربوهیدرات‌های موجود در میوه می‌باشد [4]. همانطور که ملاحظه شد، این باند ضعیف بوده و در شکل 1 به طور واضح قابل تشخیص نمی‌باشد (هرچند در تحلیل سیگنالی طیف با استفاده از مشتق‌گیری ظاهر می‌شود) و دلیل آن هم وجود باند قویتر در محدوده کارتینوئیدهاست ( $1030\text{ cm}^{-1}$ ) که باندهای مجاور را پوششی می‌دهد. اما احتمالاً می‌توان از همین طیف ضعیف نیز برای اندازه‌گیری مواد کربوهیدراتی بهره جست.



شکل 5 طیف رامان در گوجه‌فرنگی کاملاً رسیده. در این طیف علاوه بر طیف‌های قوی مربوط به رنگدانه‌های لیکوپین و کاروتین، پیک متوسطی از کربوهیدرات‌ها هم قابل مشاهده می‌باشد

### 3-1-قابلیت تحلیل کمی

نکته دیگر در مورد طیف‌ها اختلاف قابل توجه در شدت باندهاست که عمدتاً مربوط به میزان رسیدگی میوه و در نتیجه مقدار کمی رنگدانه هاست. البته این مقایسه کمی بعد از تغییرات گوناگون و پردازش سیگنال‌های طیفی صورت گرفته است. نرمالیزاسیون طیفی با استفاده از روش تقسیم شدت باندها به 1-norm انجام گرفت تا اثرات مختلف آزمایش و دستگاه که عمدتاً در شدت پیک‌ها ظاهر می‌شود، از میان رفته و بتوان تحلیل کمی نیز انجام داد (شکل 6). بدیهی است که غلظت کارتینوئیدها می‌باشد در شدت پراکنده‌گری رامان اثرگذار باشد، این نکته را به وضوح می‌توان در شکل 5 مشاهده نمود.

به طور کلی محصولات کشاورزی و در نهایت سود اقتصادی بیشتر می‌باشد.

لیزر تغییر قابل توجهی نکرده و بنابراین انتخاب پایین‌ترین توان لیزر مطلوب به نظر می‌رسید.

## 6- منابع

- [1] Tavakoli Hashtjin, T. (1382). Mechanics of Agricultural Products. Translation. Khadamate Farhangie Salekan. Tehran, Iran. Pp: 528.
- [2] Schrader, B., Klumpb, H.H., Schenzelc, K. and Schulz, H. (1999a). Non-destructive NIR FT Raman analysis of plants. Journal of Molecular Structure, 509: 201–212.
- [3] Schulz, H. and Baranska, M. (2007). Identification and quantification of valuable plant substances by IR and Raman spectroscopy. Vibrational Spectroscopy, 43: 13-25.
- [4] Edwards, H.G.M., Munshi, T. and Anstis, M. (2005). Raman spectroscopic characterisations and analytical discrimination between caffeine and demethylated analogues of pharmaceutical relevance. Spectrochimica Acta, Part A, 61: 1453–1459.
- [5] Lewis, I.R. and Edwards, H.G.M. (2001). Handbook of raman spectroscopy, from the research laboratory to the process line. Marcel Dekker, Inc. USA.
- [6] Ghiamati Yazdi, E. (1379). Biochemical Applications of Raman and Resonance Raman Spectroscopies. Translation. Mashhad, Iran. Pp: 251.
- [7] Zhang, P.X., Zhou, X., Cheng, A.Y.S. and Fang, Y. (2006). Raman spectra from pesticides on the surface of fruits. Journal of Physics: Conference Series, 28: 7-11.
- [8] Polder, G., VanDerHeijden, G.W.A.M and Young, I.T. (2002). Spectral image analysis for measuring ripeness of tomatoes. Transactions of the ASAE, 45(4): 1155-1161.
- [9] Gao, X., Heinemann, P.H. and Irudayaraj, J. (2003). Non-destructive apple bruise on-line test and classification with raman spectroscopy. American Society of Agricultural and Biological Engineers, ASAE Annual Meeting, St. Joseph, Michigan. Paper No: 033025.
- [10] Anonymous. (2006). Raman spectroscopy: a complex technology moving from lab to the clinic ? and before too long, the marketplace. Available on-line at: <http://www.opticsreport.com/content/>

لازم به توضیح است که واسنجی و اعمال روش‌های مدرن شیمی‌سنگی (chemometrics) بر روی طیف‌های بدست‌آمده و در نتیجه اندازه‌گیری کمی و مدل‌سازی داده‌ها مورد تحقیق بوده و نتایج آن در آینده نزدیک ارائه می‌گردد. بدیهی است که با اعمال چنین روش‌هایی می‌توان با در دست داشتن باندهای ارتعاشی حتی ضعیف‌تر از باندهای مذکور به مقایسه کمی و کیفی میوه‌ها و به طور کلی محصولات کشاورزی اقدام نموده و در نهایت با روشی غیر مخرب، سریع و مطمئن میوه‌ها را درجه‌بناری نمود.

## 4- نتیجه‌گیری

جدول 1 نشانگر جایگاه هرکدام از روش‌های مورد بحث و پارامترهای کیفی قابل اندازه‌گیری توسط هرکدام از آنها را نمایش می‌دهد. طیف‌سنگی رامان به عنوان روشی کارا و سریع و با ملاحظه برتریهای آن نسبت به روش‌های دیگر غیر مخرب می‌تواند ابزاری سودمند در اندازه‌گیری غیر مخرب پارامترهای کیفی محصولات کشاورزی محسوب شود. تجزیه و تحلیل طیف‌های بدست آمده در این تحقیق و مقایسه با تحقیقات پیشین، نشان داد که طیف‌سنگی رامان می‌تواند به خوبی جهت بررسی کیفی پارامترهای میوه گوجه‌فرنگی استفاده شود. هر سه منطقه مشخصه کارتونیدها به عنوان شاخصه‌های رنگی در میوه‌جات در طیف‌های بدست آمده به طور واضح نشان داده شد و همچنین آزمایشات انجام شده توانست ثابت کند که میزان مواد جامد محلول و کربوهیدرات‌های موجود را نیز می‌توان اندازه‌گیری نمود.

## 5- پیشنهادها

نتایج حاصله در این تحقیق به خوبی نشان داد که با اعمال روش‌های پردازشی علاطم طیفی و نیز اعمال شیمی‌سنگی به طور یقین قادر خواهیم بود اندازه‌گیری‌های کیفی و کمی ترکیبات داخلی محصولات کشاورزی را در سریعترین زمان و بدون تخریب میوه انجام داد. این روند در ادامه تحقیق مورد بحث بوده و امید است نتایج آن در آینده نزدیک ارائه گردد. بدیهی است که توسعه چنین روشی به ویژه در حوزه ساخت افزاری گام بزرگی در جهت بهینه کردن کیفی میوه‌جات و

- Raman spectra of carotenoids in natural products. Spectrochimica Acta, Part A, 59: 2207\_ 2212.
- [15]Schulz, H., Schutze, W. and Baranska, M. (2006). Fast determination of cartenoids in tomatoes and tomato products by raman spectroscopy. ISHS Acta Horticulture, 712. IV International Conference on managing Quality in Chains.
- [16]Petricch, W. (2001). Mid-infrared and raman spectroscopy for medical diagnostics. Applied Spectroscopy Review, 36 (2-3): 181-237.
- [11]Anonymous (1999). Tomatoes: *Licopersicon esculentum*. USDA nutrient database for standard reference, release 13.
- [12]Lai, A., Santangelo, E., Soressi, G.P. and Fantoni, R. (2007). Analysis of the main secondary metabolites produced in tomato (*Lycopersicon esculentum*, Mill) epicarp tissue during fruit ripening using floroucence techniques. Postharvest Biology and Technology, 43: 335-342.
- [13]Camelo, A.F.L. and Gomez, P.A. (2004). Comparison of color indexes for tomato ripening. Horticultura Brasileira, Brasília,22 (3):534-537.
- [14]Withnall, R., Chowdhry, B.Z., Silver, J., Edwards, H.G.M. and de Oliveira, L.F.C. (2003).

## Application of Raman Spectroscopy for Non-Destructive Determination of Qualitative Parameters of Tomato

Nikbakht, A.M.<sup>1</sup>, Tavakoli Hashjin, T.<sup>2\*</sup>, Malekfar, R.<sup>3</sup>, Ghobadian, B.<sup>4</sup>

1- PhD student, Department of Farm Machinery Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. (Staff Member of Urmia University)

2- Professor, Department of Farm Machinery Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

3- Associate Professor, Department of Atomic and Molecular Physics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

4- Associate Professor, Department of Farm Machinery Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

(Received: 87/7/3 Accepted: 87/9/3)

Non-destructive methods yield a great deal of importance in agriculture since the tested product can return to the market process, together with simplicity compared to destructive ones. Therefore, the major challenge in industrial on/in line quality evaluation is to eliminate damages in fruits and vegetables. Every visible or invisible damage can be followed by problems in storage, processing and diseases. During recent years, machine vision, optical techniques such as Raman, NIR, NMR spectroscopies, acoustics and ultrasonic techniques are the main methods which have gained worldwide attention. In order to sort and grade fruits, several methods are implemented which are mostly slow, time consuming, and destructive. Yet, a rapid, non-destructive and precise measurement of qualitative factors including pH, SSC and color in tomato fruit yields a great deal of importance. For such a purpose, Raman spectroscopy is implemented to measure qualitative parameters in tomato non-destructively. Sugar components in tomato were investigated with HPLC test and spectroscopy was conducted on pure sugars. Results showed that Raman spectra highlight the major bands related to the fruit components. Lycopene and Carotene as the major carotenoids in tomato fruit were detected explicitly through the spectra, in the way that all the three characteristic regions indexing such pigments (C-C and C=C stretching vibrations) are peaked as strong bands. Also carbohydrates could be shown by a medium band assigned to C-H vibration together with strong bands in  $2300\text{ cm}^{-1}$  –  $3000\text{ cm}^{-1}$  range. Thus it can be concluded that the technique is capable enough to be used in recognizing non-destructively both the external factors (e.g. color) and internal parameters (e.g. SSC) in tomato fruit.

**Keywords:** Raman Spectroscopy, Tomato Fruit, Non-Destructive Tests, Qualitative Parameters

---

\* Corresponding Author E-Mail address: [ttavakoli@modares.ac.ir](mailto:ttavakoli@modares.ac.ir)