

بررسی مقایسه‌ای اثر عصاره‌های میوه در خت کاج و آنتی بیوتیک‌های انتخابی بر تعدادی از میکروارگانیسم‌های شاخص عفونت و مسمومیت غذایی در شرایط آزمایشگاهی

هانیه کاشانی^۱، فریده طباطبایی یزدی^{۲*}، سید علی مرتضوی^۲، فخری شهیدی^۲

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

۲- استاد و عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

(تاریخ دریافت: ۹۳/۶/۲۸ تاریخ پذیرش: ۹۳/۹/۲۴)

چکیده

افزایش روز افزون مقاومت دارویی نسبت به آنتی بیوتیک‌ها و حساسیت به ترکیبات شیمیایی ضد میکروبی از جمله دلایل توجه محققین به کشف مواد ضد میکروبی جدید و با منشا گیاهی می‌باشد. در این مطالعه اثر ضد میکروبی عصاره‌های آبی و اتانولی میوه درخت کاج تهران بر تعدادی از باکتری‌های عامل عفونت و مسمومیت غذایی در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. اثر ضد میکروبی عصاره‌ها با استفاده از روش انتشار دیسک در آگار و تعیین حداقل غلظت مهارکننده از رشد میکروب‌ها (MIC) و حداقل غلظت کشنندگی باکتریایی (MBC) با استفاده از روش رقت لوله ای انجام گردید. مقایسه اثر ضد میکروبی عصاره‌های آبی و اتانولی این گیاه نشان داد که بر باکتری‌های گرم مثبت اثر بهتری نسبت به گرم منفی‌ها دارد. به صورتی که بیشترین هاله ممانعت از رشد مربوط به عصاره اتانولی میوه درخت کاج تهران بر روی سوش استافیلیوکوکوس اورئوس بود که معادل $17/5 \pm 0/14$ محسوبه گردید. از میان دو سوش گرم منفی نیز باکتری اشرشیاکلی به عنوان مقاوم ترین باکتری در مقابل عصاره‌های آبی و اتانولی این میوه بود. با توجه به نتایج حاصل، گیاه مذکور تا حدی دارای اثرات ضد باکتریایی می‌باشد.

کلید واژگان: میوه درخت کاج تهران، اثر ضد باکتریایی، استخراج

* مسئول مکاتبات: tabatabai@um.ac.ir

برای درمان سرطان معده و نیز به عنوان یک ماده محرك سیستم ایمنی در افراد مبتلا به لوسومی و نیز یک ماده ضد تومور استفاده می شده است، علاوه بر این مخروط کاج برخی از گونه های کاج برای سال های بسیاری در درمان بیماری هایی نظیر آسم، برونشیت، سرفه و بیماری های دیگر در طب سنتی چین استفاده می شده است [۸]. مخروط درخت کاج دارای انواع ترکیبات فعال نظیر پلی ساکارید ها، تانن ها، لیگنین ها و انواع مختلفی از ترکیبات فنلی و ترپنئیدی می باشد.

آثار و همکاران (۱۳۸۴) اثر ضد میکروبی صمغ درخت کاج تهران (*Pinus elderica*) و عصاره الکلی آن را بر روی تعدادی از باکتری های مولد عفونت پوستی از جمله مورد مطالعه قرار دادند و اثرات مهاری آن را با آنتی بیوتیک کوتريموکسازول مقایسه کردند، نتایج نشان داد که صمغ درخت کاج تهران دارای خاصیت ضد میکروبی قوی می باشد که می تواند بر روی رشد با کوتريموکسازول رقابت کند و احتمالا بر روی سوش های مقاوم در برابر کوتريموکسازول موثر است [۹].

کمپلکس های لیگنین - کربو هیدرات از جمله ترکیبات مهم موجود در مخروط کاج به حساب می آیند در مطالعه ای که ساکاگامی و همکاران (۲۰۱۰) بر روی این ترکیبات انجام دادند مشخص شد این ترکیبات فعالیت ضد ویروس HIV مقایسه نشان می دهد، همچنین با مهار فعالیت آنزیم RNA پلی مراز ویروس آنفلوآنزا از تشکیل پلاک این ویروس ممانعت می کند، علاوه بر این، این ترکیبات از تکثیر ویروس HSV نیز جلوگیری می کنند [۱۰].

تا کنون مطالعات بسیاری در زمینه اثر ضد میکروبی عصاره های گیاهی بر روی میکروب های بیماریزا صورت گرفته است اما تحقیقات زیادی بر روی اثر ضد میکروبی میوه مخروطی شکل درخت کاج تهران انجام نشده است. بنابراین هدف از این پژوهش استخراج عصاره آبی و اتانولی میوه درخت کاج و بررسی خواص ضد میکروبی آن بر روی بعضی از میکرorganیسم های شاخص عفونت و مسمومیت مواد غذایی است که می تواند به عنوان یک افزودنی طبیعی فساد از مواد غذایی، را به تاخیر بیندازد.

۱- مقدمه

صرف گیاهان دارویی تنها به کشور های در حال توسعه اختصاص ندارد بلکه طی سه دهه اخیر گیاه درمانی در بسیاری از کشور های اروپایی، ایالات متحده و سایر کشور های پیشرفت رشد شایانی نموده است و مورد استقبال گسترده عموم قرار گرفته و همین فرایند یعنی رویکرد دوباره آدمی به داروهای گیاهی و گیاه درمانی یکی از جنبه های موج سیز به شمار می رود [۱ و ۲]. یکی از مهمترین چالش های درمانی مبارزه با بیماری های عفونی به دلیل شیوع و گسترش بالای آن ها می باشد. پس از شناسایی پنسیلین در دهه ۴۰ میلادی و گسترش استفاده از آن، هر روز آنتی بیوتیک های جدیدی برای مبارزه با عفونت ها ارائه می شد، نتیجه این امر گسترش استفاده بالینی آنتی بیوتیک های طبیعی و سنتیک در درمان عفونت ها بود. استفاده بی رویه از این داروهای ضد میکروبی منجر به افزایش مقاومت های دارویی در اکثر باکتری ها گردید [۳]. از طرفی درمان با آنتی بیوتیک ها همواره نگرانی عوارض جانبی دارو را به همراه دارد. گیاهان دارویی به دلیل مزایای های متعددی از قبیل ارزان و قابل دسترس بودن و سازگاری با طبع و پذیرش بهتر توسط بیماران، امروزه برای درمان بیماری ها از جمله عفونت ها مورد توجه قرار گرفته اند [۴].

یکی از گیاهان دارویی که از زمان های گذشته تا کنون اثرات درمانی و موثردر مقابله با بیماری های مختلف داشته است، میوه درخت کاج تهران (*Pinus elderica*) می باشد که زیر گونه ای از جنس *Pinus* است، این جنس متعلق به تیره کاج یا *Pinaceae* و راسته *Pinal* است که برخی از گیاه شناسان آن را یک گونه مستقل شناخته و عده ای دیگر آن را یکی از شکل های جغرافیایی کاج بروسیا یا واریته ای از کاج حلب دانسته اند [۵]، میوه مخروطی کاج تهران به شکل تخم مرغی واژگون، نامتقارن و گاهی در قسمت نوک کمی خمیده است. ۵ تا ۶ سانتیمتر طول و ۳ تا ۴ سانتیمتر پهنا دارد. معمولاً ۳-۲ عدد با هم بر روی پایکی کوتاه، به حالت راست، افقی و گاهی آویزان قرار دارند [۶].

در متون طبی کهن ایران از قسمت های مختلف انواع رده کاج به خصوص صمغ آن برای درمان زخم های کهنه استفاده می شده است [۷]. همچنین در طب سنتی ژاپن از مخروط کاج

PTCC1247 تهیه شده از مرکز کلکسیون کشت میکروبی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران استفاده گردید.

۵-۲- فعال سازی سوسپانسیون میکروبی

پس از دریافت سوش های مورد نظر به منظور فعال سازی، باکتری ها مطابق با دستورالعمل در شرایط استریل به محیط کشت مایع مولر هیتتون منتقل شده و بعد از رشد آنها در این محیط در دمای ۳۵ درجه سانتی گراد به مدت ۲۴ ساعت، روی محیط کشت مولر هیتتون آگار کشت خطی داده شده و سپس از کلنی های رشد کرده سوسپانسیون باکتریایی تهیه گردید. برای این کار سطح کلنی رشد کرده در محیط مولر هیتتون آگار را توسط نرمال سالین ۹٪ شسته و سوسپانسیون غلیظی از باکتری ها را تهیه شد. سپس توسط پیپ استریل مقدار کمی از این سوسپانسیون را داخل لوله های استریل ریخته و با افزودن مقدار اضافه نرمال سالین و مقایسه آن با محلول ۵٪ مک فارلند سوسپانسیونی با غلظت 10^8 CFU/ml مورد نظریه دست آورده شد [۱۴]. در این پژوهش بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره های حاصل با روش های انتشار دیسک در آگار و نیز تعیین حداقل غلظت مهار کشندگی (Minimum Inhibitory Concentration; MIC و حداقل غلظت کشنده باکتریایی (Minimum Bactericidal Concentration MBC) انجام گردید.

۶-۲- روش انتشار دیسک در آگار

این روش جهت ارزیابی مواد ضد میکروبی عصاره مورد استفاده قرار می گیرد و به نام آزمون کربی - بایرنیز معروف می باشد. اساس این روش انتقال ماده ای آنتی باکتریال به درون دیسک است. در این آزمون مهم این است که مشخص کنیم اثر چه غلظتی از عصاره با آنتی بیوتیک برابری می کند یا حتی از آن بیشتر است. حتی اگر این غلظت بیشتر از غلظت آنتی بیوتیک هم باشد به دلیل مزایایی که دارد می تواند جانشین آنتی بیوتیک شود [۱۵]. در این روش ابتدا غلظت های ۵، ۱۰، ۲۰، ۴۰ و ۸۰ میلی گرم بر میلی لیتر از عصاره ها تهیه شد و پس از قرار دادن حجم مشخصی از این محلول ها بر روی هر دیسک، در کنار شعله دیسک ها خشک گردیدند. سپس یک لوب از کشت استاندارد هر سوش روی محیط کشت مولر هیتتون آگار کشت داده شد و دیسک ها در جای مشخص شده و با رعایت فاصله مناسب قرار گرفتند. در هر پلیت ۵ دیسک قرار می گیرد که ۴ دیسک مربوط به غلظت ها و یک دیسک

۲- مواد و روش ها

۱-۱- جمع آوری و آماده سازی نمونه های گیاهی برای عصاره گیری

در این مطالعه تجربی پس از تهیه میوه درخت کاج تهران جنس و گونه این گیاه در مرکز هرباریوم پژوهشکده گیاهی مشهد تعیین گردید. میوه ها قبل از آسیاب کردن در هوای آزاد و در سایه کاملا خشک گردید تا عمل خرد کردن آنها راحتتر صورت گیرد.

۱-۲- تهیه عصاره های آبی و اتانولی به روش خیساندن

دلیل استفاده از روش خیساندن عدم آسیب به تمام مواد موجود در در عصاره تهیه شده در گیاهان می باشد . جهت تهیه عصاره آبی و اتانولی به طور جداگانه به پودر گیاهی حاصل با رعایت نسبت ۱:۵ حلال (آب و اتانول) اضافه گردید. مخلوط حاصله به مدت ۴۸ ساعت و در دمای اتاق در انکوباتور شیکردار نگه داری گردید تا ترکیبات موثر موجود در گیاه استخراج شود [۱۱]. سپس حذف تفاله ها و مواد جامد غیر محلول با کاغذ صافی واتمن انجام شد. محلول صاف شده به مدت ۱۰ دقیقه با دور ۳۰۰۰ rpm سانتریفوژ گردید، در مرحله بعد به کمک دستگاه روتاری با دمای ۳۷ درجه سانتی گراد عصاره حاصله را تغییض نموده و در ادامه در آون تحت خلا با همین درجه حرارت عصاره را خشک شد [۱۲].

۲-۳- تعیین درصد استخراج عصاره ها

ابتدا وزن یک پلیت آزمایشگاهی خالی را تعیین کرده و سپس ۱۵ میلی لیتر از عصاره های آبی و اتانولی را در آن ریخته، سپس محتوی پلیت ها در دمای اتاق خشک گردید. پس از خشک شدن عصاره ها پلیت ها را مجددا وزن نموده و از وزن پلیت خالی کم شد، میانگین سه بار تکرار را به عنوان وزن خشک و یا درصد استخراج عصاره در نظر گرفته شد [۱۳].

۲-۴- سوش های میکروبی مورد آزمایش

برای انجام آزمایش ها از سوش های باکتری های پاتوژن (۱) *Escherichia* (۲) *Salmonella thypi* PTCC1609 *Staphylococcus* (۳) *coli O157:H7*-PTCC0157 *Bacillus cereus-* (۴) *aureus-* PTCC1112

بود لوله ای که حاوی کمترین غلظت عصاره گیاهی بود به عنوان MIC گزارش گردید [۱۷]. برای تعیین MBC نیز یک میلی لیتر از لوله هایی که باکتری در آن رشد نکرده بود با ۱۵ میلی لیتر از محیط کشت مولرهیتون، آگار مذاب در یک پلیت کشت آمیخته داده شده و پس از بسته شدن آگار، در ۳۵ درجه سانتی گراد برای ۲۴ ساعت گرمخانه گذاری شد. سپس پلیتی را که حاوی کمترین غلظت عصاره بود و در آن رشدی مشاهده نشد به عنوان MBC آن عصاره گزارش شد [۱۸].

۳- آنالیز آماری

برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل و مقایسه میانگین ها از نرم افزار آماری 16 SPSS و آزمون آنالیز واریانس (ANOVA) استفاده گردید و اختلاف بین میانگین ها با آزمون Tuckey در سطح اطمینان $0.05 \leq p \leq 0.05$ درصد انجام شد.

۴- نتایج

نتایج مربوط به وزن خشک عصاره های آبی و اتانولی میوه درخت کاج به دست آمده توسط روش خیساندن در جدول ۱ آورده شده است.

نیز به عنوان شاهد منفی (دیسک فاقد عصاره) می باشد. لازم به ذکر است که فعالیت آنتی باکتریایی دیسک های آنتی بیوتیک استاندارد (آمپی سیلین، استریتومایسین، پنی سیلین وونکومایسین) نیز در پلیت های جداگانه بررسی شد. در نهایت پلیت های تلقیح شده در انکوباتور ۳۷ درجه سانتی گراد به مدت ۲۴ ساعت قرار داده شد، پس از این مدت میانگین قطر هاله های عدم رشد در اطراف هر دیسک برحسب میلی متر گزارش شد [۱۶].

۷-۲- تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشنده عصاره ها

به منظور تعیین MIC به ازای هر میکرو ارگانیسم از یک سری آتایی لوله های آزمایش استفاده شد. ۵ لوله برای غلظت های مختلف عصاره ها و یک لوله نیز به عنوان کنترل منفی در نظر گرفته شد. به هر کدام از لوله ها میزان ۴ میلی لیتر از محیط کشت مولرهیتون مایع همراه با غلظت های مشخص شده از عصاره ها و یک دهم میلی لیتر از سوسپانسیون کشت یک شبه باکتری اضافه گردید. سپس لوله ها به مدت ۲۴ ساعت در انکوباتور ۳۷ درجه سانتی گراد قرار داده شدند و پس از طی این مدت از نظر کدورت ناشی از رشد میکروارگانیسم ها بررسی گردیدند. از میان لوله های که باکتری در آن رشد نکرده

جدول ۱ وزن خشک عصاره های آبی و اتانولی میوه کاج حاصل از روش خیساندن

| وزن خشک عصاره آبی میوه درخت کاج | وزن خشک عصاره اتانولی میوه درخت کاج |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| %۱۰/۵ | %۷ |

باکتری اشرشیا کلی و سالمونلا تیفی بود، در حالی که عصاره اتانولی میوه درخت کاج در تمامی غلظت های به کار رفته در این آزمایش بر تمامی باکتری ها موثر بوده و با ایجاد هاله بازداری از رشد آنها جلوگیری می نماید. در مورد عصاره آبی با کمترین غلظت (۵ میلی گرم بر میلی لیتر) بیشترین قطر هاله $8/03 \pm 0/25$ مربوط به باکتری گرم مثبت استافیلوكوکوس اورئوس به دست آمد.

در بالاترین غلظت عصاره آبی (۸۰ میلی گرم بر میلی لیتر) نیز گونه اشرشیا کلی کمترین قطر هاله بازداری $\pm 0/35$ و $\pm 0/45$ استافیلوكوکوس اورئوس بیشترین قطر هاله $\pm 0/45$ را نشان داد.

این نتایج نشان داد که درصد استحصال عصاره اتانولی میوه درخت کاج در روش خیساندن در مقایسه با عصاره آبی بیشتر است، در نتیجه با توجه به میزان استحصال عصاره توسط اتانول میزان بازدارندگی آن نسبت به عصاره آبی میوه درخت کاج بیشتر بود و در غلظت کمتری از عصاره اثر بازدارندگی نشان داد.

همچنین نتایج حاصل از بررسی فعالیت ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی به منظور تعیین قطر هاله بازداری و مقایسه با آنتی بیوتیک های استاندارد به ترتیب در جدول ۲ و ۳ آورده شده است.

نتایج نشان دهنده عدم تاثیر عصاره آبی میوه درخت کاج تهران در کمترین غلظت (۵ میلی گرم بر میلی لیتر) بر روی دو

جدول ۲ میانگین قطر هاله عدم رشد بر حسب میلی متر عصاره آبی و اتانولی میوه درخت کاج تهران روی میکروارگانیسم های مورد آزمایش (استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس، اشرشیا کلی و سالمونلا تیفی) به روش انتشار دیسک در آگار پس از سه بار آزمایش

| نام عصاره | غلظت mg/ml | باکتری مورد آزمایش | استرپتومایزر | سالمونلاتیفی | استافیلوکوکوس اورئوس | باکتری سرئوس |
|-----------|------------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------------------|
| آبی | ۵ | | | | | ۷/۸±۰/۳۶ ^a |
| | ۳۰ | | | | | ۹/۲±۰/۲ ^b |
| | ۵۵ | | | | | ۱۰/۶±۰/۲ ^c |
| | ۸۰ | | | | | ۱۳±۰/۱۵ ^d |
| | ۵ | | | | | ۹/۴±۰/۲ ^a |
| | ۳۰ | | | | | ۱۲±۰/۰/۹۴ ^b |
| | ۵۵ | | | | | ۱۴/۲±۰/۰/۴۹ ^c |
| | ۸۰ | | | | | ۱۷/۴±۰/۰/۳۵ ^d |

*علامت (-) نشان دهنده عدم وجود فعالیت ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی میوه درخت کاج می باشد.

* حروف غیر مشابه در یک ردیف نشان دهنده وجود تفاوت معنی دار در سطح $p \leq 0.05$ است.

جدول ۳ میانگین قطر هاله عدم رشد بر حسب میلی متر مربوط به آنتی بیوتیک های استاندارد بر روی میکروارگانیسم های مورد آزمایش (استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس، اشرشیا کلی و سالمونلا تیفی) به روش انتشار دیسک در آگار پس از سه بار آزمایش

| نام آنتی بیوتیک | اشرشیا کلی | سالمونلاتیفی | استافیلوکوکوس اورئوس | باکتری سرئوس |
|-----------------|------------|--------------|----------------------|--------------|
| ونکومایسین | ۱۶ | ۱۹ | ۲۰ | ۱۹/۵ |
| آمپی سیلین | ۲۰ | ۲۸ | ۲۶ | ۲۱ |
| استرپتومایسین | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۱۹ |
| پنی سیلین | ۱۸ | ۱۸/۵ | ۲۹ | ۲۸ |

نتایج مربوط به تعیین حداقل غلظت مهار کنندگی (Minimum Inhibitory Concentration; MIC) و Minimum bactericidal (MBC:Concentration) حداقل غلظت کشنده (MIC) به ترتیب در جدول ۴ وارد شده است.

بررسی حداقل غلظت بازدارنده از رشد عصاره های آبی و اتانولی میوه درخت کاج تهران بیانگر اینست که MIC عصاره اتانولی برای سویه های باکتری گرم مثبت برابر مقادیر MIC عصاره اتانولی در مورد تمامی سویه های باکتری هاست، اما در مورد باکتری های گرم منفی مقادیر MIC عصاره اتانولی کمتر از عصاره آبی است.

در مورد عصاره اتانولی نیز در تمامی غلظت های به کار رفته گونه اشرشیا کلی با قطر بازدارنده اندک از بین سایر گونه های باکتریابی به عنوان مقاوم ترین سویه و باکتری استافیلوکوکوس اورئوس با بیشترین قطر بازدارنده ای در تمامی غلظت ها حساس ترین گونه در برابر عصاره اتانولی شناخته شد. در مجموع تفاوت معنی داری بین دو نوع عصاره بر باکتری ها مشاهده شد. در مقایسه با آنتی بیوتیک ها مورد استفاده مشخص گردید که اثر تمامی غلظت های عصاره آبی و اتانولی در مورد تمامی سویه های کمتر از اثر ضد میکروبی آنتی بیوتیک های مورد آزمایش می باشد.

جدول ۴ نتایج حداقل غلظت مهارکنندگی رشد (MIC) عصاره آبی و اتانولی میوه کاج تهران بر استافیلوکوکوس اورئوس ، باسیلوس

سرئوس، اشرشیا کلی و سالمونلا تیفی

| نام عصاره | غلظت mg/ml | آبی | | | |
|-----------------|----------------------|--------------|-----------|--------------------|-------|
| بسیلوس سرئوس | استافیلوکوکوس اورئوس | سالمونلاتیفی | اشرشیاکلی | باکتری مورد آزمایش | - |
| - | - | - | - | - | ۲ |
| | + | + | - | - | ۴ |
| | + | + | - | - | ۸ |
| | + | + | + | + | ۱۶ |
| | + | + | + | + | ۳۲ |
| | + | + | + | + | ۶۴ |
| | - | - | - | - | کنترل |
| - | - | - | - | - | ۲ |
| | + | + | - | - | ۴ |
| | + | + | + | + | ۸ |
| | + | + | + | + | ۱۶ |
| | + | + | + | + | ۳۲ |
| | + | + | + | + | ۶۴ |
| | - | - | - | - | کنترل |
| + عدم رشد - رشد | | | | | |

جدول ۵ نتایج حداقل غلظت کشنندگی (MBC) عصاره های آبی و اتانولی میوه کاج تهران بر استافیلوکوکوس اورئوس ، باسیلوس

سرئوس، اشرشیا کلی و سالمونلا تیفی

| نام عصاره | غلظت mg/ml | آبی | | | |
|--------------|----------------------|--------------|-----------|--------------------|-------|
| بسیلوس سرئوس | استافیلوکوکوس اورئوس | سالمونلاتیفی | اشرشیاکلی | باکتری مورد آزمایش | - |
| - | - | - | - | - | ۲ |
| | - | - | - | - | ۴ |
| | - | - | - | - | ۸ |
| | - | - | - | - | ۱۶ |
| | - | - | - | - | ۳۲ |
| | + | + | - | - | ۶۴ |
| | + | + | - | - | ۱۲۸ |
| - | - | - | - | - | کنترل |
| - | - | - | - | - | ۲ |
| - | - | - | - | - | ۴ |
| - | - | - | - | - | ۸ |
| - | - | - | - | - | ۱۶ |
| - | - | - | - | - | ۳۲ |
| اتانولی | + | + | - | - | ۶۴ |
| | + | + | - | - | ۱۲۸ |
| | - | - | - | - | کنترل |
| | - | - | - | - | |

از عصاره های آبی و اتانولی میوه درخت کاج رشد آنها متوقف شد، و در این بین بیشترین قطر هاله عدم رشد مربوط به باکتری استافیلولوکوکوس اورئوس و کمترین قطر هاله مربوط به اشرشیا کلی بود. پس اثر ضد میکروبی هر دو عصاره آبی و اتانولی تا حدودی بسته به نوع میکروارگانیسم متفاوت می باشد. همانند مطالعه پیش رو دیگر محققین نیز به حساسیت های متفاوت گونه های باکتریایی و قارچی بر علیه مواد ضد میکروبی مشابه اشاره کردند.

در مطالعه (سمانی و همکاران، ۱۳۸۶)، مقایسه اثر مهارکنندگی عصاره متانولی دو جنس از گیاهان گونه گیاه استخیس (Stachys) و فلومیس (Phlomis)، نشان داد که این عصاره بر روی باکتری های گرم مثبت اثر بهتری نسبت به گرم منفی ها دارد (۲۰). طباطبایی یزدی و همکاران (۱۳۹۳) تاثیر عصاره آبی و اتانولی گیاه کلپوره را علیه تعدادی از باکتری های گرم مثبت و منفی مورد بررسی قرار دادند و اظهار داشتند که سویه های گرم منفی اشرشیا کلی و سودوموناس آئروژینوزا بیشترین مقاومت را نسبت به عصاره کلپوره داشتند در حالی که رشد باکتری های گرم مثبت در غلظت های کمتری از هر دو عصاره متوقف گردید [۲۱].

طاهری و همکاران (۲۰۱۳) نیز در مطالعه خود نشان دادند که عصاره هیدرو الکلی برگ گیاه مورد بیشترین تاثیر را بر باکتری بر استافیلولوکوکوس اورئوس در میان دیگر باکتری های مورد مطالعه داشت [۲۲].

احتمالاً متفاوت حساسیت میکروارگانیسم های متفاوت به مواد ضد میکروبی به علت ساختار متفاوت میکروارگانیسم ها می باشد. علت حساسیت بیشتر باکتری های گرم مثبت نسبت به عصاره میوه درخت کاج تهران از اختلاف ساختمانی دیواره سلولی باکتری های گرم مثبت نسبت به سوش های گرم منفی ناشی می شود، به طوری که باکتری های گرم مثبت در دیواره سلولی خود دارای ترکیب موکوپیتیدی به نام مورن بوده در حالی که باکتری های گرم منفی فقط لایه نازکی از موکوپیتیدمورن دارند و قسمت اعظم ساختار دیواره در آنها لیپو پروتئین و لیپو پلی ساکارید است در نتیجه مقاومت بیشتر باکتری های گرم منفی را می توان به حضور غشای فسفولیپیدی خارجی تقریباً غیر قابل نفوذ به ترکیبات چربی دوست نسبت داد [۲۳].

به این صورت که MIC عصاره اتانولی برای استافیلولوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس، اشرشیا کلی و سالمونلا تیفی به ترتیب مقادیر ۴، ۸، ۸، ۸ میلی گرم بر میلی لیتر بود در حالی که میزان MIC عصاره آبی برای ترتیب باکتریایی فوق ۴، ۴، ۱۶ و ۱۶ میلی گرم بر میلی لیتر به دست آمد.

این نتایج نشان می دهد که MBC عصاره آبی میوه درخت Staphylococcus کاج برای باکتری های گرم مثبت *Bucillus subtilis aureus* برابر ۶۴ میلی گرم بر میلی لیتر و *Escherichia coli* و *Salmonella thyphi* برابر ۱۲۸ میلی گرم بر میلی لیتر بود. همچنین MBC عصاره اتانولی میوه درخت کاج برای باکتری های *Bucillus subtilis* و *Staphylococcus aureus* ترتیب برابر ۳۲ و ۶۴ میلی گرم بر میلی لیتر و در مورد *Salmonella thyphi* و *Escherichia coli* برابر ۱۲۸ میلی گرم بر میلی لیتر بود.

۵- بحث

مقاومت روز افزون باکتری های بیماریزا نسبت آنتی بیوتیک های متدائل موجود در بازار و شیوع بیماری های عفونی که جهت درمان نیاز به این داروها دارند و نیز توانایی بالقوه برخی از گیاهان جهت تولید مواد ضد میکروبی باعث گرایش محققان به جایگزینی گیاهان دارویی با آنتی بیوتیک ها شده است.

بر اساس نتایج به دست آمده از این آزمایش عصاره های آبی و اتانولی میوه درخت کاج طیف وسیعی از فعالیت ضد میکروبی را بر علیه میکروارگانیسم های مورد مطالعه بوده است.

یکی از عواملی که ممکن است اثرات ضد میکروبی عصاره یک گیاه را تحت تاثیر قرار دهد روش عصاره گیری و نوع حلال مورد استفاده می باشد. عصاره هایی که با روش ها و حلال های متفاوت از یک گیاه استخراج می شوند می توانند اثرات ضد میکروبی متفاوتی را بر روی یک گونه خاص از میکروارگانیسم ها نشان دهند [۱۹]. در این مطالعه تجربی یافت شد که سویه های باکتری گرم مثبت استافیلولوکوکوس اورئوس و باسیلوس سرئوس در مقایسه با سوش های گرم منفی سالمونلا تیفی و اشرشیا کلی از حساسیت بیشتری در برابر عصاره های مورد استفاده برخوردار بودند و در غلظت کمتری

روش سینلندر-پلیت پرداختندوازآنتی بیوتیک جنتامایسین به عنوان شاهد مثبت استفاده کردند، آزمون ANOVA در این بررسی، معنی دار بودن تفاوت بین میانگین قطر هاله عدم رشد عصاره این گیاهان را در غلظت ۵۰ میلی گرم بر میلی لیتر (بالاترین غلظت) را در مقایسه با جنتامایسین نشان میدهد که هاله های عدم رشد این آنتی بیوتیک برای تمام سوش ها بیشتر از عصاره های گیاهی بود [۲۷].

در جمع بندی می توان گفت نتایج تحقیق حاضر نشان دهنده تاثیر ضد میکروبی عصاره آبی و اتانولی میوه درخت کاج تهران بر روی برخی از باکتری های بیماری زا و شاخص عفونت و مسمومیت غذایی به ویژه استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سرئوس می باشد، که می تواند به عنوان آنتی بیوتیک گیاهی با عوارض کمتر از آنتی بیوتیک های معمول راهکار مناسبی برای درمان بیماری های حاصل از این سویه های باکتریایی باشد. و همچنین پیشنهاد می شود مطالعات بیشتری از قبیل استفاده از سوش های متفاوت باکتریایی، استفاده از متدهای دیگری در آزمایشات آنتی بیوگرام و همچنین بررسی اثر ضد باکتریایی این گیاه در مدل های حیوانی و نیز به عنوان نگهدارنده های طبیعی در مدل های غذایی انجام شود.

۶- سپاس و قدردانی

بدین وسیله از زحمات جناب آقای مهندس بهروز علیزاده بهبهانی، خانم مهندس شهناز افشاریان و خانم مهندس مطهره پیرنیا که در انجام آزمایش ها ما را یاری نمودند، صمیمانه قدردانی می شود. نویسندها مقاله بر خود لازم می دانند که از معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد جهت یاری رساندن در انجام طرح با کد ۳۳۰۱۰۷ صمیمانه سپاسگزاری نمایند.

۷- منابع

- [1] Klink B. Alternative medicine: is natural really better. *Drug Top*1997 ; 141: 99-100.
- [2] Clark AM. Nutural products as a resource from new drugs. *Pharmaceutical Research* 1996.; 13: 44-1133.
- [3] Weinstine R.A. Controlling antimicrobial resistance in hospitals: Infection control and use of antibiotics. *Emerging Infectious Disease* 2001;7: 188-192.

نتایج پژوهش اخیر نشان داد که عصاره اتانولی میوه درخت کاج تهران دارای وزن خشک به مراتب بالاتر و نیز اثرات ضد میکروبی بیشتر نسبت به عصاره آبی بود که این موضوع را می توان اینگونه بیان کرد که مواد با اثرات ضد میکروبی در هر گیاه وابسته به ساختمان خود می توانند قطبی یا غیر قطبی باشند و قطبیت حلال مورد استفاده برای استخراج ماده موثره گیاه بسیار مهم است [۲۴]. بنابراین می توان اظهار داشت که عملده ترکیبات با اثرات ضد میکروبی در این گیاه قطبیت خیلی بالایی ندارند که بتوانند توسط حلال های قطبی مثل آب استخراج شوند و به احتمال قوی توسط حلال های غیر قطبی مثل اتانول استخراج شوند. (حیدری سورشجانی و همکاران ۲۰۱۳، اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی مرزه بختیاری را بر اشرشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس بررسی و به این نتیجه رسیدند که عصاره اتانولی مرزه اثر بازدارنده بیشتری بر سوش های مورد مطالعه نشان داد. این نتیجه با یافته های این پژوهش مشابه می باشد [۲۵].

غلظت های متفاوت عصاره نیز در میزان اثر ضد میکروبی موثر است و در مطالعات متعددی نیز به این موضوع اشاره شده است که با افزایش میزان غلظت عصاره ، اثرات ضد میکروبی گیاه و هاله عدم رشد نیز افزایش می یابد. این امر را می توان به مقدار ماده موثره موجود در عصاره ها نسبت داد. در مطالعه جلالی و همکاران(۱۳۸۶) در مورد بررسی عصاره های مختلف میوه سگ دندان خار (Pycnocycla Spinosa Decne) نیز بیان شد که اثر ضد میکروبی عصاره ها با افزایش غلظت افزایش می یابد [۲۶]. همچنین نتایج مطالعه ابراهیمی و همکاران(۱۳۹۰) نیز نشان داد که اثر عصاره متابولی اجزای مختلف بلوط ایرانی (Quercus Persica) بر روی باکتری اشرشیا کلی وابسته به غلظت است [۱۵].

مقایسه هاله های عدم رشد آنتی بیوتیک های مورد استفاده در این آزمایش با عصاره های آبی و اتانولی میوه درخت کاج تهران نشان می دهد که اثر این گیاه به صورت عصاره های تام که مخلوط بیشماری از مواد است بسیار کمتر از آنتی بیوتیک های مورد استفاده است و اگر ترکیبات با اثرات ضد میکروبی این عصاره ها جداسازی و خالص گرددن اثرات قابل مقایسه تری با آنتی بیوتیک های استاندارد خواهد داشت. همانطور که مهدوی و همکاران (۱۳۸۸) به بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره متابولی ۱۲ گونه گیاهی بر روی ۶ گونه میکروبی به

- [16] Mahon C. R, Manuselis G. Textbook of Diagnostic Microbiology, Saunders, 2000.
- [17] Benger S, Townsend P, Ashford RL, Lambert P. An in vitro study to determine the minimum inhibitory concentration of *Melaleuca alternifolia* against the dermatophyte *Trichophyton rubrum*. *The Foot* 2004;14: 86 - 91.
- [18] Sindambiwe J, Calomme M, Cos P, Totte J, Pieters L, Vlietinck A. Screening of seven selected Rwandan medicinal plants for antimicrobial and antiviral activities. *Journal of Ethnopharmacology*. 1999;65(1):71-7.
- [19] Nostro A, Gernano MP, Angelo VA, Marino A, Cannatelli MA. Extraction methods and bioautography for evaluation of medicinal plant antimicrobial activity. *Lett Appl Microbiol* 2000 ; 30: 379-384.
- [20] Morteza semnani K, Saidi M, Mahdavi M.R , Rahimi F. Study and comparision antimicrobial effect of methanolic extracts from several plant species of *Stachys* and *Phlomis*. *Journal of Mazandaran University of Medical Sciences*2007;7(57):57-66. (Persian)
- [21] Tabatabaei Yazdi F, Alizadeh Bhhahani B, Heidari Soureshgani M, Mortazavi A. HMUJ1393 . The in vitro study of antimicrobial effect of *Teucrium polium* extract on infectious Microorganisms. 21(1). (Persian)
- [22] Taheri A, Seyfan A , Jalalinezhad S , Nasery F. Antibacterial effect of *myrtus communis*hydro-alcoholic extract on pathogenic bacteria. *Zahedan Jurnal of Research in Medical Sciences*2013; 15(6):19-24. (Persian)
- [23] Espinel-Ingroff A, Fothergill A, Peter J, Rinaldi M, Walsh T. 2002 . Testing conditions for determination of minimum fungicidal concentrations of new and established antifungal agents for *Aspergillus spp.*:NCCLS collaborative study. *Journal of Clinical Microbiology* 40(9):3204-8.
- [24] Eloff JN. Which extractant should be used for the screening and isolation of antimicrobial components from plants. *J Ethnopharmacol* 1998 ; 60(1): 1-8.
- [25] Heidari Soureshjani M , Tabatabaei Yazdi F , Mortazavi A , Shahidi F , Alizadeh Behbahani B. Antimicrobial effect of Satureja bacteria extracts aqueous and ethanolic on *Escherichia coli* and *Staphylococcus aureus* . *Scientific Journal of*
- [4] Mosaddegh M, Naghibi F. *Iran Traditional Medicine: Past & Present. Traditional Medicine & Materia medica*, TMRC 2002; 1: 2-20.(Persian)
- [5] Zare H. Native and non-native spices of conifers in Iran. 1th ed. *Research Insituation of Forest and Ranges in Iran*. (Persian)
- [6] Zaki zadeh.Ornamental trees. *Gillan University Publication*.2011. (Persian)
- [7] Zargari A. *Medical Plants*. 5th ed . Tehran:Tehran UniversityPress 1992; p:3-6. (Persian)
- [8] Sakagami H, Kawazoe Y, Oh-hara T, Kitajima K, Inoue Y, Tanuma S, Ichikawa S, Konno K .Stimulation of human peripheral blood polymorphonuclear cell iodination by lignin-related substances. *J. Leuk. Biol.* 1991; 49:277.
- [9] Asar Sh.A, Jafar zade A, Mohagheghi M, Bahram abadi R. Antimicrobial effect of *Pinus elderica* gum and alcoholic extract on several skin infection bacteria. *Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences*2005;4(3):186-191. (Persian)
- [10] Sakagami H, Kushida T , oizumi T. Distribution of lignin–carbohydrate complex in plant kingdom and its functionality as alternative medicine. *Pharmacology & Therapeutics* 2010;128:91-105.
- [11] Ahmad I, Beg AZ. Antimicrobial and phytochemical studies on 45 Indian medicinal plants against multi-drug resistant human pathogen. *Journal Ethnopharmacol* 2001; 74:113-123.
- [12] Sotillo R. D, Hadley M, Holm E. T. Potato peel waste: Stability and antioxidant activity of a Freeze- Dried Extract. *J Food Sci* 1994; 59(5): 1031-1033.
- [13] Sattari M, Shahbazi A, Najarparyah SH . Antibacterial effect of aqueous and alcoholic extracts of eucalyptus on *pseudomonas aeruginosa*. *Moderes Journal Medical Science*2005;8(1):19-23. (Persian)
- [14] Valero M, salmeron M. Antibacterial activit of 11 essential oils against *Bacillus cereus* in tyndallized carrot broch . *International Journal of Food Microbiology* 2003; 85(1):73-81.
- [15] Ebrahimi A, Khayami M, Nejati V. Comparison of antimicrobial effect of different parts of *Querqus persica* against *Escherichia coli*. Ofogh-e-Danesh;*Journal of Gonabad University of Medical Sciences*. 2012;18(1):6-12. (Persian)

- [27] Mahdavi meymand Z, Moshafi M.H ,Forootanfar H. antimicrobial effect study of methanolic extracts from 12 species of plant on 6 species of bacteria with cylinder-plate method. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences 2009 ;8(3):227-238. (Persian)
- [26] Jalali M, Abedi D, Asghari G, Rezaie Z. MMUJ. A study of anti-microbial effect of *pycnocycla spinosa*'s fruit extracts. *Mazandaran Jornal of Research in Medical Sciences*2007, 17(59):76-86. (Persian)

Study of comparative antimicrobial effects of *Pinus elderica* extracts and selective antibiotics on some of food infection and intoxication microorganisms "in vitro"

Kashani, H.¹, Tabatabaei Yazdi, F.^{2*}, Mortazavi, S. A.², Shahidi, F.²

1. M.Sc. Student of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
2. Professor, Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad

(Received: 93/6/28 Accepted: 93/9/24)

Researchers give some reasons to discover new antimicrobial substances of plant origin; they are consisted of increasing bacterial resistance to antibiotics, and susceptibility to antimicrobial. The present study examines the effect of aqueous and ethanolic extract of *Pinus elderica* fruit on infection and poisoning of food microorganisms "in vitro". Antimicrobial effect of the extracts using agar disk diffusion method and the Minimum Inhibitory Concentration (MIC) of microbial growth and Minimum Bactericidal Concentration (MBC) of bacteria was performed using serial dilution method. Comparison of antibacterial activity of ethanolic and aqueous extracts of this plant showed better effect on Gram-positive bacteria than Gram-negative bacteria. Such maximum growth of inhibition zone showed at ethanol extract from *Pinus elderica* fruit on strains of *staphylococcus aureus*, which was 17.5 + 0.14 mm. From two strains of Gram-negative bacteria, *E.coli* was the most resistant against aqueous and ethanolic extracts of this fruit. According to the results, *Pinus elderica* have some what antibacterial effects.

Keywords: *Pinus elderica* fruit, Antibacterial effect, Extraction

* Corresponding Author E-Mail Address: tabatabai@um.ac.ir