

تعیین برخی خواص فیزیکوشیمیایی و زمان مناسب نگهداری کنسانتره ارقام توت سفید در استان خراسان

شادی بصیری^{۱*}

۱- استادیار پژوهش، پخت تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد ، ایران
 (تاریخ دریافت: ۹۳/۰۲/۰۶ تاریخ پذیرش: ۹۴/۰۸/۰۴)

چکیده

توت سفید بومی کشورهایی نظریه چین، ایران و ترکیه است. با توجه به بالا بودن میزان رطوبت و حساس بودن محصول به حمل و نقل و نگهداری، میزان ضایعات آن زیاد است. کنسانتره (شیره) توت یکی از محصولات غذایی سنتی در ایران است که از تغليظ آب توت به دست می آید و ارزش غذایی بالای دارد. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی اثرات حاصل از رقم توت و نحوه تغليظ آبمیوه بر پاره ای ویژگی های فیزیکوشیمیایی کنسانتره در طول زمان نگهداری می باشد. برای تهیه کنسانتره از دو رقم توت بخارا و خاردار استفاده شد. فرایند تغليظ آبمیوه نیز در دو سطح (تحت خلا و شرایط اتمسفر) تا رسیدن به برقیکس ۷۰ انجام شد. آزمایشات آسیدیته، pH و رنگ به تناسب در فواصل زمانی ۳، ۶ و ۹ ماه پس از تولید انجام شدند. تجزیه و تحلیل آماری داده ها به کمک آزمون فاکتوریل در قالب کاملاً تصادفی در ۳ تکرار، انجام شد. نتایج نشان داد که اثر رقم و نحوه تغليظ بر فراوری آب توت معنی دار بود. محصولات به دست آمده ماندگاری زیاد تا ۹ ماه را داشتند به طوری که اندیس های L^* , a^* و b^* مربوط به رنگ فراورده های حاصل، در دامنه قابل قبولی قرار داشتند. به طورکلی در بین تیمارهای کنسانتره توت، بالاترین امتیاز مربوط به کنسانتره توت به دست آمده از رقم بخارا و تغليظ شده در شرایط خلا بود.

کلید واژگان: خواص فیزیکوشیمیایی، رنگ، زمان نگهداری، کنسانتره آب توت.

* مسئول مکاتبات: shbasiri35@yahoo.com

تعیین برخی خواص فیزیکوشیمیایی و زمان مناسب نگهداری...

خوبی از مواد معدنی مانند پتاسیم، منگنز و منیزیم است (جدول)

۱). این میوه سرشار از ویتامین های گروه B کمپلکس و ویتامین K می باشد. حاوی مقادیر بسیار خوبی از ویتامین ₆B، نیاسین، ریبوفلاوین و اسید فولیک است. این ویتامین ها به عنوان کوفاکتور عمل کرده و در بدن به سوخت و ساز کربوهیدرات ها، پروتئین ها و چربی ها کمک می کنند.

هر ساله مقدار کمی از تولید میوه توت به مصرف تازه خوری می رسد. با توجه به حساس بودن این محصول به حمل و نقل و نگهداری دشوار آن به علت بالا بودن میزان رطوبت، مصرف تازه این محصول تنها در بازار منطقه ای امکان پذیر می باشد. نبود دانش مناسب برای فرآوری این محصول باعث افزایش ضایعات و گاهی عدم تمایل با غذار به برداشت محصول می شود. قابل ذکر است در سیستم ستی رایج، بخشی از توت جمع آوری شده و خشک می شود. بهینه سازی روش های تولید فرآورده های مختلف از توت، کمک به کاهش ضایعات و ایجاد ارزش افزوده، رشد و توسعه صنایع روستایی و منطقه ای در خصوص تولید فرآورده های مختلف برای مصرف در بازارهای داخلی و حتی ارتقاء کیفیت نسبی و عرضه به بازارهای خارجی و صادرات خواهد شد [۱].

بر اساس آمار سال ۱۳۹۲ سطح زیرکشت توت درختی در ایران، ۵۷۷۹/۱۹ هکتار درخت بارور و غیر بارور و میزان تولید توت ۱۵۷۷۳/۸۳ تن و میزان عملکرد آن در واحد سطح ۵۷۳۳/۶۷ کیلوگرم در هکتار محاسبه شد. بر اساس همین آمار سطح زیر کشت توت درختی در استان خراسان رضوی، ۱۶۱۶/۸۲ هکتار درخت بارور و غیر بارور بود و میزان تولید توت ۲۷۲۹/۷ تن و میزان عملکرد آن در واحد سطح ۱۷۶۰/۹۸ کیلوگرم در هکتار برآورد گردید [۳].

۱ - مقدمه

درخت توت متعلق به جنس *Morus* و از خانواده *Moraceae* می باشد. در حال حاضر ۲۴ گونه از جنس مورد نظر در جهان موجود است. توت سفید بومی کشور چین است و در بسیاری از کشورهای جهان نظری هند، ایران، ترکیه، سوریه و کشورهای اطراف دریای مدیترانه نیز وجود دارد. پراکنده گی جغرافیایی توت بیشتر در مناطق معتدل و نیمه گرمسیری جهان است. درخت توت در نواحی مرطوب شمال ایران یعنی مازندران و گیلان و همچنین در مناطق خشک و کم آب مانند خراسان و آذربایجان نیز می تواند رشد کند.

درخت توت، گیاهی یک پایه است. بسته به شرایط آب و هوایی در اواسط اردیبهشت به گل نشسته، رسیدگی و برداشت محصول از اواسط خرداد شروع و تا مرداد ماه ادامه دارد. میوه توت استوانه ای یا بیضی بوده و طول آن بین ۱ تا ۳ سانتیمتر است. توت به صورت تازه یا خشک و همچنین فرآوری شده مصرف می شود [۱]. درخت توت مقاوم به سرما (تحمل تا -۲۵ درجه سانتیگراد) بوده و کم توقع است و در اکثر مناطق و شرایط آب و هوایی رشد میکند.

توت میوه ای پر خاصیت و با کالری زیاد است. میوه ها و سبزی ها منابع مهمی از فیبر هستند به طوری که فیبر ها نقش مهمی در کاهش مقادیر کلسترول و گلوکز خون داشته و در حفظ سلامت دستگاه گوارش مخصوصاً روده ها اهمیت ویژه دارند [۲]. توت با داشتن آهن و ویتامین C برای کسانی که دچار کم خونی هستند توصیه می شود. ویتامین A موجود در توت موجب رشد ناخن و تقویت چشم می شود. قند موجود در آن از نوع مونوساکارید (گلوکز و فروکتوز) بوده و به سرعت جذب میشود. توت منبع

Table 1 Chemical compounds of Mulberry fruit

Chemical compounds	Amount (per100 gerams fruits)
Carbohydrate	7.8-9
Protein	0.5-1.4
Fatty acid	0.3-0.5
Free acid(Citric acid)	1.1-1.8
Fiber	0.9- 1.3
Ash	0.8-1
Water	85-88
Calcium	0.17-0.39
Potassium	1- 1.49
Magnesium	0.09-0.10
Sodium	0.01-0.02
Phosphorus	0.18-0.21
Sulfur	0.05-0.06
Iron	0.17-0.19
Carotene	0.16-0.17
Ascorbic acid	11-12.5
Nicotinic acid	0.7-0.8
Thiamin	7-9 Micro gram
Riboflavin	165-179 Micro gram

Source: Singal et al., 2005

نهایت باعث افزایش ماندگاری می شود [۴]. قند های موجود در شیره می تواند به راحتی از خون عبور کرده، نیازی به هضم نداشته و منع سریع انرژی در بدن می باشد لذا کنسانتره های شیرین می تواند یک وظیفه مهم در فعالیت مغزی داشته باشد. شیره انگور به صورت تقریبی باعث تولید ۲۹۳ کیلوکالری انرژی از ۱۰۰ گرم آن می شود [۵]. این محصول برای بچه ها، کودکان، ورزشکاران، در مواقعی که نیاز فوری و میرم به مصرف انرژی است، مفید می باشد. روش های مختلفی برای تهیه شیره از میوه های مختلف وجود دارد [۶]. شیره به دست آمده از میوه ها کاربردهای زیاد در صنایع مختلف غذایی به عنوان شیرین کننده دارد [۷]. از کاربردهای دیگر کنسانتره ها می توان به افزودن آن در فرمول های انواع کیک، کلوچه و شیرینی اشاره کرد که باعث افزایش خواص تغذیه ای و ماندگاری محصول و ایجاد رنگ و طعم مطلوب در کیک و سایر محصولات پختی می گردد [۸]. هدف از اجرای طرح بررسی خواص فیزیکو شیمیایی و زمان مناسب نگهداری کنسانتره توت سفید از ارقام موجود در استان خراسان در نتیجه نحوه فراوری آنهاست.

در کشورهای اروپایی، توت بیشتر برای تهیه سرمه مورد استفاده قرار می گیرد همچنین در تهیه آب میوه، کنسانتره، ژله، کمپوت، مربا کاربرد دارد. در کشور چین علاوه بر این که از برگ درخت توت در سطح گسترده ای برای تربیت کرم ابریشم و تولید ابریشم استفاده می شود، از عصاره توت در صنعت داروسازی برای تهیه شربت های مختلف برای آرامش اعصاب و کم خوابی استفاده می شود. در کشور افغانستان از پودر توت خشک در تهیه نان و سایر فراورده های غلات استفاده می شود.

کنسانتره میوه یکی از محصولات غذایی سنتی در ایران و سایر کشورها از جمله ترکیه است که از تغلیظ آب میوه تا بریکس (درصد مواد جامد محلول) ۷۰ الی ۸۰ درجه به دست می آید. این محصول بیشتر به عنوان صبحانه مصرف می شود. کنسانتره یا شیره از میوه های با درصد بالای قند از جمله انگور، خرما، توت و انجیر به دست می آید. با جوشاندن آب میوه بدون افزودن شکر یا سایر افزودنی های غذایی ایجاد می شود بنابراین به عنوان یک محصول غذایی غنی از ترکیبات قندی طبیعی از جمله کلوکرن، گالاكتوز و مواد معدنی در نظر گرفته می شود. تغلیظ آب میوه باعث کاهش مقدار آب و پاستوریزاسیون آب میوه شده و در

۲۵۰ میلی لیتر آب مقطر جوشیده و سرد شده در یک اrlen ماير با ۵ گرم کنسانتره توت مخلوط شد. سپس با سود ۰/۱ نرمال در مقابل فنل فتالئین تا ایجاد رنگ صورتی کم رنگ تیتر شد. درصد اسیدیته بر حسب اسید سیتریک (اسید غالب توت) در صد گرم نمونه محاسبه گردید [۹]. وزن نمونه / میلی لیتر سود ۱/۰ نرمال \times ۰/۰۰۶۴ = ۱۰۰ اسیدیته کل (درصد)

اندازه گیری pH

الکترود دستگاه pH متر (مدل Metrohm ۶۹۱^۳) ساخت کشور سوئیس، در داخل نمونه های آبمیوه تغليظ شده قرار گرفت و pH قرائت شد [۹].

اندازه گیری بریکس

با استفاده از دستگاه رفراکтомتر رومیزی مدل Shouchit tangliang ساخت کشور چین، درصد مواد جامد محلول در نمونه تعیین شد [۹].

اندازه گیری رنگ نمونه

با استفاده از دستگاه رنگ سنج^۴ مینولتا مدل CR-400 ساخت کشور ژاپن، اندیس های L^* , a^* و b^* نمونه های کنسانتره توت اندازه گیری شدند [۹].

روش آماری

مدل آماری مورد استفاده، آزمون فاکتوریل در قالب کاملاً تصادفی بود که آزمایشات در ۳ تکرار انجام شدند. تجزیه و تحلیل داده ها و مقایسه میانگین ها با استفاده از نرم افزار Mstatc نسخه ۱/۴۲ انجام گرفت.

۳- نتایج و بحث

پاره ای از ویژگی های توت های مورد استفاده در این پژوهش در جدول ۳ آورده شده است.

3. pH meter Metrohm 691
4. Chromameter

۲- مواد و روش ها

مواد

ارقام توت مورد استفاده در این پژوهش، خاردار و بخارا بودند که از باگی واقع در حومه شهرستان مشهد تهیه شدند. خاک بتونیت از شرکت زرین خاک شهرستان فردوس خردباری شد.

روش تهیه کنسانتره توت

ابتدا توت های سالم و رسیده جدا و درصد مواد جامد محلول، اسیدیته و pH توت ها اندازه گیری شدند. با اعمال حرارت ملایم بافت میوه نرم و توسط آبمیوه گیری به پوره تبدیل شدند. صاف کردن با پارچه متنقال در دو مرحله انجام شد. برای شفاف کردن آبمیوه از خاک بتونیت به میزان ۵ درصد وزنی آبمیوه به مدت یک ساعت استفاده شد. پس از پایان این مرحله، آبمیوه کاملاً دو فاز شد. فاز شفاف که در سطح قرار داشت، جدا و تا بریکس ۷۰ تغليظ شد [۹].

عملیات تغليظ و پخت آبمیوه به دو صورت تغليظ در فشار اتمسفری و تغليظ در شرایط خلا (تبخيرکننده چرخان^۱) انجام شدند.

کنسانتره توت به دست آمده در ظروف شیشه ای، بسته بندی و در محل سرد و به دور از نور خورشید نگهداری شد. آزمایشات اولیه نظیر بریکس، اسیدیته، pH و اندیس های L^* , a^* و b^* مربوط به رنگ در زمان های ۳، ۶ و ۹ ماه پس از تولید کنسانتره انجام شدند. تیمارهای طرح عبارت از رقم توت در دو سطح (بخارا و خاردار)، نحوه تغليظ در دو سطح (فسار اتمسفری و تحت خلا) و زمان نگهداری در سه سطح (۳، ۶ و ۹ ماه) بودند. انواع کنسانتره های توت تولید شده در جدول ۲ آورده شده اند.

خصوصیات فیزیکوشیمیایی کنسانتره توت

اسیدیته قابل تیتراسیون^۲

1. Rotary evaporator
2. Titrable acidity

Table 2 The treatments

Concentrated	Sample	Characteristics of treatments
1	Bokhara mulberry + Concentration in the atmosphere + 3 months storage	
2	Bokhara mulberry + Concentration in the atmosphere + 6 months storage	
3	Bokhara mulberry + Concentration in the atmosphere + 9 months storage	
4	Bokhara mulberry + Concentration in a vacuum + 3 months storage	
5	Bokhara mulberry + Concentration in a vacuum + 6 months storage	
6	Bokhara mulberry + Concentration in a vacuum + 9 months storage	
7	Khardar mulberry + Concentration in the atmosphere + 3 months storage	
8	Khardar mulberry + Concentration in the atmosphere + 6 months storage	
9	Khardar mulberry + Concentration in the atmosphere + 9 months storage	
10	Khardar mulberry + Concentration in a vacuum+ 3 months storage	
11	Khardar mulberry + Concentration in a vacuum + 6 months storage	
12	Khardar mulberry + Concentration in a vacuum + 9 months storage	

Table 3 Some of the properties of used Mulberry fruits

Mulberry	Brix	Acidity (%)	pH
Bokhara	24.5	0.98	6.58
Khardar	23	1.45	6.85

معنی داری بیشتر و pH آن کمتر از کنسانتره حاصل از رقم بخارا بود. علت آن مربوط به اسیدیته و pH ارقام توت مصرفی بود. درصد قند توت بخارا از خاردار بیشتر است. مشخصات فیزیکوشیمیایی چند رقم مختلف توت در پاکستان تعیین شد. اسیدیته ارقام مورد بررسی در محدوده ۰/۱۳ تا ۰/۳ تعیین شد. اسیدیته ارقام مورد بررسی در محدوده ۰/۱۳ تا ۰/۳ متغیر بود و اختلاف معنی داری بین ارقام وجود داشت [۱۰]. پژوهشگران نشان دادند که اسیدیته ارقام توت سیاه مورد بررسی در محدوده ۱/۵۱ تا ۱/۷۹ درصد متغیر بودند که نتایج پژوهه حاضر را تأیید می کنند [۱۱].

نتایج تجزیه واریانس اثر نوع رقم توت، روش تغليظ آبمیوه و زمان نگهداری کنسانتره بر درصد اسیدیته، pH و رنگ نمونه های کمسانتره توت در جدول شماره ۴ آورده شده است. همانطور که مشاهده می شود اثرات رقم توت مورد استفاده، روش تغليظ آبمیوه و زمان نگهداری و اثرات متقابل دوتابعی آنها بر صفات اسیدیته، pH و رنگ نمونه های کنسانتره توت حاصل معنی دار است. مطابق جدول ۵، اثر نوع رقم بر درصد اسیدیته و pH کنسانتره توت اختلاف معنی داری داشت ($P < 0.01$). بطوريکه اسیدیته محصول به دست آمده از رقم خاردار بطور

Table 4 Analysis of variance main and interaction effects of mulberry varieties, concentration procedure and storage time on investigated properties

Source of variance	Squares Mean of acidity	Squares Mean of pH	Squares Mean of a^*	Squares Mean of b^*	Squares Mean of L^*
Mulberry variety (A)	4.144 **	2.416 **	21.451 **	3.823 **	8.073 **
concentration procedure (B)	0.037 **	0.204 **	1.345 **	0.955 **	2.461 **
storage time (C)	0.015 **	4.126 **	0.048 **	0.547 **	11.406 **
A*B	0.0001 ns	0.023 **	1.411 **	0.873 **	2.132 **
A*C	0.013 **	0.154 **	0.023 **	0.119 **	0.139 *
B*C	0.013 **	0.011 **	1.129 **	0.181 **	0.496 **
A*B* C	0.001 ns	0.009 *	1.328 **	0.285 **	0.22 *
Error	0.001	0.001	0.001	0.001	0.040

**: Significant at level 1%

* : Significant at level 5%

ns: not Significant

Table 5 Comparison of the effect of mulberry variety on mean of acidity, pH and L^* , a^* , b^* indexes of concentrated mulberry

Variety	Acidity (%)	pH	a^*	b^*	L^*
Bokhara mulberry	0.368 ^b	5.853 ^a	0.964 ^a	1.302 ^a	17.788 ^a
Khardar mulberry	0.848 ^a	5.486 ^b	-0.127 ^b	0.842 ^b	17.118 ^b

Different superscripts within the column represent significant difference at $p < 0.01$ (Duncan test)

* a و * b نسبت به شیره های به دست آمده از توت خاردار بودند. بالاتر بودن مقادیر زردی و قمزی و شفافیت کنسانتره به دست آمده از توت بخارا نسبت به توت خاردار، نظیر بعضی محصولات احتمالا در ارتباط با نوع و میزان رنگدانه های موجود در رقم توت است. به طورکلی شدت و شفافیت رنگ یک محصول در نتیجه وجود پیگمان های موجود در میوه و همچنین فرایندهای قهقهه ای شدن غیر آنزیمی و کارامیلیزاسیون انجام شده در حین فراوری آن است. در تولید کنسانتره توت، به علت بالا بودن درصد قند توت، قسمت اعظم رنگ آن مربوط به واکنش های کاراملی شدن در حین تغییض می باشد. همچنین با لا بودن درصد قند در توت بخارا نسبت به توت خاردار، موضوع عنوان شده را تایید کرده و نشان می دهد در کنسانتره حاصل از توت بخارا ترکیبات کاراملی بیشتر در حین تغییض ایجاد می شود. میانگین نتایج به دست آمده در جدول ۶، نشان می دهد روش تغییض آبمیوه در شرایط اتمسفری و در شرایط خلا (تبخیر کننده چرانخان^۱ تحت خلا) بر اسیدیته و pH و اندیس های * L^* , a^* و b^* تاثیر داشته و اختلافات آنها در سطح ۱ درصد معنی دار بودند.

کاربرد شیوه تغییض در شرایط خلا به منظور جلوگیری از ایجاد تغییرات نامطلوب ایجاد شده در طعم و رنگ در نتیجه استفاده از فرایندهای حرارتی طولانی مدت در دماهای بالا، می باشد. گزارشات زیادی وجود دارد که نشان می دهد بسیاری از واکنش ها در طی فرایندهای حرارتی بر رنگ محصول تاثیر گذاشته اند. معمول ترین آنها تجزیه پیگمانها مخصوصا کاروتونوئیدها، آنتوسیانین ها، کلروفیل ها و واکنش های قهقهه ای شدن نظیر مایلارد، کارامیلیزاسیون، قهقهه ای شدن آنزیمی و اکسیداسیون اسید

رنگ یکی از مهمترین فاکتورها در کیفیت محصول به دست آمده از میوه ها نظیر مریبا، مارمالاد، سس، رب و کنسانتره آنها است که تحت تاثیر رقم و نحوه فراوری (میزان حرارت و زمان حرارت دهی) میوه می باشد. فرایندهایی نظیر خشک کردن، تغییض و پختن می تواند روی رنگ به میزان قابل ملاحظه ای تاثیرگذار باشند. رنگ محصولات فراوری شده می تواند به صورت اندیس های * L^* , a^* و b^* با استفاده از دستگاه رنگ سنج اندازه گیری و بیان شود. در این سیستم ارزیابی، اندیس * L^* در بازه صفر (تاریکی) تا ۱۰۰ (روشنایی) و اندیس * a در بازه (-۱۲۰) (سبزی) تا (+۱۲۰) (قرمزی) و اندیس * b از -b (آبی) تا +b (زردی) متغیر است [۱۲].

اثرات رقم و زمان برداشت محصول گوجه فرنگی بر مشخصات کیفی رب گوجه فرنگی حاصل در یک پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی بیان شده که رنگ از جمله فاکتورهای فیزیکی مهم در ارزیابی فراورده های گوجه فرنگی است. لیکوپن و بتاکاروتون عامل اصلی رنگ در گوجه فرنگی است. مقدار این ترکیبات در گوجه فرنگی بستگی به رقم آن و شرایط محیط کشت و رشد محصول دارد و اندیس های * L^* , a^* و b^* به دست آمده از دستگاه رنگ سنج اثرات رقم و زمان برداشت گوجه فرنگی را بر تغییرات رنگ فراورده ها نشان می دهد [۱۳]. در پژوهش حاضر اختلاف معنی داری در رنگ کنسانتره های به دست آمده از دو رقم توت مورد استفاده وجود دارد (جدول ۶). کنسانتره های به دست آمده از توت بخارا بیشترین میزان شفافیت (L*) = ۱۷/۷۸۸ را نسبت به شیره های به دست آمده از رقم توت خاردار (L*) = ۱۷/۱۱۸ داشت. میزان سبزی / قرمزی (*a) محصولات در محدوده ۰/۹۶۴ تا ۰/۱۲۷ و میزان آبی / زردی (*)b نمونه ها در محدوده ۰/۸۴۲ تا ۱/۳۰۲ بودند. کنسانتره های به دست آمده از رقم بخارا دارای بیشترین مقادیر در اندیس های * L^*

1. Rotary evaporator

یابد در نتیجه رنگ روشن تر و شفاف تری حاصل می شود (اندیس بالای *L). از آنجا که در شرایط خلا، امکان بالا رفتن زیاد دما وجود ندارد، رنگدانه های قهقهه ای کمتر تشکیل شده و اندیس *a مربوط به رنگ نمونه ها، در شرایط خلا بیشتر از شرایط اتمسفری تعیین شد. این اندیس در ارتباط با رنگدانه های قهقهه ای ناشی از کاراملیزاسیون نبوده و مربوط به قرمزی بیشتر نمونه های تغليظ شده در خلا است [۱۹]. بالا بودن هر دو اندیس رنگی L و a در شرایط تغليظ تحت خلا نسبت به شرایط تغليظ در شرایط اتمسفری، منافی با نتایج پژوهش های انجام شده در این زمینه، ندارند. با افزایش زمان تغليظ که در شرایط خلا رخ می دهد اندیس *a زیاد می شود و بالا بودن این اندیس در ارتباط با رنگ قهقهه ای حاصل از ترکیبات کاراملی نیست. در خشک کردن میوه ها نیز اندیس *a میوه افزایش می یابد که مطالعات زیادی در این زمینه صورت گرفته است. همچنین نمونه های غلیظ شده در خلا اسیدیته کمتر و pH بیشتر داشتند که ممکن است این موضوع در ارتباط با تبخیر و فراریت بسیاری از اسیدها در حین تغليظ باشد [۲۰].

آسکوربیک هستند. اندیس های *L، *a و *b در یک محصول در حین حرارت تغییر می کنند [۱۴].

گزارش شده در یک پژوهش روی تغليظ آب انار، اندیس های مربوط به رنگ آبمیوه در حین حرارت دهی تغییر کردند [۱۵]. نظری این گزارش در تحقیقات انجام شده بر پوره آبه، پوره هلو و گوجه فرنگی، موجود است [۱۶-۱۸].

در پژوهش حاضر اندیس های *L، *a و *b نمونه های کنسانتره توت که تغليظ آنها در شرایط خلا انجام شدند به صورت معنی داری از اندیس های رنگی نمونه های تغليظ شده در شرایط اتمسفر، بیشتر بودند.

با مشاهده جدول ۶ می توان گفت رنگ نمونه های کنسانتره در شرایط خلا، دارای قرمزی و زردی بیشتر و همچنین شفافیت و روشنایی بیشتر از نمونه های تغлиظ شده در شرایط اتمسفر بودند. به طور کلی می توان گفت تغليظ آبمیوه در شرایط خلا باعث ایجاد رنگ مناسب نسبت به حالت تغليظ در شرایط اتمسفری می شود علت را می توان طور توجیه کرد که در خلا نقطه جوش کاهش یافته و فرایند تغليظ در دمای پایین تر انجام می شود بنابراین امکان انجام واکنش های کاراملی شدن کاهش می

Table 6 Comparison of the effect of concentration procedure on mean of acidity, pH and L^* , a^* , b^* of concentrated mulberry

L*	b*	a*	pH	Acidity (%)	Concentration condition
17.27 ^b	0.96 ^b	0.28 ^b	5.62 ^b	0.631 ^a	Atmospheric
17.64 ^a	1.19 ^a	0.56 ^a	5.72 ^a	0.586 ^b	Vacuum

Different superscripts within the column represent significant difference at $p < 0.01$ (Duncan test)

علت کاهش اسیدیته را می توان به انجام واکنش های قهقهه ای شدن مایلارد نسبت داد. احتمال بروز این واکنش ها در فراورده های غذایی با درصد قند و پرتوتین بالا، بسیار زیاد است. پژوهشی با عنوان قهقهه ای شدن غیر آنزیمی در طی نگهداری شیره انگور جامد انجام شد. محققان در این پژوهش، تغییرات اسیدیته را در محصول نهایی مورد بررسی قرار دادند. نتایج به دست آمده در این پژوهش با یافته های پژوهه حاضر مطابقت دارد [۵].

قهقهه ای شدن رایج ترین مشکل کیفی در تولید و نگهداری کنسانتره آبمیوه های شیرین می باشد و این واکنش ها در بیشتر

نمونه های کنسانتره توت به دست آمده در شرایط دمایی یکسان (پیچال ۴°C) نگهداری شدن و آزمایش های اسیدیته، pH و پارامترهای رنگی در فواصل زمانی ۳ ماه، برای نمونه ها انجام شدند. داده های موجود در جدول ۷ نشان می دهد در طی ۹ ماه نگهداری کنسانتره توت، اختلافات معنی داری در اسیدیته، pH و اندیس های *L، *a و *b ایجاد شد. به طوری که اسیدیته از ماه سوم نگهداری تا ماه ششم، کاهش و سپس تا ماه نهم نگهداری، افزایش یافت و pH نیز در سه ماهه دوم کاهش و سپس بدون تغییر ماند.

تعیین برخی خواص فیزیکو شیمیایی و زمان مناسب نگهداری...

تجزیه قندها در دماهای بالا و واکنش های مایلارد بین اسیدهای آمینه و قندهای احیا انجام می شود که باعث ایجاد تغییراتی در رنگ و طعم محصول مورد نظر می شود [۲۱].

محصولات مشابه نظیر شیره های میوه ای نیز رخ می دهد. واکنش های قهقهه ای شدن غیر آنزیمی به دو صورت واکنش های کاراملیزاسیون و مایلارد انجام می شوند. کاراملیزاسیون با

Table 7 Comparison of the effect of storage time on mean of acidity, pH and L^* , a^* , b^* of the samples of concentrated mulberry

L^*	b^*	a^*	pH	Acidity (%)	Storage time (month)
17 ^c	1.18 ^a	0.37 ^c	6.15 ^a	0.632 ^a	3
17.12 ^b	1.13 ^b	0.42 ^b	5.43 ^b	0.583 ^b	6
18.25 ^a	0.9 ^c	0.46 ^a	5.43 ^c	0.611 ^c	9

Different superscripts within the column represent significant difference at ($p < 0.01$, Duncan test)

نتایج میانگین اثرات متقابل رقم توت و روش تغییط بر صفات اسیدیته، pH و ان迪س های * L , * a^* و * b رنگ کنسانتره های توت در جدول ۸ آورده شده است. کمترین اسیدیته و بیشترین pH مربوط به تیمار توت بخارا و تغییط در شرایط خلا است. بیشترین میزان قرمزی و شفافیت رنگ مربوط به تیمار کنسانتره به دست آمده از توت بخارا و تغییط شده در شرایط خلا است.

در پژوهش حاضر نیز واکنش های ذکر شده در حین تولید و نگهداری کنسانتره توت انجام شدند و باعث ایجاد رنگ در نمونه ها شدند به طوری که مقادیر ان迪س * a^* (قرمزی) در طول زمان نگهداری به تدریج افزایش و ان迪س * b (زردی) به تدریج کاهش و ان迪س * L (شفافیت) افزایش یافت.

Table 8 Comparison of the interaction effects of mulberry variety and concentration procedures on mean of acidity, pH and L^* , a^* , b^* of the samples of concentrated mulberry

L^*	b^*	a^*	pH	Acidity (%)	Treatment
17.43 ^b	1.08 ^b	0.69 ^b	5.78 ^b	0.391 ^c	Bokhara mulberry + concentration in atmosphere
18.15 ^a	1.53 ^a	1.24 ^a	5.92 ^a	0.346 ^d	Bokhara mulberry + concentration in vacuum
17.11 ^c	0.84 ^c	-0.12 ^c	5.45 ^d	0.871 ^a	Khardar mulberry + concentration in atmosphere
17.13 ^c	0.84 ^c	-0.13 ^c	5.52 ^c	0.825 ^b	Khardar mulberry + concentration in vacuum

Different superscripts within the column represent significant difference at ($p < 0.01$, Duncan test)

بیشترین اسیدیته مربوط به تیمار توت خاردار و ۳ ماه نگهداری و کمترین اسیدیته مربوط به تیمار توت بخارا و ۶ ماه نگهداری بود. با ارزیابی صفت pH در بین تیمارها، مشاهده می شود که در سطح ۱ درصد، بین تیمارها اختلاف معنی دار وجود دارد. بیشترین pH مربوط به تیمار کنسانتره توت به دست آمده از توت بخارا پس از ۳ ماه نگهداری بود و کمترین pH متعلق به کنسانتره توت خاردار بعد از ۹ ماه نگهداری بود. بیشترین قرمزی

میانگین های اسیدیته، pH و ان迪س های * L , * a^* و * b کنسانتره توت در نتیجه اثرات متقابل رقم توت مورد استفاده در تهیه کنسانتره و زمان نگهداری نمونه ها در جدول ۹ مقایسه شده اند. در مورد صفت اسیدیته بین تیمارهای توت بخارا و ۳ ماه نگهداری و توت بخارا و ۶ ماه نگهداری اختلاف معنی دار وجود نداشت. همچنین اختلافات بین تیمارهای توت خاردار و ۶ ماه نگهداری و توت خاردار و ۹ ماه نگهداری بی معنی بودند.

متعلق به تیمار کنسانتره توت بخارا و ۶ ماه نگهداری است. بیشترین شفافیت (اندیس L) تیمارها مربوط به کنسانتره توت بخارا و ۹ ماه نگهداری است. با مشاهده نتایج جدول مشخص می‌شود شفافیت رنگ نمونه‌ها (زلالیت) در طول زمان افزایش می‌یابد.

از کنسانتره توت بخارا و پس از ۹ ماه نگهداری حاصل شد هرچند اختلاف معنی داری با کنسانتره توت بخارا و ۶ ماه نگهداری نداشت. علت افزایش رنگ قرمز در طول زمان احتمالاً مربوط به واکنش‌های اسیدهای آمینه و قندهای احیا (ماپلارد) است. بیشترین اندیس b که در ارتباط با رنگ زرد کنسانتره است

Table 9 Comparison of the interaction effects of mulberry variety and storage time on mean of acidity, pH and L^* , a^* , b^* of the samples of concentrated mulberry

L^*	b^*	a^*	pH	Acidity (%)	Treatment
17.26 ^d	1.34 ^b	0.95 ^b	6.24 ^a	0.376 ^c	Bokhara mulberry + 3 month storage
17.44 ^c	1.42 ^a	0.96 ^{ab}	5.64 ^d	0.331 ^d	Bokhara mulberry + 6 month storage
18.66 ^a	1.15 ^c	0.98 ^a	5.68 ^c	0.398 ^c	Bokhara mulberry + 9 month storage
16.73 ^e	1.03 ^d	-0.21 ^e	6.05 ^b	0.888 ^a	Khardar mulberry + 3 month storage
16.79 ^e	0.84 ^e	-0.11 ^d	5.22 ^e	0.834 ^b	Khardar mulberry + 6 month storage
17.83 ^b	0.64 ^f	-0.06 ^c	5.19 ^f	0.823 ^b	Khardar mulberry + 9 month storage

Different superscripts within the column represent significant difference at ($p < 0.01$, Duncan test)

pH کنسانتره توت در اثر تغليظ در خلا پس از ۳ ماه نگهداری به دست آمد. بالاترین اندیس‌های * a* و * b رنگ نمونه‌ها در نتیجه تغليظ در خلا و ۶ ماه نگهداری و شفاف ترین کنسانتره توت از تغليظ آب توت در خلا پس از ۹ ماه نگهداری حاصل شدند.

مقایسه میانگین اثرات متقابل نحوه تغليظ و زمان نگهداری بر اسیديته، pH و انديس هاي * L ، a* و * b کنسانتره توت در جدول ۱۰ آورده شده است. کمترین اسیديته درنتیجه تغليظ آبمیوه در خلا پس از ۶ ماه نگهداری حاصل شد. همانطور که مشاهده میشود بین تیمار تغليظ در خلا و ۶ ماه نگهداری و تغليظ در خلا و ۳ ماه نگهداری اختلاف معنی دار وجود ندارد. بیشترین

Table 10 Comparison of the interaction effects of concentration procedure and storage time on mean of acidity, pH and L^* , a^* , b^* of the samples of concentrated mulberry

L^*	b^*	a^*	pH	Acidity (%)	Treatment
16.98 ^d	1.07 ^c	0.11 ^f	6.08 ^b	0.680 ^a	concentration in atmosphere + 3 month storage
16.86 ^d	0.93 ^d	0.16 ^e	5.4 ^e	0.601 ^{bc}	concentration in atmosphere + 6 month storage
17.97 ^b	0.87 ^e	0.57 ^c	5.37 ^f	0.613 ^b	concentration in atmosphere + 9 month storage
17.03 ^d	1.3 ^b	0.63 ^b	6.21 ^a	0.584 ^{cd}	concentration in vacuum + 3 month storage
17.37 ^c	1.33 ^a	0.69 ^a	5.46 ^d	0.565 ^d	concentration in vacuum + 6 month storage
18.53 ^a	0.92 ^d	0.35 ^d	5.5 ^c	0.609 ^{bc}	concentration in vacuum + 9 month storage

Different superscripts within the column represent significant difference at ($p < 0.01$, Duncan test)

- on quality properties of Mulberry concentrate. Agricultural Engineering Research Institute.
- [10] Iqbal, M., Khan, M. K., Jilani, M. S and Khan, M. M. 2010. Physico-chemical characteristics of different Mulberry cultivars grown under agro-climatic conditions of Miran shahr, North waziristan (khyber pakhtunkhwa), Pakistan. Journal Agriculture Research, 48 (2): 209-217.
- [11] Elmac, Y. and Altuq, I. 2002. Flavour evaluation of three black mulberry (*Morus nigra*) cultivars using GC/MS, chemical and sensory data. Journal Science Food and Agriculture, 82(6): 632-635.
- [12] Yildiz, O and Alpaslan, M. 2012. Rose Hip Marmalade, Food Technology Biotechnology, 50 (1): 98–106.
- [13]. Tehrani, M. M., Ghandi, A., Vriesekoop, F. 2006. Effect of variety and harvest time on tomato paste qualitative characteristics. Profdoc.um.ac.ir/articles/a/1010472.d.
- [14] Assawarachan, R and Noomhorm, A. 2010. Changes in color and rheological behavior of pineapple concentrate through various evaporation methods. International Journal of Agriculture and Biology Engineering, 3(1): 74-84.
- [15] Maskan, M. 2006. Production of pomegranate juice concentrate by varrious heating methods, color degradation and kinetics. Journal of Food Engineering, 72: 218-224.
- [16]. Ahmed J, Shivhare U S., Kaur, M. 2002. Thermal color degradation kinetics of mango puree. International Journal of Food Properties, 5(2):359-366.
- [17] Avila, I M L B., Silva, C L M. 1999. Modeling kinetics of thermal degradation of color in peach puree. Journal of Food Process Engineering, 39: 161-166.
- [18] Barbosa, C. G. V and Peleg, M. 1983. Flow parameters of selected commercial semi-liquid products. Journal of texture studies, 14: 213-234.
- [19] Yasaei Mehrjerdi, P., Ghiasi Tarzi, B., Basiri, A., Bameni Moghadam, M., Esfandiari, C. 2011. Determination optimize conditions of vaccum frying of pumpkin. Journal of Food Science and Technology, 3 (3): 61-69.
- [20] Elhadad, A. S., Alwakdi, O. M., Abusheta, A and Abdulsalam, F. 2013. Effect of Vacuum

۴- نتیجه گیری کلی

نتیجه کلی به دست آمده از داده های موجود در جداول مقایسه میانگین ها برای تعیین مناسب ترین کنسانتره توت از نظر رنگ و همچنین زمان مناسب نگهداری این است که از توت بخارا برای تهیه کنسانتره استفاده شود. تغییط در شرایط خلا (تبخیر کننده چرخان تحت خلا) نسبت به تغییط در شرایط اتمسفر باعث تولید کنسانتره با رنگ شفاف تر شد. کنسانتره های تولیدی تا مدت ۹ ماه با حفظ کیفیت قابلیت نگهداری داشتند.

۵- منابع

- [1] Shahrestani, N. 1998. Berry fruits of Iran. Gilan university. 131-150.
- [2] De Escalada Pla, M. F., Ponce, N. M., Stortz, C. A., Gerschenson, L. N., Rojas, A. M. 2007. Composition and functional properties of enriched fiber products wissenchaft and technologie, 40: 1176-1185.
- [3] Agricultural statistics of horticultural products, Volume III. 2013. Ministry of Jahad – E – Agriculture, Department of Economic Planning, Center of Information and Communication Technology.
- [4] Alpaslan, M and Hayta, M. 2002. Rheological and sensory properties of pekmez (grape molasses /tahin) (sesame paste blends). Food Engineering, 54: 89-93.
- [5] Tosun, I and Sule Ustun, N. 2003. Noneenzymic browning during storage of white hard grape pekmez (Zile Pekmezi). Food Chemistry, 80: 441-443.
- [6] Sengul, M., Fatih Ertugay, M., Sengul, M. 2005. Rheological, physical and chemical characteristics of mulberry pekmez. Food Control, 16: 73-76.
- [7] Simsek, A., Artik, N., Baspinar, E. 2004. Detection of raisin concentrate (Pekmez) adulteration by regression analysis method. Food Composition and Analysis, 17: 155-163.
- [8] Akbulut, M and Bilgilci, N. 2010. Effects of different pekmez (fruit molasses) types used as a natural suger source on the batter rheology and physical properties of cakes. Food Process Engineering, 33(2): 272-286.
- [9] Basiri, S. 2014. Investigation on the effect of different conditions of processing and storage,

[21] Bozkurt, H., Fahrettin Göğüş, F and Sami Eren, S. 1999. Nonenzymic browning reactions in boiled grape juice and its models during storage. *Food Chemistry*, 64 (1): 89–93.

concentration on the properties of apricot and peach juices. 3rd International Conference on Ecological, Environmental and Biological Sciences (ICEEBS'2013) January 26-27, Hong Kong (China).

Determination of some of physico-chemical the properties and suitable storage time of concentrated mulberry in Khorasan region

Basiri, Sh. ^{1*}

1. Assistant Professor , Agricultural Engineering Research Department , Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research Center, AREEO, Mashhad, Iran

(Received: 2015/04/27 Accepted: 2015/11/25)

White mulberry is native to China, Iran and Turkey. Since the mulberry has a lot of water, so its sensitive to handling and its maintenance is very hard and its waste is high. Mulberry molasses is one of the traditional foods in Iran that is concentrated from mulberry juice. It has a high nutritional value. The aim of this research is determination some of the physicochemical properties and suitable shelf life of produced molasses of two cultivars of white mulberry in Khorasan province. The cultivars of Bokhara and Khardar mulberry are used for concentration. The concentration process at 2 levels (vacuum and atmospheric conditions) were done until the brix of final product reaches 70. The acidity, pH and color experiments of the samples were done every 3 months. The experimental design was factorial in frame of complete randomized was performed in 3 replications. The result showed the effects of cultivar and concentration method in mulberry processing were significant. The shelf life of the products with high quality were determined up to 9 months. The sensory characteristics of final products such as L* a* b* color indexs were in acceptable range. The best mulberry molasses was made of Bokhara mulberry in vacuum concentration condition.

Key words: Color, Concentrated Mulberry Juice, Physicochemical Properties, Storage.

*Corresponding Author's Email Address: shbasiri35@yahoo.com