

بررسی اثر جایگزینی نیتریت با نگهدارنده طبیعی عصاره کرفس بر روی خصوصیات آنتیاکسیدانی، ضد میکروبی، حسی و رنگ سوسيس کوکتل گوشت مرغ

علیرضا ملکی کهکی^۱، محمد باقری^{۲*}، لیلا ناطقی^۳

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد محلات، گروه علوم و صنایع غذایی، محلات، ایران

۲- استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد محلات، گروه شیمی، محلات، ایران

۳- استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین پیشوای، گروه علوم و صنایع غذایی، ورامین، ایران

(تاریخ دریافت: ۹۵/۰۴/۱۵ تاریخ پذیرش: ۹۵/۱۲/۰۴)

چکیده

مشخص شده است که مصرف نگهدارنده‌های سنتزی از جمله نیتریت و املاح آن در فرآورده‌های گوشتی می‌تواند مخاطراتی را در رابطه با سلامت مصرف کنندگان ایجاد کند. از این رو تلاش‌هایی برای کاهش این ماده در فرآورده‌های گوشتی انجام شده است. هدف از این مطالعه جایگزینی غلظت‌های ۰، ۲۰، ۴۰، ۶۰ و ۸۰ و ۱۰۰٪ عصاره کرفس با نیتریت در سوسيس‌های کوکتل حاوی ۵۵٪ گوشت مرغ در مدت زمان ۱، ۱۰، ۲۰ و ۳۰ روز نگهداری در یخچال انجام شده و اثرات آنتیاکسیدانی و نیز حفظ رنگ و خصوصیات حسی این فرآورده‌ها مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که نمونه سوسيس حاوی ۶۰٪ عصاره کرفس از نظر شاخص a^* (شدت قرمزی) مطلوب‌ترین نمونه است. از نظر خواص آنتیاکسیدانی، سوسيس حاوی ۲۰٪ عصاره کرفس بهترین فعالیت آنتیاکسیدانی را از خود نشان داد. همچنین از نظر خواص حسی (طعم و بو) نمونه حاوی ۶۰٪ عصاره کرفس از لحاظ آماری تفاوت معنی‌داری با نمونه شاهد نداشت ($p < 0.05$).

کلید واژگان: فرآورده‌های گوشتی، ماندگاری، نگهدارنده طبیعی

* مسئول مکاتبات: mo_bagheri@yahoo.com

گزارش شده است که سطح نیترات در عصاره کرفس برابر با ۲۱۴ قسمت در میلیون است که بعد از خشک کردن عصاره و تبدیل آن به پودر به ۲۷۴۶۲ قسمت در میلیون افزایش می‌یابد [۱۲]. عصاره کرفس به دلیل داشتن رنگدانه کارتوئنیوئیدی لوئین و زیئنین رنگی زرد-نارنجی تا قرمز داشته و می‌تواند به عنوان رنگدانه در جهت بهبود رنگ فراورده‌های گوشتی، که وجود رنگ قرمز در آن‌ها مطلوب است، مورد استفاده قرار گیرد [۱۳ و ۱۴]. در واقع پالپ قرمز نارنجی که اطراف دانه‌های کرفس را پوشانده است به عنوان ماده خام برای تهیه ماده رنگی عصاره کرفس، به کار می‌رود [۸]. هدف از این مطالعه بررسی اثر عصاره کرفس بر خصوصیات میکروبی، آنتیاکسیدانی و رنگ سوسیس‌های حاوی گوشت مرغ در طول دوره نگهداری در شرایط سرد بود.

۲- مواد و روش‌ها

تهیه نمونه سوسیس

سوسیس‌های کوکتل حاوی ۵۵٪ گوشت مرغ مطابق با فرمولاسیون استاندارد مورد استفاده در کارخانه فراورده‌های گوشتی پر迪س شامل ۱/۶۵ گرم گوشت مرغ، ۰/۷۵ گرم پنیر، ۰/۲ گرم یخ، ۰/۱۲ گرم روغن مایع، ۰/۱۰ گرم آرد، ۰/۰۶ شیرخشک، ۰/۰۶ سیر، ۰/۰۶ ادویه (نمک، فلفل سیاه و جوز هندی)، ۰/۰۵ نمک طعام و ۰/۰۱ فسفات سدیم به ازای ۳ کیلوگرم خمیر تهیه شدند. پس از مخلوط شدن مواد اصلی مطابق با روش‌های معمول در صنعت، نیتریت سدیم و عصاره کرفس به نسبت‌های زیر به خمیر اضافه گردید: (۱۰۰:۰، ۲۰:۸۰، ۴۰:۶۰، ۶۰:۴۰، ۸۰:۲۰، ۱۰۰:۰). سوسیس‌های تهیه شده پس از پرشدن در پوشش به اتاق پخت منتقل شدند. نمونه‌ها پس از طی ۱، ۱۰ و ۲۰ روز نگهداری در سردخانه، از نظر رنگ، خاصیت آنتیاکسیدانی و خصوصیات حسی مورد آزمون قرار گرفتند.

تهیه عصاره کرفس

تهیه عصاره کرفس به روش قلیایی و با استفاده از روش معرفی شده توسط حق پرست (۱۳۸۱) انجام گرفت [۸]. در این روش رنگ کرفس از پری کارپ دانه‌های گیاه کرفس و توسط تکان

۱- مقدمه

اخیرا با توسعه زندگی مدرن، مصرف فراورده‌های گوشتی مانند سوسیس و کالباس در بین مردم رواج بیشتری یافته است [۱]. فراورده‌های گوشتی علاوه بر گوشت، که منبع تغذیه‌ای مهمی برای انسان‌ها محسوب می‌شود، حاوی چربی و اسیدهای چرب اشیاع، نمک‌های کلرید و نیتریت سدیم نیز هستند [۲ و ۳]. نمک‌های نیتریت سدیم غالبا به عنوان آنتیاکسیدان و تثیت کننده رنگ و به منظور به تأخیر اندختن فساد میکروبی این فراورده‌ها به آن‌ها اضافه می‌شوند [۴]. با این حال مشخص شده است که مصرف زیاد نیتریت از طرفی به دلیل درگیر شدن در اکسیداسیون هموگلوبین نرمال و تبدیل آن به مت‌هموگلوبین، که قادر به انتقال اکسیژن به بافت‌ها نیست، و از طرف دیگر به خاطر واکنش با آمین‌ها و آمیدها و تولید ترکیبات ان-نیتروز سرطان‌زا برای سلامتی انسان مخاطره آمیز است [۵]. بنابراین گفته شده است که در صورت استفاده از نیتریت سدیم، میزان آن در فرآورده نهایی نباید از ۱۲۰ ppm بیشتر گردد [۵]. اخیرا محققان به دنبال استفاده از جایگزین‌های طبیعی به جای نیتریت در صنعت گوشت هستند تا هم کیفیت فراورده‌ها تا حد قابل قبولی حفظ گردد و هم از فساد زود هنگام آن‌ها جلوگیری شود؛ در این رابطه بسیاری از محققان به استفاده از عصاره‌های گیاهان به عنوان منابع خوب آنتیاکسیدانی و ضد میکروبی روی آوردند [۶]. در این بین کرفس^۱ از خانواده *Umbelliferae* با نام علمی *Apium graveolens* گیاهی دو ساله بوده که به طور معمول در سال اول برگ تولید کرده و در سال دوم بذر تولید می‌کند [۷]. واریته‌های مختلف کرفس شامل کرفس برگی، کرفس قمری و کرفس معمولی می‌باشد که نوع اخیر در ایران در سطح نسبتاً وسیعی کشت می‌شود [۸]. کرفس دارای ترکیباتی نظیر اولورزین، قندهایی چون مانیت و اینزیت، اسیدهای آمینه‌ای مانند آسپارژین، تیروزین، کولین، و ترکیبات فلاونونئید و آنتیاکسیدانی است [۹]. همچنین اثرات ضد میکروبی عصاره کرفس در برابر کلسنیکوایوم بوتولونیوم نیز اثبات شده است [۱۰ و ۱۱]. از طرفی کرفس به عنوان منبع طبیعی نیترات نیز مورد توجه بوده و

1. Celery

میانگین بازده اسانس بدست آمده به روش نسبت به وزن خشک گیاه بود.

مشخصات دستگاه کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی

دستگاه گاز کروماتوگرافی استفاده شده از نوع Agilent 6890 با ستون HP-5MS به طول ۳۰ متر، قطر داخلی ۰/۲۵ میلی متر و ضخامت لایه نازک ۰/۰۲۵ میکرومتر بود. دمای ابتدایی آون ۵۰ درجه سانتی گراد، با سرعت ۳ درجه سانتی گراد در دقیقه افزایش یافت. دمای اتفاق تزریق ۲۹۰ درجه سانتی گراد بود و از گاز هلیوم به عنوان گاز حاصل (با سرعت جریان ۰/۸ میلی لیتر در دقیقه) استفاده شد. طیف سنج جرمی مدل Agilent 6890 با ولتاژ یونیزاسیون ۷۰ الکترون ولت و روش یونیزاسیون EI با دمای منبع یونیزاسیون ۲۲۰ درجه سانتی گراد مورد استفاده قرار گرفت.

آزمایش دی پی پی اچ^۲

توانایی دادن اتم هیدروژن یا الکترون عصاره کرس از طریق بی رنگ شدن محلول اتانولی دی پی پی اچ اندازه گیری می شود. ۲ و ۲ دی فنیل - ۱ - پیکریل هیدرازیل یک ترکیب رادیکالی پایدار با رنگ بنفش می باشد که با احیا شدن توسط عناصر دهنده الکترون یا هیدروژن (ترکیبات آنتی اکسیدانی) به دی فنیل پیکریل هیدرازین زرد رنگ تبدیل می شود [۲۰]. در این روش به عنوان ترکیبات رادیکالی پایدار از ماده دی پی پی اچ به عنوان معرف استفاده شد. بدین ترتیب که ۵۰ میکرولیتر از غلظت های مختلف اسانس در متابولو به ۵ میلی لیتر محلول ۰/۰۰۴ درصد دی پی پی اچ در متابولو اضافه گردید. بعد از ۳۰ دقیقه گرمخانه گذاری در دمای اتاق جذب نوری نمونه ها در طول موج ۵۱۷ نانومتر در برابر شاهد قرائت شد و درصد مهار شدن رادیکال های آزاد با استفاده از فرمول زیر محاسبه گردید.

$$100 = (\text{Ablank} - \text{Asample}) / \text{Ablank}$$

در این فرمول Ablank جذب نوری کنترل منفی را که فاقد عصاره می باشد را نشان میدهد و Asample میزان جذب نوری غلظت های مختلف عصاره را بیان می کند.

دادن در محلول ۰/۰۱ مولار پتاسیم هیدروکسید^۱ استخراج می شود. سپس عمل صاف کردن انجام می گیرد تا ناخالصی ها جدا شوند، برای تصفیه محصول، پیگمان ها با هیدروکلریک اسید رسوب داده شده، صاف شده و خشک می شوند؛ رسوبات خشک شده به منظور حذف بوهای نامطلوب با پترولیوم اتر شستشو داده شدن. در انتها پیگمان ها با قلیاً مخلوط شده و در آب حل می شوند.

ارزیابی رنگ

برای ارزیابی رنگ نمونه ها از دستگاه هانترلب (japan, Colorimeter, Minolta CR-400) استفاده شد. دستگاه با دو کاشی سیاه و سفید رنگ کالبیره شده و برش هایی از مقطع عرضی سوسیس ها با قطر مساوی تهیه گردید. برش های سوسیس در فنجانک های مخصوص قرار داده شده و یک ظرف سیاه رنگ و مات نیز برای جلوگیری از تداخل نورهای خارجی بر روی فنجان قرار داده شد؛ سپس سه فاکتور a*, b*, L* نمونه ها که به ترتیب بیانگر زردی، قرمزی و روشنی نمونه ها هستند مورد ارزیابی قرار گرفت [۱۵].

اندازه گیری شاخص های میکروبی

شمارش کلی میکروارگانیسم براساس استاندارد ملی ایران شماره ۵۲۷۲ و به کمک محیط کشت PCA انجام شد [۱۶]. در این تحقیق کپک و مخمر مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۹۹۷ و به کمک محیط کشت DRBC، کلستریل بیوم پرفرازنر مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۲۱۹۷ مورد بررسی قرار گرفتند [۱۷].

استخراج روغنها فرار

بخش های هوایی گیاه در هوای اتاق خشک و مواد خشک شده (۵۰ گرم از هر نمونه، با سه تکرار) به روش تقطیر با آب ، به مدت ۴ ساعت اسانس گیری شد [۱۹] روغنها استخراج شده به وسیله سولفات سدیم بی آب خشک و در درجه حرارت ۴ درجه سانتی گراد نگهداری شد تا برای تجزیه به وسیله دستگاه کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی مورد استفاده قرار گیرد.

2. 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl = DPPH

1. KOH

افزار 16 SPSS انجام شد. فاکتورهای معنی دار با آزمون های چند دامنه ای دانکن با سطح اطمینان ۹۵ درصد مورد تحلیل قرار گرفتند. همچنین برای رسم نمودارها از نرم افزار Excel استفاده شد.

٣- بحث و نتائج

ارزیابی، رنگ فر اور دهها

مقایسه میانگین شاخص شفافیت و روشنایی محصول (L^*) نشان داد که سوپسیس‌های حاوی٪۱۰۰ عصاره تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارند، همچنین بین نمونه‌های با٪۲۰،٪۴۰ و٪۶۰ عصاره نیز تفاوت معنی داری وجود نداشت ($P > 0.05$)، با این حال جز در نمونه حاوی٪۱۰۰ عصاره، در تمامی نمونه‌ها با افزایش میزان عصاره در سوپسیس شاخص، L^* کاهش یافت اما این کاهش معنی دار نبود. در طول مدت نگهداری نیز نتایج نشان دادند که شاخص L^* در طول زمان به طور معنی داری کاهش می‌یابد. حسین پور و همکاران [۲۳] نتایج مشابهی را در رابطه با کاهش شاخص روشنایی گزارش نمودند. همچنین کیم و همکاران [۲۴] که بر روی فیبر گندم رنگ‌آمیزی شده با رنگدانه‌های استخراج شده از آفتابگردان کار می‌کردند، گزارش کردند که با افزایش میزان فیبر رنگ شده در سوپسیس‌ها، شاخص شفافیت کاهش می‌یابد. این نتایج مشابه با نتایج حاصل از کار ما بد. نتایج مشابهی، نیز توسط خالق و همکاران [۲۵] گزارش شد.

اڑے یاں، اکسید اسیوں ن لیڈھا

میزان اکسیداسیون چربی نمونه‌های سوسمیس به روش تیوباریتوريک اسید، انجام گرفت [۲۱]. ۱۰ گرم نمونه وزن شده و ۳۵ میلی لیتر اسید پرکلریک ۴٪ و نیز یک میلی لیتر محلول BHT ۰.۰۵٪ در اتانول هموژن شد. مخلوط با کاغذ واتمن صاف شده و ۵ میلی لیتر محلول صاف شده با ۵ میلی لیتر تیوباریتوريک اسید ۰.۰۲ مولار درون لوله آزمایش درب دار مخلوط گردیده و ۶۰ دقیقه در بن ماری آب جوش قرار داده شد. پس از خنک شدن، جذب نور با اسپکتروفوتومتر (Ningbo Mflab, NV203-GT211-NV203) در طول موج ۵۳۲ nm قرائت شده و میزان تیوباریتوريک اسید در کیلوگرم نمونه بر اساس میلی گرم مالان الدین (MDA) محاسبه شد.

ارزیابی حسی

بهترین نمونه تولیدی از نظر رنگ و خواص آنتی اکسیدانی توسط ۳۰ ارزیاب و در مقیاس هدونیک و در قالب طرح کاملاً تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه‌ها در هر یک از ویژگی‌های فوق بر اساس معیارهای عالی، خوب، متوسط، بد و بسیار بد به ترتیب با امتیازات ۰، ۲۵، ۵۰، ۷۵، ۱۰۰ مورد ارزیابی قرار گرفتند [۲۲].

تجزیه و تحلیل آماری

طرح آزمایشی مورد استفاده، به صورت آزمایش فاکتوریل با دو فاکتور نمونه سوسیس در ۶ سطح و فاکتور زمان در ۴ سطح در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی انجام شد. نتایج آزمایش ها به صورت میانگین \pm انحراف استاندارد بیان گردید. تجزیه و تحلیل دادهها با روش تجزیه واریانس (ANOVA)، با استفاده از نرم

Table 1 The effect of salary extract on the color parameters (L^*) of Chicken Cocktail Sausages during refrigerated storage (4 ± 1 °C)

	L*					
	Celery Extract(%)					
	0	20	40	60	80	100
day						
1	67.41 ^a	66.03 ^{bc}	66.31 ^b	66.33 ^b	65.68 ^{bcd e}	67.38 ^a
10	65.85 ^{bcd}	64.68 ^{efgh}	64.37 ^{fghi}	63.89 ^{ghi}	63.56 ⁱ	66.32 ^b
20	65.43 ^{bcd e}	64.99 ^{cdef}	64.67 ^{efgh}	64.91 ^{defg}	64.12 ^{fghi}	65.62 ^{bcd e}
30	65.89 ^{bcd}	64.68 ^{efgh}	64.24 ^{fghi}	64.03 ^{fghi}	63.61 ^{hi}	64.04 ^{fghi}

Values are reported as means (average of triplicate trial) \pm standard deviation; different small letters in a column and in each group mean the values differ significantly at $p < 0.05$. L* = lightness

نمونه دارای ۰/۰۰۲٪ کوچنیل و ۴ میلی‌گرم نیتریت مشابه با نمونه شاهد با ۱۲۰ میلی‌گرم نیتریت بوده و شاخص^{a*} یا میزان قرمزی در آن‌ها مشابه است ولی با افزایش مقدار جایگزینی این شاخص کاهش می‌یابد. از طرفی آن‌ها نشان دادند که با افزایش زمان نگهداری از هفته ۰ تا هفته چهارم نگهداری، مقدار این شاخص قرمزی در تمامی نمونه‌ها کاهش می‌یابد. این نتایج کاملاً با نتایج حاصل از کار ما در طول ۳۰ روز نگهداری مطابقت دارد. کیم و همکاران [۲۴] نشان دادند که شاخص قرمزی (a*) و زردی (b*) با افزایش میزان رنگدانه‌های آفت‌گردن در سوسمیس‌ها افزایش می‌یابد که می‌تواند به ایجاد رنگ مطلوب در سوسمیس‌های پخته کمک کند. در مطالعه‌ای دیگر نیز که جایوارданا و همکاران [۲۶] بر روی خواص آنتی‌اکسیدانی و رنگی ران مرغ بر روی سوسمیس‌های تهیه شده از گوشت مرغ ترتیب دادند، شاخص زردی و قرمزی پس از ۴ و ۵ هفته نگهداری تنها در نمونه‌های حاوی ۰/۰۲۵٪ عصاره‌ی ران مرغ به طور معنی‌داری بالا بود. پیروتی و همکاران [۲۶] نیز که ویژگی‌های رنگی سوسمیس‌های حاوی عصاره‌ی آویشن با غیر را مورد بررسی قرار دادند، نشان دادند که با افزایش میزان آویشن تا ۲٪، رنگ محصول بهبود یافته اما با افزایش میزان آن تا ۳٪ تاثیرات مطلوبی در رنگ محصول نمایان شده است.

در مورد شاخص^{b*} یا شاخص زردی، بیشترین و کمترین مقدار محصول یا به ترتیب در سوسمیس‌های حاوی ۰/۱۰۰٪ و ۰٪ عصاره مشاهده گردید؛ به علاوه در مقدار^{b*} با افزایش میزان عصاره از ۰٪ تا ۱۰۰٪ روند افزایش واضحی را در نمونه‌های سوسمیس نشان می‌دهد. همچنین میزان شاخص^{b*} در طول زمان نگهداری مورد آزمایش در روز اول بسیار بالا بوده ولی در فاصله زمان ۱۰ روز نگهداری تا ۳۰ روز نگهداری تفاوت معنی‌داری در میزان این شاخص مشاهده نمی‌شود. مقایسه میانگین شاخص^{a*}، که نشان دهنده رنگ قرمز است، نشان می‌دهد که سوسمیس‌های حاوی ۰/۸۰٪ عصاره بالاترین میزان این شاخص را دارند. از طرفی نمونه‌های حاوی ۰ و ۱۰۰٪ عصاره نیز از نظر آماری تفاوت معنی‌داری با یکدیگر ندارند؛ با این حال مقدار عددی شاخص^{a*} در سوسمیس‌های حاوی ۰٪ عصاره اندکی بالاتر از ۱۰۰٪ می‌باشد. مقایسه شاخص^{a*} در طی زمان نگهداری نشان می‌دهد که این شاخص در زمان یک روز تفاوت معنی‌داری با مقدار آن در زمان ۲۰ و ۳۰ روز دارد اما بین این دو زمان نگهداری تفاوت معنی‌داری در میزان این شاخص مشاهده نمی‌شود. حسین پور و همکاران [۲۳] که از رنگ‌های طبیعی کوچنیل و پاپریکا در سوسمیس فرانکفورتر استفاده نموده بودند گزارش کردند که جایگزینی رنگدانه‌ها در نمونه‌های سوسمیس با میزان جایگزینی ۱ میلی‌گرم پاپریکا و ۴۰ میلی‌گرم نیتریت و یا




Fig 1 The effect of different concentration of celery extract on color parameters (a*) and (b*)

زردی محصول افزایش می‌یابد، در نتیجه در انتخاب میزان مطلوب عصاره باید به تعادل میان خواص آنتی‌اکسیدانی و نیتریت طبیعی کرفس و از طرفی کاهش رنگ قرمز فراورده توجه

به دلیل ماهیت سبز/زرد عصاره کرفس که در مطالعه ما به عنوان جایگزین نیتریت مورد استفاده قرار گرفته است، همانطور که از شکل پیداست، با افزایش عصاره میزان رنگ قرمز کاهش یافته و

نظر رنگ مطلوبیت بیشتری برای استفاده در فراورده‌های گوشتی دارد.

ارزیابی شاخص‌های میکروبی




Fig 2 Plate count agar and clostridium perfringens count (cfu/ml) in samples containing celery extract during storage at 4 °C for 30 days. Error bars represent standard deviation between replicates.




Fig 3 Yeast and mold count (cfu/ml) in samples containing celery extract during storage at 4 °C for 30 days. Error bars represent standard deviation between replicates.

تاکنون مورد مشابهی در خصوص استفاده از کرفس در فرآوردهای گوشتی و بررسی خواص فیزیکی، شیمیایی، میکروبی و خواص حسی آن مشاهده نگردید، لذا به نظر می‌رسد این بررسی برای اولین بار در ایران انجام می‌شود. البته ظرفیت نگهداری آب در سویس با افزایش غلظت اسانس در سویس به طور معنی‌داری کاهش پیدا کرده است که این اثر نامطلوب است. البته در نتایج حاصل از ارزیابی حسی در بافت دهانی و بافت ظاهری این کاهش در ظرفیت نگهداری آب مشهود نبوده است. از طرف دیگر در مورد خصوصیات میکروبی و مانندگاری سویس، شمارش کلی فرم‌ها، کپک‌ها و مخمرها، تحت تأثیر اثر مستقل تیمارها و همچنین اثر متقابل تیمار و زمان به طور معنی‌داری کاهش یافته است که احتمالاً علت آن داشتن ترکیبات ضد

داشت. میزان قرمزی رنگ در فراورده‌های گوشتی بسیار حائز اهمیت است. بر همین اساس و با توجه به نتایج، سویس‌های حاوی ۶۰ و ۸۰٪ عصاره بالاترین شدت رنگ قرمز را نشان دادند، با این حال نمونه حاوی ۸۰٪ عصاره شدت رنگ زرده بالاتری داشت؛ در مجموع سویس حاوی ۶۰ درصد عصاره از

در شمارش کلی میکروارگانیسم‌ها بین نمونه حاوی نیتریت، ۲۰٪ و ۶۰٪ عصاره کرفس در روزهای اول و دهم و بیستم اختلاف معنی داری وجود نداشت. ولی در روز سی ام اختلاف معنی‌داری بین این سه تیمار مشاهده شد ($P \leq 0.05$). بین تیمارهای ۴۰٪، ۸۰٪ و ۱۰۰٪ در تمام روزها اختلاف معنی‌داری وجود داشت. کمترین بار میکروبی در روز سی ام نگهداری را تیمارهای حاوی نیتریت و ۶۰٪ داشتند. کرفس یکی از گیاهانی است دارای خواص غذایی و دارویی بسیار زیادی می‌باشد و دارای عطر و بوی بسیار مطبوعی می‌باشد. ترکیبات موجود در این گیاه و خواص آن در تحقیقات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و وجود ترکیبات ضد میکروبی مانند فتالیدها در این گیاه مشخص شده است [۲۷]. البته در بررسی‌های کتابخانه‌ای

زیادی مبنی بر خواص ضد ویروسی و ضد باکتریایی و ضد قارچی برخی از اجزای سازنده گزارش شده و تحقیقات زیادی انجام شده تا مشخص گردد که کدام یک از گروه های عامل یا ساختار فضایی ترکیبات سازنده اسانس مسئول خاصیت آنتی بیوتیکی آنها هستند. ساختار فضایی سیس در اطراف پیوند دوگانه، نسبت به ساختار فضایی ترانس باعث فعالیت ضد میکروبی شدیدتری می شود و از فعالترین گروه های عامل، برای مثال در الکل های آلیفاتیک (لینالول) و فنول ها (تیمول و اوگنтол) گروه هیدروکسیل بوده است [۳۰].




Fig 4 Amount of detected compounds in celery extract

اثر غلظت های مختلف عصاره کرفس بر درصد بازدارندگی

در این آزمون رادیکالهای دی پی اچ با آنتی اکسیدان ها یا دیگر گونه های رادیکالی واکنش می دهند و مقدار آن کاهش می یابد در نتیجه جذب در طول موج ۵۱۷ کاهش می یابد. شکل شماره ۳ میزان کاهش جذب محلول دی پی اچ را به ترتیب در حضور غلظت های مختلف از عصاره کرفس را نشان می دهد. اسانس مورد آزمایش با غیرفعال کردن رادیکال دی پی اچ در دمای اتاق خاصیت آنتی رادیکالی خوبی نشان داد. اسانس کرفس در گستره ای غلظتی ۰ تا ۱۰۰ درصد استفاده شد. با افزایش غلظت آن از ۰ تا ۱۰۰ درصد، مقدار دی پی اچ باقی مانده از ۸۹ درصد به ۶۱ درصد کاهش یافت. این نتایج نشان داد که با افزایش درصد تیمار، فعالیت آنتی رادیکالی کاهش می یابد. بین کلیه تیمارهای تعریف شده اختلاف معنی داری بر فعالیت آنتی

میکروبی از قبیل ترکیبات گروه فتالیدها به خصوص لیگوستیلیدها و فلاونوئیدها در این گیاه می باشد. البته با توجه به این که تاریخ انقضای سوسیس حدکثر ۶۰ روز می باشد و در نمونه های تولیدی تا روز دهم تفاوت معنی داری در خصوصیات میکروبی نمونه ها ایجاد نشد ولی از روز بیست به بعد رشد کپک ها و مخمرها در نمونه های حاوی٪۲۰٪۴۰٪۸۰ و٪۱۰۰ نسبت به تیمارهای حاوی نیتریت و٪۶۰ به شدت افزایش پیدا کردند. احتمالاً این امر به دلیل این است که در سوسیس تولیدی حاوی٪۶۰ به علت وجود ترکیبات ضد میکروبی و قدرت آنتی اکسیدانی بالاتری نسبت به بقیه تیمارها می باشد که باعث جلوگیری از رشد کپک ها و مخمرها می شود ولی در بقیه تیمارها این قدرت آنتی اکسیدانی پایین تر است که کپک و مخمرها شروع به رشد می کنند. در شمارش کاسترید یوم پرفرازنر بین نمونه های حاوی نیتریت،٪۲۰٪۴۰ و٪۶۰ در تمام روزها اختلاف معنی داری وجود نداشت. همچنین بین نمونه های حاوی٪۸۰ و٪۱۰۰ نیز، در تمام روزها اختلاف معنی داری وجود نداشت. نمونه های حاوی٪۲۰٪۴۰ و٪۶۰ در روز سی ام نگهداری در محدوده استاندارد ملی ایران بودند ولی تیمارهای٪۸۰ و٪۱۰۰ از محدوده استاندارد خارج شدند. علاوه بر این با توجه به نتایج تحقیقات مختلف، کرفس توانایی بالای در جلوگیری از رشد باکتریها بخصوص نوع گرم مثبت دارند [۲۸و۲۹] و این خود باعث عدم رشد باکتری های موجود احتمالی پس از فرآیند پخت می گردد. تاکنون سابقه ای که در آن اثر نگهدارنده طبیعی کرفس بر روی تغییرات بار میکروبی سوسیس گوشت حرارت دیده را مورد بررسی قرار دهد در دست نیست، اما در بسیاری از مقالات که بر روی سایر فرآورده های گوشتی به خصوص انواع فرآورده های خام و تخمیری گوشت انجام شده این اثر مورد تائید قرار گرفته است [۲۹].

ترکیبات سازنده عصاره کرفس

آنالیز ترکیبات سازنده عصاره کرفس و مقایسه کمی و کیفی آن نشان داده است که لیگوستیلیدها به عنوان جز اصلی عصاره را تشکیل می دهند و به همراه فتالیدها خاصیت آنتی اکسیدانی بالای دارند لوتین و زیئنین یک رنگدانه کارتونییدی هستند که لوتین محلول در چربی و زیئنین محلول در آب هستند و این دو نشانگر روشی و قرمزی و زردی محصول می باشند و شواهد

ترکیبات فنولیک در این گیاه نسبت به عصاره‌های دیگری که در فراورده‌های گوشتی تاکنون استفاده شده است، چندان بالا نیست؛ این نتایج با داده‌های حاصل از کار وانگ و همکاران [۳۳] نیز تایید شد. اثر متقابل سطوح غلظتی متفاوت عصاره کرفس و زمان تگهداری بر مقدار عدد تیوباربیتوریک اسید نیز در شکل نشان داده شده است. نمونه حاوی 100% عصاره نیتریت و 80% عصاره نیتریت با یکدیگر اختلاف معنی‌داری نداشتند و کمترین میزان تیوباربیتوریک را نیز نشان دادند. با افزایش میزان نیتریت به عصاره به نیتریت در نمونه‌های سوسیس، میزان تیوباربیتوریک به طور معنی‌داری افزایش یافت به نحوی که بیشترین میزان تیوباربیتوریک اسید در نمونه حاوی صد درصد عصاره مشاهده گردید. با توجه به شکل، بهترین غلظت عصاره که کمترین میزان اکسیداسیون را بر اساس آنالیز تیوباربیتوریک اسید دارد سوسیس حاوی 20% عصاره و 80% نیتریت است. این نتایج با داده‌های حاصل از کار ژئو و چی [۳۴] مغایرت داشت، آن‌ها گزارش نمودند که با افزایش میزان عصاره پوسته دانه درخت سدر به سوسیس‌ها از $0/05\%$ تا $0/1\%$ ، میزان اکسیداسیون کاهش پیدا می‌کند؛ عدد تیوباربیتوریک اسید در طول ۱۴ روز نگهداری نیز به آرامی افزایش یافت که تفاوت آن با نمونه شاهد کاملاً معنی‌دار بود. همچنین جایواردانا و همکاران [۳۵] که اثر عصاره لوبیای آزوکی را بر سوسیس‌های پخته گوشت خوک بررسی کردند، گزارش نمودند که با افزایش میزان عصاره در سوسیس‌ها از $0/0\%$ تا $0/3\%$ ، عدد تیوباربیتوریک اسید به طور معنی‌داری کاهش یافته است. دلیل این تفاوت‌ها بین کار ما و دیگر محققان احتمالاً به دلیل اختلاف در میزان ترکیبات فنولیک عصاره کرفس و عصاره‌های ذکر شده در بالا بود. همانطور که قبلاً ذکر شد، میزان ترکیبات فنولیک کرفس اندک است [۲۲ و ۳۳]. با توجه به این توضیحات انتظار می‌رود که میزان اکسیداسیون در طول دوره نگهداری در نمونه‌های حاوی عصاره بیشتر و نیتریت کمتر، افزایش یابد. همانطور که در شکل نیز مشخص است، عدد تیوباربیتوریک اسید با افزایش زمان نگهداری از ۱ روز تا 30 روز افزایش معنی‌داری را نشان می‌دهد به نحوی که بیشترین مقدار تیوباربیتوریک اسید در طول 30 روز نگهداری و کمترین آن پس از ۱ روز نگهداری مشاهده گردید. در تیمارهای 0 و 40% در روز اول نگهداری تفاوت معنی‌داری وجود نداشت ولی برای

رادیکالی وجود داشت. همانگونه که مشاهده می‌گردد بیشترین درصد بازدارندگی رادیکال های آزاد $35/13$ متعلق به تیمار 0 درصد بود. کمترین درصد بازدارندگی ($12/30$) را تیمار 100 درصد به خود اختصاص داده بود و همچنین بین تیمارهای 20 تا 100 درصد بیشترین فعالیت آنتی رادیکالی را تیمار 20 درصد به خود اختصاص داد این نتایج با داده‌های حاصل از تحقیق مقصودلو و همکاران [۱۵] نیز تایید شد.




Fig 5 Effect of different concentrations of celery extract percentage inhibitory

ارزیابی اکسیداسیون چربی

میزان اکسیداسیون چربی با اندازه‌گیری عدد تیوباربیتوریک اسید^۱ انجام گرفت. با توجه به شکل و با مقایسه میانگین تیوباربیتوریک اسید در تمامی نمونه‌ها مشخص گردید که بین تیمار شاهد (حاوی 0% عصاره و 0% نیتریت) و تمامی دیگر تیمارها حاوی عصاره کرفس تفاوت معنی‌داری وجود دارد. به طور کلی ترکیبات فنولیک (فلاؤنونئید، تانن و آنتوسیانین) مهمترین آنتی اکسیدان‌های طبیعی گیاهان به شمار می‌روند [۳۱]. در مطالعه‌ای که توسط احمدی و همکاران [۳۲] بر روی خاصیت آنتی اکسیدانی کرفس کوهی انجام گرفت، مقدار کل ترکیبات فنولیک استخراج شده از این گیاه $1/033 \pm 0/1$ میلی‌گرم در گرم وزن خشک گیاه و مقدار کل فلاؤنونئید $0/0595 \pm 0/06$ میلی‌گرم در گرم وزن خشک گیاه است. در کرفس کوهی نیمی از ترکیبات استخراج شده را فلاؤنونئیدها تشکیل می‌دادند با این حال مقدار

1. TBARS

و عصاره میکروکپسوله شده‌ی انگور برزیلی را بر خصوصیات اکسیداسیونی سوسیس‌ها طی ۱۵ روز نگهداری ارزیابی کرد و دریافتند که عدد تیوباریتوريک اسید نمونه‌های شاهد و دارای کارمین طی دوره نگهداری افزایش یافته است، در حالی که عدد تیوباریتوريک اسید نمونه‌های حاوی انگور برزیلی در طی نگهداری حتی کاهش یافته بود که دلیل این تفاوت نیز احتمالاً کم بودن ترکیبات فنولی موجود در کرفس می‌باشد که قبلاً ذکر شد.

Table 2 The effect of salary extract on the TBARS value (mg MDA/Kg) of Chicken Cocktail Sausages during refrigerated storage ($4 \pm 1^{\circ}\text{C}$)

TBARS value (mg MDA/Kg)							day
Celery Extract(%)							
100	80	60	40	20	0		
2.400 \pm 0.100 ^a	2.200 \pm 0.100 ^b	1.900 \pm 0.100 ^c	1.700 \pm 0.100 ^d	1.600 \pm 0.100 ^d	1.700 \pm 0.000 ^d		1
3.000 \pm 0.100 ^a	2.833 \pm 0.057 ^{ab}	2.800 \pm 0.100 ^b	2.400 \pm 0.100 ^c	1.900 \pm 0.100 ^e	2.100 \pm 0.100 ^d		10
3.700 \pm 0.200 ^a	3.500 \pm 0.100 ^b	3.233 \pm 0.057 ^c	3.000 \pm 0.100 ^d	2.700 \pm 0.100 ^e	2.400 \pm 0.000 ^f		20
4.000 \pm 0.100 ^a	3.600 \pm 0.000 ^b	3.333 \pm 0.208 ^c	3.166 \pm 0.057 ^{cd}	3.020 \pm 0.000 ^d	2.666 \pm 0.057 ^e		30

Values are reported as means (average of triplicate trial) \pm standard deviation; different small letters in a column and in each group mean the values differ significantly at $p<0.5$

در بافت سوسیس‌های شاهد و بیشترین غلظت عصاره را گزارش نکردند [۲۶]، با این حال همین محقق، در مطالعه‌ای دیگر بر روی سوسیس‌های گوشت خوک حاوی غلظت‌های متفاوت لوبیای آزوکی هیچ تفاوت معنی‌داری را در خصوصیات حسی از جمله بو، مزه و طعم نشان ندادند [۳۴]. مقایسه میانگین اثر زمان نگهداری بر روی شاخص‌های طعم و بو در شکل نشان داده شده است. همانطور که مشخص است بین زمان نگهداری ۱ روز و ۳۰ روز، شاخص طعم اختلاف معنی‌داری را نشان می‌دهد و این یعنی پس از ۳۰ روز نگهداری طعم محصول کاهش می‌یابد. با این حال و با این که روند کاهش طعم در طی زمان نگهداری مشهود است، اما تفاوت معنی‌داری بین یک روز و ۲۰ روز مشاهده نمی‌شود و محصول در روز بیستم طعمی مشابه با روز اول تولید دارد. طبق مقایسه میانگین انجام شده توسط آزمون دانکن، روند کاهش شاخص بو در طول زمان مشهود است و بین نمونه تولیدی در روز ۱ و نمونه نگهداری شده پس از ۳۰ روز اختلاف معنی‌داری مشاهده می‌شود. آلیدا و همکاران [۳۷]

آنالیز حسی (طعم و بو)

برای بررسی اثر افزودن غلظت‌های مختلف عصاره کرفس بر طعم و بوی سوسیس‌ها، بهترین نمونه از نظر رنگ و خواص آنتی‌اکسیدانی که نمونه‌ی حاوی ۶۰٪ عصاره کرفس بود انتخاب و از نظر طعم و بو با نمونه حاوی ۰٪ عصاره به عنوان شاهد مقایسه گردید. آنالیز واریانس هر دو شاخص طعم و بو نشان داد که سطوح ۰٪ و ۶۰٪ عصاره مورد استفاده در سوسیس‌ها از نظر آماری تفاوت معنی‌داری ندارد. یعنی جایگزینی ۶۰٪ از نیتریت در محصول با عصاره کرفس از نظر خواص حسی طعم و بو هیچ تاثیر نامطلوبی بر نمونه‌های سوسیس ندارد و به آسانی می‌توان آن را جایگزین نیتریت کرد. با این حال محققان دیگر بالاترین امتیاز خواص حسی سوسیس‌های حاصل از گوشت مرغ که حاوی ران مرغ بودند را به نمونه‌های شاهد دادند و هم‌مان با افزایش میزان عصاره، پذیرش این فراورده گوشتی کاهش یافت که نشان دهنده اثر منفی غلظت‌های بالای عصاره بر این فراورده بود. با این حال ارزیاب‌ها در این مطالعه هیچ تفاوت معنی‌داری

کلی در مطالعه ما با وجود کاهش معنی دار شاخص بو و طعم حین زمان نگهداری، به دلیل این که اثر متقابل سطح عصاره کرفس با زمان اختلاف معنی داری را نشان نمی دهد می توان نتیجه گرفت که استفاده از عصاره کرفس موجب کاهش طعم محصول نشده است.

برآورده خصوصیات حسی سوسیس های بولوگنیا حاوی ۰/۵ ۰/۷۵ و ۱٪ عصاره پوست انگور برزیلی را در طول ۳۵ روز نگهداری از لحاظ بو، طعم و بافت، بدون تفاوت معنی دار گزارش نمودند. به طور کلی خصوصیات حسی به نوع عصاره مورد استفاده، رنگ آن، خصوصیات آنتی اکسیدانی، خصوصیات جذب آب و ... بستگی داشته و در هر محصول متفاوت است. به طور

Table 3 The effect of salary extract concentration (0, 60%) on sensory attribute of Chicken Cocktail Sausages during refrigerated storage ($4 \pm 1^{\circ}\text{C}$)

odor	Celery Extract(%)		taste	day
	60	0		
65.68 ^{bcd}	66.33 ^a	66.03 ^{bc}	67.41 ^a	1
63.56 ⁱ	63.89 ^{ghi}	64.68 ^{efgh}	65.85 ^{bcd}	10
64.12 ^{def}	64.91 ^{bcde}	64.99 ^{cdef}	65.43 ^{bcd}	20
63.61 ^{hi}	64.03 ^{def i}	64.68 ^{efgh}	65.89 ^{bcd}	30

Values are reported as means (average of triplicate trial) \pm standard deviation; different small letters in a column and in each group mean the values differ significantly at $p < 0.05$

۵- منابع

- [1] Hashemiravan, M. & Shokraneh, N. (1391). The effect of methyl cellulose substitution (CMC) on chemical and rheology of German sausage. Food Technology & Nutrition, 10(1), 43-50.
- [2] Zeinalzadeh, E., Mizani, M., Chamani, M. & Gerami, A. (1388). The effect of dietary corn bran fibers (corn z-trim) and calcium gluconate on quality characteristics of sausages. Food Technology & Nutrition, 7:3, 5-16. [In Persian].
- [3] Rokni, N. (1393). Meat Science and Technology, Tehran University Press, Tehran, ed: 7, 133-141.
- [4] Esmailzadeh, P., Mirahmadi, F. & mazaheri, M. (1388). Investigating the effect of Lactobacillus plantarum, Lactobacillus fermentum on Mesophilic aerobic, lactic acid, enterobacteriaceae bacteria and nitrite reduces during fermentation process of fermented sausage. Journal of veterinary Medicine, 10:4, 47-60.
- [5] Nasehinia, H., Mahdinia, M., Ghorbani, R. & Noori, M. (1387). Nitrit content in sausage and

۶- نتیجه گیری

نتایج نشان داد که نمونه حاوی ۶۰ درصد عصاره کرفس (دارای ۴۰ درصد نیتریت)، در مقایسه با سایر نمونه ها در فرمولاسیون دارای رنگ مطلوب تری بود و شدت قرمزی (a*) بیشتری داشت. همچنین مشخص شد که در رنگ قرمز محصول در زمان نگهداری، کاهش چشمگیری مشاهده نشد. این نمونه پس از آزمایشات میکروبی، از نظر خواص حسی (طعم و بو)، با نمونه شاهد (دارای ۱۰۰ درصد نیتریت)، مقایسه شد. طبق نتایج به دست آمده، بین نمونه مورد آزمایش با نمونه شاهد از نظر طعم و بو اختلاف معناداری وجود نداشت و همچنین در طی نگهداری، عصاره کرفس هیچ گونه طعم نامطلوب و قابل حس در محصول ایجاد نشد. بنابراین می توان از عصاره کرفس به جای ۶۰ درصد از نیتریت مصرفی در سوسیس، استفاده نمود. نتایج نشان داد که نمونه حاوی ۲۰ درصد عصاره کرفس (دارای ۸۰ درصد نیتریت)، در مقایسه با سایر نمونه ها در فرمولاسیون میزان و سرعت اکسیداسیون کمتری داشت. همچنین مشخص شد که سرعت اکسیداسیون محصول در زمان نگهداری نسبت به نمونه ۱۰۰ درصد نیتریت، افزایش چشمگیری مشاهده نشد.

- enumeration of moulds and yeasts colony count technique at 25°C.
- [18] ISIRI (Institute of Standards and Industrial Research of Iran). 2197. Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for enumeration of clostridium perfringens colony count technique.
- [19] Greenwood, R., Gooper, D. & Hinings, G. R. (1993). Strategic assumptions and actions in the Canadian audit industry. Canadian Journal of Administrative Sciences, 10, 308-321.
- [20] Burits, M. & Bucar, F. (2000). Antioxidant activity of *Nigella sativa* essential oil. Phytotherapy Research species with commercial importance in Turkey. Journal Food Control, 15, 169-172.
- [21] Maghsudlu, Y., Asgharpoor, A., Ariayee, P. (1392). The effect of adding satureja khusestanica essence on bacterial, chemical and sensorial properties of frankfurter sausages. Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology, 2(3), 294-279.
- [22] Cierach, M., Modzelewska-Kapitula, M. & Szacilo, K. (2009). The influence of carrageenan on the properties of low-fat frankfurters. Journal of Meat Science, 82(3), 295-299.
- [23] Hosseinpour, S., Eskandari, M., Mesbahi, GH., Shekarforush, SH., Farahnaki, A. (2013). Application of Cochineal and paprika as natural pigments for coloring in low nitrite and free nitrite frankfurters. Iranian Food Science and Technology Research Journal, 9(3), 243-252.
- [24] Kim, H. W., Hwang, K. E., Song, D. H., Kim, Y. J., Ham, Y. K., Lim, Y. B., Kim, C. J. (2015). Wheat fiber colored with a safflower (*Carthamus tinctorius* L.) red pigment as a natural colorant and antioxidant in cooked sausages. LWT-Food Science and Technology, 64(1), 350-355.
- [25] Khaleghi, a., Rezaei, k., Kasaei, MR., Khosravi-Darani, K., Soleymani, M. (1391). Evaluation of antioxidant properties of *Berberis crataegina* extract on fat oxidation of beef sausages during refrigerated storage. Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 7(5), 345-353.
- meat product distributed in Semnan. Payesh quarterly periodical, 3(7), 197-202.
- [6] Pirouti, K., Javadi, A. & Nahidi, F. (1393). Effect of thyme (*Thymus vulgaris*) extract on chemical, microbiological and sensory properties of sausage during storage. Journal of Food Hygiene, 4:15, 9-20.
- [7] De Vilmorin, R. L. (1950). Pascal celery and its origin. J NY Bot Gard, 51: 39-41.
- [8] Haghparast, H. (1381). celery extract (extraction, properties and application). Master of Food science seminar, College of Agriculture of Tarbiat Modares University, 63.
- [9] Momin, R. A. & Nair, M. G. (2002). Antioxidant, cyclooxygenase and topoisomerase inhibitory compounds from *Apium graveolens* Linn. Seeds. Phytomedicine, 9(4), 312-318.
- [10] Ramezani, M., Narsis, S. & Yassa, N. (2009). Antinociceptive and anti-inflammatory effects of isolated fractions from *Apium graveolens* seeds in mice. Pharmaceutical Biology, 47(8), 740-743.
- [11] Huhtanen, C. N. (1980). Inhibition of *Clostridium botulinum* by spice extracts and aliphatic alcohols. Journal of Food Protection, 43(3), 195-196.
- [12] Sindelar, J. J. (2006). Investigating uncured no-nitrate-or-nitrite added processed meat products. Ames: Iowa State University.
- [13] Duke, J. A., Bogenschutz-Godwin, M. J. & Du Cellier, J. (2003). CRC hand book of medicinal spices. Florida, CRC press.
- [14] Bautista, A. R. P. L., Moreia, E. L. T., Batista, M. S., Miranda, M. S. & Gomes, I. C. S. (2004). Sabacute toxicity assessment of annatto in rat. Food and Chemical Toxicology, 42, 625-629.
- [15] Yam, K. L. & Papadakis, S. E. (2004). A simple digital imaging method for measuring and analyzing color of food surfaces. Journal of food Engineering, 61, 137-142.
- [16] ISIRI (Institute of Standards and Industrial Research of Iran). 5272. Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of microorganisms Colony count technique at 30°C.
- [17] ISIRI (Institute of Standards and Industrial Research of Iran). 997. Detection and

- Seminar of Applied Science in Vegetable oils Industry.
- [33] Wong, S. P., Leong, L. P., Koh, J. H. W. (2006). Antioxidant activities of aqueous extracts of selected plants. *Food Chemistry*, 99(4), 775-783.
- [34] Qi, S., Zhou, D. (2013). Lotus seed epicarp extract as potential antioxidant and anti-obesity additive in Chinese Cantonese Sausage. *Meat science*, 93(2), 257-262.
- [35] Jayawardana, B. C., Hirano, T., Han, K. H., Ishii, H., Okada, T., Shibayama, S., Shimada, K. I. (2011). Utilization of adzuki bean extract as a natural antioxidant in cured and uncured cooked pork sausages. *Meat science*, 89(2), 150-153.
- [36] Baldin, J. C., Michelin, E. C., Polizer, Y. J., Rodrigues, I., De Godoy, S. H. S., Fregonesi, R. P., Fernandes, A. M. (2016). Microencapsulated jabuticaba (*Myrciaria cauliflora*) extract added to fresh sausage as natural dye with antioxidant and antimicrobial activity. *Meat science*, 118, 15-21.
- [37] De Almeida, P. L., De Lima, S. N., Costa, L. L., de Oliveira, C. C., Damasceno, K. A., dos Santos, B. A., Campagnol, P. C. B. (2015). Effect of jabuticaba peel extract on lipid oxidation, microbial stability and sensory properties of Bologna-type sausages during refrigerated storage. *Meat science*, 110, 9-14.
- [26] Jayawardana, B. C., Liyanage, R., Lalantha, N., Iddamalgoda, S., Weththasinghe, P. (2015). Antioxidant and antimicrobial activity of drumstick (*Moringa oleifera*) leaves in herbal chicken sausages. *LWT-Food Science and Technology*, 64(2), 1204-1208.
- [27] Salimi, M., Ebrahimi, A., Shojaei, Z. & Saei, S. (1389). Extraction and identification of chemical compounds of *Kelussia odoratissima*. *Medicinal and Aromatic Plants of Iran*, 26, 147-156.
- [28] Darmadji, P. & Izumimoto, M. (1994). Effect of chitosan in meat preservation. *Meat Science*, 38, 243-254.
- [29] Sagoo, S., Board, R. & Roller, S. (2002). Chitosan inhibits growth of spoilage microorganisms in chilled pork products. *Food Microbiology*, 19, 175-82.
- [30] Hey, R. (2000). *Volatile oil crops*. Andarz Publications, Tehran.
- [31] Shariatifar, N., Kamkar, A., Ardestani, M., Misaghi, A., Jamshidi, A., Jahed-khaniki, GH. (1390). quantitative and qualitative study of phenolic compounds and antioxidant activity of plant *pulicaria gnaphalodes*. *Journal of Gonabad University of Medical Science*. 18(1), 35-41.
- [32] Ahmadi, F., Shahedi, M., Kadivar, M. (1384). Evaluation of antioxidant effect of methanol extract of *kelussia odoratissima* in model systems and sunflower oil. *Iranian*

Effect of Nitrite Substitution with celery Extract on the antioxidant, anti-bacterial, color, and sensory properties of Chicken Cocktail Sausage.

Maleki kahaki, A¹, Bagheri, M^{2*}, Nateghi, L³

1. M. Sc. Student, Islamic Azad University, Mahallat Branch, Dept. of Food Science and Technology, Mahallat, Iran

2. Assistant. Prof., Islamic Azad University, Mahallat Branch, Dept. of Chemistry, Mahallat, Iran

3. Assistant. Prof., Department of Food Science and Technology, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran.

(Received: 2016/07/05 Accepted: 2017/02/22)

It has been found that usage of synthetic food preservatives includes nitrite and its salts in meat Products causes human health hazards. For this reason, there have been some efforts to reduce these synthetic preservatives in foods. This research aimed to investigate the Effect of Nitrite Substitution with celery Extract at different concentrations (20 .40 .60 .80, 100%) on the antioxidant, color, and sensory properties of Chicken cocktail sausage 55% during cold storage (4 °C) period (1, 10, 20, 30 days).Regard to color properties, it was indicated that the redness (a*) in samples containing 60% celery extract was the best concentration. It was found a significant difference between sausages containing celery extracts and control group and the best antioxidant activity was observed in sausage containing 20% celery extract. Results of sensory assays (flavor, taste) didn't reveal a significant ($p<0.05$) difference between sample containing 60% celery extract and control group.

Key Words: Meat products, Natural preservatives, Shelf life

* Corresponding Author E-Mail address: mo_baghery@yahoo.com