

# بهینه‌سازی پوشش‌دهی در کیک‌های فاقد گلوتن غنی‌شده با بتاکاروتن با روش سطح پاسخ

زینب بهاری<sup>۱</sup>، داود زارع<sup>۲\*</sup>، سارا موحد<sup>۳</sup>

- ۱- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد ورامین - پیشوای دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران.
- ۲- عضو هیئت علمی پژوهشکده زیست فناوری، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
- ۳- دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد ورامین - پیشوای دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران.

## چکیده

در بیماری سلیاک فرد مبتلا قادر به هضم گلوتن موجود در مواد غذایی نیست. بتاکاروتن یکی از قوی‌ترین آنتی‌اکسیدان‌های قابل حل در چربی بوده و پیش‌ساز ویتامین A است. غنی‌سازی کیک‌های فاقد گلوتن با بتاکاروتن و افزایش ماندگاری بتاکاروتن در اثر پوشش‌دهی می‌تواند موجب بهبود کیفی تغذیه این بیماران و حتی افراد سالم گردد. در این پژوهش با استفاده از ارزیابی حسی تاثیر پوشش‌دهی و افزودن بتاکاروتن به کیک‌های بدون گلوتن بررسی شد و در ادامه شرایط پوشش‌دهی و غنی‌سازی این کیک‌ها بهینه‌سازی شد. ابتدا <sup>۴</sup> پوشش خوراکی شامل آرژینات، زانتان، نشاسته ذرت و کازئینات سدیم (۱٪) روی کیک‌های بدون گلوتن پوشش داده شد و از نظر حسی ارزیابی شد. در مرحله دوم بتاکاروتن در داخل کیک و یا در داخل دو بیوپلیمر کازئینات سدیم و نشاسته ذرت اضافه شد و مورد ارزیابی حسی قرار گرفت. بر اساس نتایج، کیک حاوی بتاکاروتن با پوشش نشاسته ذرت برای ادامه مراحل پژوهش انتخاب شد. سپس نمونه انتخاب شده، از نظر غلظت بیوپلیمر و دمای خشک کردن با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) (بهینه‌سازی شد. بر اساس نتایج، غلظت ۰/۲٪ نشاسته ذرت و دمای خشک کردن ۴۲ درجه سانتی‌گراد به عنوان نقطه بهینه انتخاب شد. سپس، ماندگاری بتاکاروتن در نمونه پوشش‌داده شده در شرایط بهینه بررسی شد. نتایج نشان داد کاهش بتاکاروتن در نمونه پوشش‌دار از زمان صفر تا روز دهم به میزان قابل توجهی کمتر از نمونه شاهد در همین مدت زمان بود. بنابراین پوشش ۰/۲٪ نشاسته ذرت می‌تواند ماندگاری بتاکاروتن را در داخل کیک در مدت زمان نگهداری افزایش دهد.

**کلید واژگان:** کیک بدون گلوتن، پوشش‌دهی، بیوپلیمر، غنی‌سازی، بهینه‌سازی

یکی از بیماری‌هایی که رژیم غذایی در درمان آن نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند بیماری سلیاک است. افراد مبتلا به این اختلال قادر به جذب گلوتن موجود در غلات نیستند و در صورت عدم رعایت رژیم غذایی مناسب، در مراحل پیشرفته‌ی بیماری سطح جذب و فلور میکروبی دستگاه گوارش از بین رفته و فرد قادر به جذب مواد مغذی مورد نیاز بدن نیست. عوارض همراه با سلیاک درمان نشده شامل استئوپروز، کارکرد مختلف طحال، ناباروری یا سقط مکرر و سرطان است. بررسی‌ها نشان می‌دهد شیوع این بیماری در ایران نه تنها نادر نمی‌باشد بلکه در مقایسه با دیگر کشورها شیوع بالاتری داشته است. شیوع این بیماری در زنان  $1/5$  تا  $2$  برابر بیشتر از شیوع در مردان است. برای جلوگیری از تشید این بیماری معمولاً مواد غذایی دارای گلوتن از رژیم غذایی این بیماران حذف می‌شود. از طرف دیگر به دلیل آسیب‌های جدی سیستم گوارش، غنی‌سازی مواد غذایی مورد مصرف توسط این بیماران از اهمیت خاصی برخوردار است.

یکی از پرمصرف‌ترین مواد غذایی کیک‌ها هستند که در ارتباط با افراد مبتلا به سلیاک کیک‌های بدون گلوتن مصرف بیشتری دارند. کیک نوعی شیرینی با بافت مخصوص است و از محصولاتی است که به سبب طعم مناسب، ارزش غذایی بالا و سهولت مصرف، کاربرد زیادی دارد. بنابراین می‌توان کیک‌ها را با مواد مغذی غنی کرده و محصول غذایی عملکرگار و پرمصرفی را تولید کرد. بنابراین کیک‌ها بهترین انتخاب جهت تولید غذایی عملکرگار هستند. کیک‌ها می‌توانند به عنوان یک ماده غذایی پایه جهت تولید مواد غذایی عملکرگار محسوب شوند. جهت غنی‌سازی کیک‌ها می‌توان آنها را با آنتی‌اکسیدان‌هایی نظیر بتاکاروتون غنی‌سازی نموده و سپس پوشش داد. بتاکاروتون از طرفی به عنوان پیش‌ساز ویتامین آ باعث غنی شدن کیک‌های بدون گلوتن می‌شود و از طرف دیگر به عنوان یک آنتی‌اکسیدان قوی و یک ماده ضد سرطان کمک شایانی به پیشگیری از برخی بیماری‌ها نظیر انواع سرطان در بیماران سلیاکی که مستعد ابتلا به این بیماری‌ها هستند، می‌نماید. در هر حال ترکیباتی نظیر بتاکاروتون نسبت به اکسیژن و نور حساس بوده و اضافه کردن آنها به مواد غذایی باید با استفاده از روش‌های محافظتی نظیر پوشش دهنی همراه گردد. یکی از پرکاربردترین مواد مورد استفاده در امر پوشش دهنی استفاده از پلیمرهای خوراکی است. پلیمرهای خوراکی نقش بسیار کارآمدی را در حفظ مواد فرار و حساس مانند آنتی‌اکسیدان‌ها، رنگ‌ها، میکرووارگانیسم‌ها و غیره بازی می‌کنند. مواد مغذی

## ۱- مقدمه

امروزه با پیشرفت و توسعه در صنعت‌های مختلف از جمله صنایع غذایی و گسترش جوامع، نیازهای انسانی در راستای این توسعه ارتقا داشته است. از آنجایی که غذا یکی از نیازهای اولیه و اساسی بشر بوده و هست، صنایع غذایی از گسترده‌ترین و متنوع‌ترین و پرطرفدارترین صنعت‌ها در سراسر جهان به شمار می‌رود. بدليل گسترش روزافزون این صنعت و برای جلوگیری از افزودن مواد یا افزودنی‌ها که بسیاری از آنها اورگانیک نبوده و ممکن است برای مصرف‌کنندگان مخاطره‌آمیز باشند، بیشتر تولیدکنندگان به دنبال راه حل‌های جهت تولید مواد غذایی اورگانیک و عملکرگار هستند تا هم ضمانت‌کننده سلامت مصرف‌کنندگان و هم جمعیت آنها باشد. مواد غذایی عملکرگار به مواد غذایی اورگانیک ساده‌ای گفته می‌شود که با مواد مغذی مانند پروپیوتیک‌ها، آنتی‌اکسیدان‌ها و ویتامین‌ها در جهت ارتقاء سلامت و درمان بیماری‌ها غنی شده‌اند. مطالعات اپیدمیولوژی نشان داده است که مصرف غذایی‌های عملکرگار یا فعال سبب کاهش خطر ابتلا به سرطان، بهبود سلامت قلب، تحریک سیستم ایمنی، کاهش فشار خون، کاهش خطر ابتلا به استئوپروز و جلوگیری از افراش وزن و چاقی می‌شود. پیشرفت‌های علمی و دستیابی به نتایج قابل توجه سبب گردیده است تا مصرف‌کنندگان نیز به نقش غذایها در بهبود کیفیت زندگی، طول عمر و پیشگیری از بیماری‌های سرطان، قلبی و عروقی و حتی جلوگیری از پیشرفت مراحل این بیماری‌ها علاقه‌مند شوند<sup>[۱]</sup>. از آنجایی که بیشتر بیماری‌ها از جذب و دفع نادرست مواد به ویژه مواد غیر اورگانیک در دستگاه گوارش که یکی از وسیع‌ترین و بزرگ‌ترین ارگان‌های بدن است نشأت می‌گیرند، نقش سلامت مواد غذایی در این زمینه پررنگ‌تر می‌شوند. ترکیباتی نظیر برخی آنتی‌اکسیدان‌ها، ویتامین‌ها و املاح معدنی نیز قادرند با اثرات مضر اما طبیعی فرآیند فیزیولوژیک اکسیداسیون در بافت‌ها مقابله کرده و سلول‌های بدن را در برابر رادیکال‌های آزاد محافظت کنند. آنها با افزودن برخی از اجزایشان به رادیکال‌های آزاد، این ترکیبات سمی را که از خوراکی‌های سرخ کردنی و مواد دیگر ایجاد می‌شوند، تثیت و غیرفعال می‌کنند. بتاکاروتون نیز از خانواده کاروتونوئیدها بوده و یک آنتی‌اکسیدان است. این آنتی‌اکسیدان از بیماری‌های چشمی، قلبی و انواع سرطان پیشگیری می‌کند و از طرفی پیش‌ساز ویتامین آنیز می‌باشد<sup>[۲]</sup>.

نباید قابل استفاده نخواهد بود. به همین دلیل در اولین مرحله سعی شد با ارزیابی حسی میزان پذیرش این محصولات به صورت پوشش داده شده بررسی گردد.

جهت آماده سازی کیک های فاقد گلوتن پوشش داده شده با بیوپلیمر به شکل ذیل عمل شد. ابتدا برای ساخت محلول ۰/۱٪ بیوپلیمر، ۱ گرم از پودر بیوپلیمر مورد نظر شامل پودر آژینات، زانتان، نشاسته ذرت و کازینات سدیم در ۱۰۰ میلی لیتر آب مقطر حل شد و محلول در اتوکلاو (ایران/ شرکت ایران طب) به مدت ۵ دقیقه در دمای ۱۲۱ درجه سانتی گراد استریل شد. سپس به وسیله قلموی آشپزخانه و به شکل براشینگ سطح بیرونی کیک ها پوشش داده شدند. یک نمونه بدون پوشش نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. سپس کیک های پوشش داده شده برای مدت ۸ دقیقه در دمای ۵۰ درجه سانتی گراد در آون (شرکت شیمی فن/ ساخت ایران) قرار داده شدند تا رطوبت اضافی آنها گرفته شود. پس از خشک شدن، کیک ها داخل فویل آلومینیومی بسته بندی شدند.

پس از پوشش دهی کیک ها با بیوپلیمرها، همه کیک ها از نظر طعم، رنگ، بو و بافت با استفاده از آزمون هدونیک پنج نقطه ای مورد ارزیابی حسی قرار گرفتند تا بیوپلیمری انتخاب شود که تأثیر مناسبی بر روی کیک از نظر ارزیابان ایجاد کند و یا حداقل بتواند با کیک های بدون پوشش برابر نماید. نمونه های تهیه شده برای ارزیابی مرحله اول در جدول ۱ نشان داده شده است.

ارزیابی حسی بین ۱۵ ارزیاب غیر حرفه ای انجام شد. از آنها خواسته شد بین هر نمونه قدری آب بنوشند تا طعم نمونه قبلی تأثیری روی نمونه بعدی نداشته باشد. ارزیاب ها دارای حس گرسنگی و سیری زیاد نبودند.

**Table 1** Formulation of coated cakes with different biopolymers for evaluation in hedonic test

Test NO.	Feature
1	Gluten free cake coated with 1% sodium caseinate solution
2	Gluten free cake coated with 1% xanthan solution
3	Gluten free cake coated with 1% sodium alginate solution
4	Gluten free cake coated with 1% corn starch solution
5	Control (no coating)

امکان اضافه کردن آن به داخل پوشش بیوپلیمری وجود دارد. بنابراین در مرحله دوم از ارزیابی حسی، بتاکاروتون (شرکت آمریکا) به دو شکل به کیک ها اضافه شد و مورد ارزیابی قرار گرفت. در یک حالت بتاکاروتون به داخل پوشش بیوپلیمری اضافه شد. در این حالت ابتدا ۰/۲۸ میلی گرم بتاکاروتون محلول در روغن به دو بیوپلیمر با غلظت ۰/۱٪

می توانند به شکل محلول یا پودری داخل بیوپلیمرها قرار گرفته و به صورت پرکردن داخل مواد غذایی و یا به شکل پوشش روی مواد غذایی جامد با روش های گوناگون قرار گیرند [۳]. بنابراین، هدف از انجام این پژوهش غنی سازی کیک های فاقد گلوتن با بتاکاروتون و تأثیر پوشش خوراکی در حفظ بتاکاروتون به عنوان یک ماده حساس به اکسیژن، نور و حرارت در مدت زمان نگهداری است.

## ۲- مواد و روش ها

### ۲-۱- تهیه کیک بدون گلوتن برنجی

برای تهیه کیک برنجی ابتدا در یک ظرف مناسب سفیده دو عدد تخمر مرغ با استفاده از همزن الکتریکی مخلوط شد تا کاملاً کف کند. در ظرفی دیگر یک زرده تخمر مرغ، ۱۰۰ گرم کره و ۱۰۰ گرم پودر شکر با همزن مخلوط گردید و در نهایت تمام مواد همراه با ۲۵۰ گرم آرد برنج با هم مخلوط شده و خمیر به مدت ۲۰ دقیقه ورز داده شد. پس از آن خمیر به مدت ۲۴ ساعت در دمای اتاق رها شد تا بافت آن منسجم تر شود. بعد از ۲۴ ساعت خمیر به دایره های ۱۴ گرمی شکل داده شد و کیک ها در دمای ۱۲۰ درجه سانتی گراد به مدت ۲۰ دقیقه پخته شد.

### ۲-۲- پوشش دهی کیک ها و آماده سازی آنها

#### جهت ارزیابی حسی (مرحله اول)

یکی از مهم ترین فاکتورها در انتخاب یک پوشش مناسب برای پوشش دهی محصولات غذایی پذیرش مصرف کنندگان است. ممکن است برخی پوشش ها از قابلیت های خوبی برخوردار باشند اما در صورتی که قابل پذیرش برای مصرف کنندگان

### ۳-۲- ارزیابی پذیرش بتاکاروتون در کیک های بدون گلوتن پوشش داده شده (مرحله دوم)

هدف اصلی در این پژوهش اضافه کردن بتاکاروتون به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی به کیک های بدون گلوتن بود. در مورد بتاکاروتون هم امکان اضافه کردن آن در داخل خمیر کیک و هم

نشاسته‌ی ذرت پوشش داده شدند و کیک‌های بدون پوشش و بدون بتاکاروتون نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند. در این مرحله نیز ارزیابی حسی بین ۱۵ ارزیاب غیرحرفه‌ای انجام شد. از آنها خواسته شد بین هر نمونه قدری آب بنوشند تا طعم نمونه قبلی تأثیری روی نمونه‌ی بعدی نداشته باشد. ارزیاب‌ها دارای حس گرسنگی و سیری زیاد نبودند. ترتیب نمونه‌ها در ارزیابی حسی مرحله دوم در جدول ۲ نشان داده شده است.

نشاسته‌ی ذرت (اکتیو/ایران) و یا کازئینات سدیم (اکتیو/ایران) که از مرحله قبل انتخاب شده بودند اضافه شد. سپس محلول مورد نظر به روش براشینگ بر روی کیک‌ها پوشش داده شدند. درحالت دوم، بتاکاروتون به داخل خمیر کیک اضافه شد. به این ترتیب هر کیک ۱۴ گرمی حاوی ۲/۵ میلی‌گرم بتاکاروتون بود. کیک‌هایی که در آنها بتاکاروتون به صورت مستقیم به کیک اضافه شده بود نیز با دو نوع بیopolymer ۱٪ کازئینات سدیم و نشاسته‌ی ذرت به صورت مشابه پوشش داده شدند. دو نمونه کیک فاقد بتاکاروتون نیز با دو نوع بیopolymer کازئینات سدیم و

**Table 2 Formulation of coated cakes contain beta-carotene in biopolymer or inside of cake for evaluation in hedonic test**

Test NO.	Feature
1	Gluten free cake coated with 1% corn starch solution
2	Gluten free cake coated with 1% sodium caseinate solution
3	Gluten free cake coated with 1% corn starch solution contain 0.28 mg Beta-carotene
4	Gluten free cake coated with 1% sodium caseinate solution contain 0.28 mg Beta-carotene
5	Gluten free cake contain 2.5 mg Beta-carotene coated with 1% corn starch solution
6	Gluten free cake contain 2.5 mg Beta-carotene coated with 1% sodium caseinate solution
7	Control ( no coating)

شد که البته نیازی به انجام تکرار در این روش وجود ندارد. به این منظور دو فاکتور دمای خشک کردن و غلظت بیopolymer در دو سطح انتخاب گردید و پس از آن طراحی آزمایش با استفاده Central Composite Design (CCD) طبق جدول شماره ۳ انجام گردید. پس از به دست آمدن تعداد و شرایط آزمایش توسط نرم‌افزار مینی‌تب، آزمایش‌ها به صورت همزمان انجام شد و مقدار بتاکاروتون باقی‌مانده در کیک به عنوان پاسخ در روز اول و روز هفتم مورد ارزیابی قرار گرفت (جدول ۳).

## ۲-۴- بهینه‌سازی

پس از این مرحله و انتخاب روش افزودن بتاکاروتون به کیک‌ها، با توجه به این که بیopolymer نشاسته برای پوشش دهنی نهایی انتخاب گردید و از آنجا که در مرحله قبلی میزان حرارت مورد استفاده برای خشک کردن کیک‌ها و غلظت بیopolymer در انجام آزمایشات ثابت در نظر گرفته شده بود و همچنین با توجه به تاثیر این دو فاکتور در میزان پایداری بتاکاروتون، در این مرحله این دو فاکتور مورد بهینه‌سازی قرار گرفتند. برای بهینه‌سازی از روش آماری سطح پاسخ یا استفاده Response Surface Methodology (RSM)

**Table 3 Selected factors and levels for optimization using RSM**

Test NO.	Biopolymer concentration (%)	Factors	
		Drying temperature(°C)	
1	1.5	50	
2	1	55	
3	0.79	50	
4	1.5	57	
5	1.5	50	
6	1.5	50	
7	2	55	
8	1.5	50	
9	1.5	50	
10	2.2	50	
11	2	45	
12	1	45	
13	1.5	42	

(معادله ۱-۲)

$$\text{watercontent} = \frac{\text{wi} - \text{wf}}{\text{wi}} \times 100$$

 $\text{wi}$  = وزن نمونه قبل از آون $\text{wf}$  = وزن نمونه بعد از خشک شدن در آون

فعالیت آبی کیک‌ها نیز با استفاده از دستگاه اندازه‌گیری فعالیت آبی (aw سنج) (3TE,Decagon/USA) محاسبه شد.

## ۷-۲ آنالیز آماری

تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار مینی‌تب (Minitab) انجام شد. میانگین تیمارها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (One way Anova) در سطح احتمالی ۵ درصد انجام گرفت. طراحی آزمایش برای بهینه‌سازی پوشش‌دهی با استفاده از نرم‌افزار مینی‌تب به روش Central Composite Design (CCD) و با دو متغیر مستقل شامل غلظت بیوپلیمر و دمای خشک کردن انجام پذیرفت. مقدار سطح پایین و بالا در نرم‌افزار برای غلظت بیوپلیمر به ترتیب ۱٪ و ۲٪ و برای دمای خشک کردن به ترتیب ۴۵ و ۵۵ درجه سانتی‌گراد در نظر گرفته شد. آزمایش‌ها به صورت همزمان و در یک تکرار و به صورت کاملاً تصادفی انجام شد. مقدار بتاکاروتون باقی‌مانده در کیک‌ها در روز اول و روز هفتم به عنوان متغیر وابسته مورد ارزیابی قرار گرفت.

## ۳- نتایج و بحث

### ۱-۳ نتایج پوشش‌دهی کیک‌های بدون بتاکاروتون در ارزیابی حسی مرحله اول

نتایج ارزیابی حسی مرحله اول در جدول ۴ نشان داده شده است. در ارزیابی حسی مرحله اول اثر تعییر فاکتور نوع بیوپلیمر در پنج سطح شامل کیک پوشش‌داده شده با بیوپلیمرهای کازینات سدیم، نشاسته‌ی ذرت، آژینات سدیم، زانتان و نمونه‌ی شاهد (بدون پوشش) بر پاسخ‌های طعم، آroma، رنگ و بافت توسط آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه و آزمون مقایسه Tukey بررسی شد. با توجه به جدول آنالیز واریانس، مقدار عدد P برای هر ۵ سطح بیوپلیمری بیشتر از  $P\text{-value} \leq 0.05$  بود. بنابراین پوشش‌های بیوپلیمری تفاوت معنی‌داری نسبت به ویژگی‌های طعم، بو، رنگ و بافت با یکدیگر و با نمونه‌ی شاهد نداشتند.

پس از انجام آزمایشات و تعیین نمونه‌ی بهینه، یک نمونه در شرایط بهینه آزمایش که توسط نرم‌افزار پیشنهاد گردیده بود با سه تکرار در کنار نمونه شاهد بدون بیوپلیمر مورد ارزیابی قرار گرفت و از نظر مقدار بتاکاروتون در روز صفر، روز سوم و دهم مقایسه شد تا میزان اثر بیوپلیمر بر روی ماندگاری بتاکاروتون در طول زمان نگهداری محصول مشخص گردد. نمونه شاهد در این مرحله کیک حاوی بتاکاروتون بدون پوشش بیوپلیمری بود.

## ۴-۵ روش اندازه‌گیری بتاکاروتون

برای اندازه‌گیری بتاکاروتون موجود در کیک‌ها، ابتدا کیک در یک هاون سنگی کاملاً پودر و یکنواخت گردید. سپس ۱ گرم از پودر به دست آمده در هاون کاملاً سایده شد تا بتاکاروتون آن به طور کامل از بافت کیک جدا شود. محتوای هاون با ۱۰ میلی‌لیتر مтанول خالص (دکتر مجللی/ ایران) شسته شد و داخل یک لوله فالکون ۵۰ میلی‌لیتری ریخته شد و سپس هاون با ۵ میلی‌لیتر دیگر مтанول شسته شد تا کاملاً بتاکاروتون از سطح آن جدا شود. به محتوای فالکون ۱۰ میلی‌لیتر آب مقطور و ۱۰ میلی‌لیتر هگزان (دکتر مجللی/ ایران) اضافه گردید. پس از این مرحله نمونه‌ها به مدت ۵ دقیقه با دور ۶۰۰۰ rpm (Beckman/آمریکا) شد و محلول هگزان از قسمت بالای لوله‌ها جدا شد. در صورتی که در داخل رسوب مقداری رنگ باقی‌مانده باشد و به صورت رنگی دیده شود دوباره به لوله‌ها ۱۰ میلی‌لیتر هگزان اضافه گردید و کاملاً هموژن شد. سپس لوله‌ها سانتریفیوژ و فاز زرد رنگ (حاوی بتاکاروتون) در بالای لوله به محلول هگزان قبلی اضافه گردید. پس از آن میزان ۴۵۰ جذب محلول هگزان حاوی بتاکاروتون در طول موج WPA- (Biochrom/آمریکا) خوانده شد و مقدار بتاکاروتون به وسیله مقایسه با منحنی استاندارد بتاکاروتون تعیین گردید [۴].

## ۴-۶ اندازه‌گیری رطوبت کل و فعالیت آبی

رطوبت کل نمونه‌ها هم در روز صفر و هم در روز هفتم اندازه‌گیری شد تا تأثیر بیوپلیمر بر روی رطوبت موجود در کیک‌ها مشخص شود. برای تعیین رطوبت کل، یک کیک کامل ۱۴ گرمی قبل از خشک کردن در آون خرد و وزن گردید. سپس کیک در دمای ۱۰۵ درجه‌ی سانتی‌گراد به مدت ۲۴ ساعت در آون خشک شد و دوباره وزن شد. مقدار رطوبت کیک‌ها به وسیله فرمول زیر محاسبه شد [۵].

**Table 4** The average of acceptance of samples in the first stage using five points hedonic test.

Taste rate	Aroma rate	Color rate	Tissue rate	Sample
3/6 <sup>a</sup> ±0.70	3/4 <sup>a</sup> ±1	3/4 <sup>a</sup> ±1	3/3 <sup>a</sup> ±0.7	Corn starch
3/2 <sup>a</sup> ±0.78	3/4 <sup>a</sup> ±0.56	3/4 <sup>a</sup> ±0.73	3/3 <sup>a</sup> ±1.1	Xanthan
3/1 <sup>a</sup> ±0.73	3/2 <sup>a</sup> ±0.92	3 <sup>a</sup> ±0.52	3 <sup>a</sup> ±0.81	Sodium caseinate
2/9 <sup>a</sup> ±0.99	3 <sup>a</sup> ±0.63	2/7 <sup>a</sup> ±0.81	2/6 <sup>a</sup> ±0.87	Sodium alginate
2/9 <sup>a</sup> ±1	3/1 <sup>a</sup> ±0.51	3 <sup>a</sup> ±0.86	2/9 <sup>a</sup> ±0.91	Control

Means within each row with different lower case are significantly ( $P < 0.05$ ) different

انتخاب شدند. متاسفانه هیچ‌گونه تحقیق مشابهی بر روی کیک‌های بدون گلوتن برای مقایسه مشاهده نشد. اما برخی از گزارش‌ها بر روی محصولات غذایی دیگر به شرح زیر بود. در مطالعه‌ای از بیوپلیمرهای ژلاتین ماهی در ترکیب با کیتوزان جهت پوشش دهنی فیله ماهی Golden Pomfret استفاده کردند. این پوشش موجب حفظ رنگ ماهی در مدت زمان نگهداری ۵ تا ۱۷ روز شد. همچنین موجب تازگی و سبکی بافت ماهی شد و در مجموع مورد قبول مصرف‌کنندگان قرار گرفت. ولی در مدت زمان نگهداری این ویژگی‌ها کاهش پیدا کردند.<sup>[6]</sup> در پژوهشی دیگر تاثیر پوشش کیتوزان-ژلاتین بر کیفیت میگویند. این پوشش میگویند این پوشش کیتوزان-ژلاتین بر موجب بهبود خواص بافت و رنگ میگوها در مقایسه با نمونه شاهد (بدون پوشش) شد. حفظ کیفیت حسی برای نمونه‌های پوشش داده شده تا بیشتر از ۱۳ روز ادامه داشت. در صورتیکه در نمونه‌های بدون پوشش حفظ کیفیت تا ۷ روز بود.<sup>[7]</sup> در مطالعه‌ای دیگر از پوشش ژلاتین-نشاسته جهت پوشش دهنی سوسیس ماهی استفاده شده بود. نتایج ارزیابی حسی مقبولیت کلی آن را نشان می‌داد. این محققین از آزمون هدونیک پنج نقطه‌ای برای ارزیابی حسی نمونه‌های خود استفاده کردند که شماره ۱ بدترین و ۵ بهترین کیفیت را نشان می‌دادند. در این آزمون میانگین امتیازها بین ۳ تا ۴ بود، که مقبولیت خوب محصول را نشان می‌داد.<sup>[8]</sup> در مطالعه‌ای دیگر لاکتو‌بایسیلوس اسیدوفیلوس انکپسوله شده در بیوپلیمر نشاسته ذرت به شکل چند لایه ( محلول نشاسته / میکروکپسول‌های اسپری شده / نشاسته ذرت ) مخلوط شده و روی نان پوشش داده شد. این پوشش به طور معنی‌داری بر خواص فیزیکو‌شیمیایی سطح نان موثر بود. پوشش موجب کاهش نیروی شکست شده و ارزیابی حسی مقبولیت خوبی را نشان داد.<sup>[9]</sup> در مطالعه حاضر که از چهار نوع بیوپلیمر جهت پوشش دهنی کیک‌های برنجی استفاده شد، همانطور که گفته شد نتایج حسی، نسبت به ویژگی‌های طعم، بو، رنگ و بافت تفاوت معنی‌دار با یکدیگر نداشتند.

همان‌طور که از نتایج می‌توان استنباط کرد، نشاسته‌ی ذرت بیشترین میانگین پذیرش را نسبت به ویژگی‌های بافت، طعم، بو و رنگ دارد. بیوپلیمر نشاسته‌ی ذرت نسبت به آژینات، زانتان و کازئینات سدیم بافت لطیفتری دارد. این ماده در ساخت درصد بالایی از بیوفیلم‌ها جهت بهبود خواص مکانیکی پلاستیسایزرها به کار می‌رود. به دلیل لطافت بافت نشاسته ذرت می‌توان در ساخت بیوفیلم‌های نشاسته‌ای پلاستیسایزر به کار نبرد. میانگین درصد پذیرش زانتان و کازئینات سدیم نیز نزدیک است. اما میانگین پذیرش پوشش آژینات سدیم نسبت به ۳ ویژگی بافت، رنگ و طعم در مقایسه با پوشش‌های کازئینات سدیم، زانتان و نشاسته‌ی ذرت، کمتر بود. در بررسی چشمی نمونه‌ها نیز مشخص شد که کیک‌های پوشش داده شده با آژینات و زانتان بعد از ۴ الی ۵ روز باعث ایجاد بوی نامطبوع و طعم نامطلوب شدند. این موضوع می‌تواند به دلیل جذب آب بالا توسط این نوع پوشش‌ها باشد. بنابراین پوشش دهنی با این دو بیوپلیمر در مرحله دوم ارزیابی حسی حذف شد. همچنین سطح کیک‌های پوشش داده شده با آژینات سدیم هنگام دونیم کردن کیک از آن جدا شده که باعث ایجاد ظاهری نامناسب می‌شد. کیک‌های پوشش داده شده با بیوپلیمر زانتان نسبت به پوشش‌های دیگر طعم شیرین‌تری داشتند و کمی باعث ایجاد سطح براق شدند. نکته بسیار مهمی که می‌توان بیان کرد این است که پوشش دهنی کیک‌ها موجب کاهش مطلوبیت کیک‌ها از نظر ارزیابان نسبت به نمونه شاهد بدون پوشش نگردید. بنابراین نداشتن تفاوت معنی‌دار بین پوشش‌های مختلف نسبت به ۴ ویژگی طعم، رنگ، بو و بافت نشانگر این موضوع است که پوشش دهنی می‌تواند گزینه بسیار خوبی جهت تولید محصولات عملگرا باشد. زیرا هر کدام از بیوپلیمرها ویژگی‌های منحصر به فردی جهت غنی‌شدن و غنی‌کردن محصولات غذایی را دارا هستند. در مجموع با توجه به نتایج این مرحله و براساس ویژگی‌هایی که ذکر شد دو بیوپلیمر نشاسته ذرت و کازئینات سدیم برای مرحله بعد

طعم کیک‌ها اثر معنی‌داری ( $\geq P\text{-value} 0.05$ ) دارد. جدول ۵ میانگین داده‌ها و آزمون مقایسه Tukey را نسبت به ویژگی طعم نشان می‌دهد. در این مرحله بیشترین امتیاز طعم مربوط به نمونه کیک حاوی بتاکاروتون پوشیده شده با بیوپلیمر ۱٪ نشاسته ذرت بود که حتی نسبت به نمونه شاهد نیز طعم بهتری را نشان می‌داد.

### ۲-۳- نتایج ارزیابی حسی مرحله دوم نسبت

#### به ویژگی طعم، آroma، رنگ و بافت

همانگونه که ذکر شد در مرحله دوم میزان پذیرش بتاکاروتون در داخل پوشش و همچنین در داخل بافت کیک مورد ارزیابی حسی قرار گرفت. نتایج نشان داد افزودن بتاکاروتون بر روی

**Table 5** The average acceptance of taste of samples in the second stage using five points hedonic test.

Coated cake	Average acceptance
With 1% corn starch solution	$3.73^{ab} \pm 0.7$
With 1% sodium caseinate solution	$3.40^{ab} \pm 0.73$
With 1% corn starch solution contain beta carotene	$3.86^a \pm 0.83$
With 1% sodium caseinate solution contain beta carotene	$3.66^{ab} \pm 0.9$
Cake contains beta caroten coated with 1% corn starch solution	$4.2^a \pm 0.67$
Cake contains beta caroten coated with 1% sodium caseinate solution	$3.46^{ab} \pm 0.83$
Control (without beta carotene)	$2.93^b \pm 0.96$

The Means within each row with different lower case are significantly ( $P < 0.05$ ) different

ارزیابی آромای نمونه‌ها نشان داد که اضافه کردن بتاکاروتون در داده‌ها و آزمون مقایسه Tukey نسبت به ویژگی آroma را داخل بافت کیک و یا داخل پوشش تاثیر معنی‌داری بر روی نشان می‌دهد. بوی کیک‌ها ندارد ( $\leq P\text{-value} 0.05$ ). جدول ۶ میانگین

**Table 6** The average acceptance of aroma of samples in the second stage using five points hedonic test

Coated cake	Average acceptance
With 1% corn starch solution	$3.40^a \pm 0.73$
With 1% sodium caseinate solution	$3.60^a \pm 0.63$
With 1% corn starch solution contain beta carotene	$3.53^a \pm 0.91$
With 1% sodium caseinate solution contain beta carotene	$3.40^a \pm 0.82$
Cake contains beta caroten coated with 1% corn starch solution	$4^a \pm 0.84$
Cake contains beta caroten coated with 1% sodium caseinate solution	$3.73^a \pm 0.7$
Control	$3.33^a \pm 0.48$

Means within each row with different lower case are significantly ( $P \leq 0.05$ ) different

نتایج ارزیابی حسی مرحله دوم نسبت به ویژگی رنگ نشان داد اضافه کردن بتاکاروتون داخل کیک باعث افزایش معنی‌داری در پذیرش ویژگی رنگ کیک می‌شود ( $0.05 \geq P\text{-value}$ ). جدول ۷ میانگین داده‌ها و آزمون مقایسه Tukey را نسبت به

**Table 7** The average acceptance of color of samples in the second stage using five points hedonic test

Coated cake	Average acceptance
With 1% corn starch solution	$3.60^{abc} \pm 0.63$
With 1% sodium caseinate solution	$3.60^{abc} \pm 0.73$
With 1% corn starch solution contain beta carotene	$3.66^{abc} \pm 0.9$
With 1% sodium caseinate solution contain beta carotene	$3.20^{bc} \pm 0.77$
Cake contains beta caroten coated with 1% corn starch solution	$4.20^a \pm 0.86$
Cake contains beta caroten coated with 1% sodium caseinate solution	$4^{ab} \pm 0.84$
Control	$3.06^c \pm 0.7$

Means within each row with different lower case are significantly ( $P < 0.05$ ) different

جدول ۸ نیز میانگین داده‌ها و آزمون مقایسه Tukey را نسبت به ویژگی بافت نشان می‌دهد و همانگونه که ملاحظه می‌گردد بهترین نتیجه مربوط به کیک حاوی بتاکاروتون پوشیده شده با

Table 8 The average acceptance of texture of samples in the second stage using five points hedonic test

Average acceptance	Coated cake
<sup>b</sup> 3.13±0.51	With 1% corn starch solution
<sup>c</sup> 2.86±0.83	With 1% sodium caseinate solution
<sup>ab</sup> 3.93±0.79	With 1% corn starch solution contain beta carotene
<sup>abc</sup> 3.33±0.9	With 1% sodium caseinate solution contain beta carotene
<sup>a</sup> 4.06±0.7	Cake contains beta caroten coated with 1% corn starch solution
<sup>d</sup> 4.06±0.79	Cake contains beta caroten coated with 1% sodium caseinate solution
<sup>c</sup> 2.53±0.91	Control

Means within each row with different lower case are significantly ( $P < 0.05$ ) different

نتیجه دارای بیشترین پذیرش بود. نمونه‌ی شاهد نیز تفاوت معنی داری با دیگر نمونه‌ها داشت و دارای کمترین میانگین و میزان پذیرش بود. بنابراین در مجموع در سه ویژگی بافت، طعم و بو رنگ کیک حاوی بتاکاروتن، پوشش داده شده با محلول بیوپلیمر نشاسته‌ی ذرت دارای بیشترین میانگین پذیرش بود و برای ادامه تحقیقات و انجام مرحله بهینه‌سازی انتخاب شد.

### ۳-۳- نتایج بهینه‌سازی

براساس نتایج به دست آمده تا این مرحله، طرح آزمایش بهینه‌سازی با روش سطح پاسخ برای بهینه‌سازی شرایط پوشش دهنی به منظور بهبود ماندگاری بتاکاروتن با استفاده از نرم افزار مینی‌تب طراحی گردید. نتایج بهینه‌سازی در جدول شماره ۹ مشاهده می‌شود.

همانگونه که از نتایج تا این مرحله استنباط می‌شود دو نمونه کیک فاقد گلوتن حاوی بتاکاروتن پوشش داده شده با ۱٪ بیوپلیمر کازئینات سدیم و نشاسته‌ی ذرت نسبت به دو ویژگی بافت و رنگ در مقایسه با دیگر نمونه‌ها دارای بیشترین میانگین پذیرش و تفاوت معنی دار نسبت به نمونه شاهد بودند. در سنجش آroma نمونه کیک حاوی بتاکاروتن پوشش داده شده با نشاسته‌ی ذرت با این که در مقایسه Tukey تفاوت معنی داری با دیگر نمونه‌ها نداشت ولی دارای بیشترین میزان پذیرش یا میانگین بود. در آزمون طعم نیز دو نمونه کیک فاقد گلوتن حاوی بتاکاروتن پوشش داده شده با نشاسته‌ی ذرت و کیک فاقد گلوتن پوشش داده شده با محلول ۱٪ نشاسته‌ی ذرت حاوی بتاکاروتن، دارای بیشترین پذیرش در میان ارزیابها بودند. ولی نمونه کیک حاوی بتاکاروتن پوشش داده شده با نشاسته‌ی ذرت دارای بیشترین میانگین و در

Table 9 Experimental design for beta-carotene stability during coating at Day zero and seven

Beta-carotene (mg/14g cake)		Factors	
Day seven	Day zero	Biopolymer concentrations	Drying temperatures
0.97	1.17	1.5	50
1.01	1.14	1	55
1.24	1.18	0.79	50
1.07	1.11	1.5	57
1.1	0.92	1.5	50
1.09	1.08	1.5	50
0.95	1.28	2	55
0.98	1.10	1.5	50
1.01	1.16	1.5	50
1.07	1.17	2.2	50
1.15	1.20	2	45
1.07	1.17	1	45
0.92	1.02	1.5	42

به اینکه بتاکاروتن به اکسیژن و نور حساس است بیشترین درصد بیوپلیمر و کمترین دمای خشک کردن (۴۲ درجه سانتی‌گراد و ۰.۲٪ غلظت بیوپلیمر) به عنوان شرایط بهینه در نظر گرفته شد.

با توجه به نتایج جدول ۹ و مقدار P-Value در زمان صفر و روز هفتم (جداول آنالیز واریانس ۱۰ و ۱۱)، تفاوت معنی داری در نتایج به دست آمده برای دو فاکتور غلظت بیوپلیمر و دمای خشک کردن در شرایط خطی مشاهده نشد. بنابراین با توجه

**Table 10** Analysis of variance of drying temperature and biopolymer concentration at Day zero

Source	Coefficient estimate	f-value	p-value
Model	1.09	0.90	0.531
Linear	---	0.36	0.712
Temperature	0.018	0.33	0.581
Polymer concentration	0.019	0.38	0.557
Lack-of-fit	----	0.43	0.741
R-square	39.08		
Coefficient of variation (CV)	7.9%		

**Table 11** Analysis of variance of drying temperature and biopolymer concentration at Day seven

Source	Coefficient estimate	F-value	P-value
Model	1.07	1.01	0.478
Linear	----	0.43	0.669
Temperature	-0.008	0.06	0.812
Polymer concentration	-0.029	0.79	0.403
Lack-of-fit	----	3.52	0.128
R-square	41.82		
Coefficient of variation (CV)	8.3%		

در جدول ۱۲ نشان داده شده است. نتایج نشان داد در نمونه پوشش دار با پوشش دار تفاوت معنی داری بین مدت زمان روز صفر و سوم مشاهده نمی شود اما در روز دهم کاهش معنی داری در میزان بتاکاروتون موجود در کیکها ایجاد شده است ( $P < 0.05$ ). در نمونه شاهد نیز تفاوت معنی داری بین نمونه های زمان صفر و روز سوم دیده نشد در حالی که در روز دهم کاهش معنی داری در میزان بتاکاروتون کیک مشاهده شد ( $P \geq 0.05$ ).

### ۱-۳-۳- مقایسه شرایط بهینه در نمونه پوشش دار با نمونه شاهد

در این مرحله مقدار بتاکاروتون در نمونه بهینه پوشش دار با نمونه شاهد (بدون پوشش) در سه تکرار و در زمان های صفر، روز سوم و روز دهم مقایسه شد.

نتایج بررسی مقدار بتاکاروتون در روز صفر، سوم و دهم در نمونه پوشش دار شده و بدون پوشش (شاهد) با شرایط بهینه

**Table 12** The average amount of Beta-carotene in the coated samples and control at Days zero, three and ten.

Beta- carotene (mg/14g)		Day
Control	Coated samples	
2.285 <sup>aA</sup> ±0.34	1.989 <sup>aA</sup> ±0.02	Zero
1.885 <sup>aA</sup> ±0.15	2.124 <sup>aA</sup> ±0.13	Three
1.134 <sup>bA</sup> ±0.16	1.417 <sup>bA</sup> ±0.31	Ten

Means within each column with different lower case are significantly ( $P < 0.05$ ) different

Means within each row with different upper case are significantly ( $P < 0.05$ ) different

موضوع نشان می دهد بتاکاروتون ترکیب حساسی نسبت به دماهای پایین و در حدود ۵۰ درجه سانتی گراد نیست. ولی به هر حال بیشترین مقدار بتاکاروتون در زمان صفر در دمای ۵۵ درجه و غلظت بیوپلیمر ۰.۲٪ مشاهده شد. در صورتی که بررسی بتاکاروتون کیکها پس از هفت روز نگهداری در شرایط محیط نشان داد که بیشترین مقدار بتاکاروتون در دمای ۵۰ درجه سانتی گراد و غلظت بیوپلیمر ۰.۷۹٪ باقی مانده است. به این ترتیب وجود پوشش در نمونه ها باعث شده است تا پایداری بتاکاروتون حداقل تا هفت روز به خوبی در کیکها ثابت باقی بماند. استدلالی که می توان برای آن در نظر گرفت این است

همچنین مقایسه بین میانگین مقدار بتاکاروتون در نمونه های کیک فاقد گلوتن شاهد (بدون پوشش) و پوشش دار تفاوت معنی داری را نشان نداد. در هر حال بررسی نمونه های روز دهم نشان می دهد که کاهش بتاکاروتون در نمونه های شاهد نسبت به نمونه های پوشش دار تا حدی بیشتر است که نشان دهنده اثر مثبت پوشش بر ماندگاری بتاکاروتون در کیکها می باشد (جدول ۱۲).

همانگونه که از نتایج بهینه سازی مشخص شد تغییرات دمای خشک کردن کیک و غلظت بیوپلیمر در زمان صفر تأثیر معنی داری بر روی مقادیر بتاکاروتون ندارند (جدول ۹) که این

ایزومرهاي بتاكاروتون پس از ۱۱ دقیقه گرمادهی به حالت تعادل می‌رسند [۱۲]. بنابراین می‌توان نتیجه گیری نمود که علت عدم تاثیر معنی‌دار دمای خشک کردن بر روی میزان بتاکاروتون کیک‌ها به دلیل مقاومت آنها به حرارت‌های پایین و تبدیل آنها به ایزومرهاي دیگر و یا لیکوپن باشد که طول موج حداقل جذب آنها در اسپکتروفتومتر چندان متفاوت نیست.

مقایسه شرایط بهینه با نمونه بدون پوشش در طول مدت نگهداری نشان می‌دهد، میزان بتاکاروتون در کیک‌ها بعد از سه روز کاهش معنی‌داری در نمونه‌های پوشش‌دار و بدون پوشش ندارد. اما در روز دهم کاهش میزان بتاکاروتون در هر دو نمونه شاهد و نمونه پوشش‌دار شده مشاهده می‌گردد. از آنجاکه بتاکاروتون یک ترکیب حساس به اکسیژن و نور است، کاهش ایجاد شده می‌تواند به دلیل تجزیه بتاکاروتون تحت تاثیر نور و هوای محیط باشد (جدول ۱۲). نکته قابل توجه این است که میزان کاهش در نمونه‌های پوشش‌دار شده به مراتب کمتر از نمونه‌های شاهد است که به خوبی تاثیر پوشش بر روی حفظ بتاکاروتون کیک‌ها را نشان می‌دهد. در واقع وقتی زمان نگهداری کیک‌ها طولانی می‌شود بتاکاروتون در قسمت‌های بیرونی تر بیشتر در معرض هوا و نور قرار داشته و در نتیجه بیشتر تجزیه می‌شوند در حالیکه بتاکاروتون در قسمت‌های درونی تر کیک از معرض نور و هوای محیط دور می‌ماند. در این حالت پوشش بیوپلیمری می‌تواند از تجزیه بتاکاروتون در سطح کیک‌ها جلوگیری کند. این موضوع به صورت چشمی و در ظاهر کیک‌ها پس از ده روز به خوبی قابل مشاهده بود. شکل ۱ نمونه شاهد بدون پوشش بیوپلیمری و شکل ۲ نمونه پوشش‌دار را پس از ده روز نگهداری نشان می‌دهد.



**Fig 1** Appearance of cake without coating (control) after 10 days storage at ambient temperature



**Fig 2** Appearance of coated cake after 10 days of storage at ambient temperature

که مخلوط کردن بتاکاروتون در داخل کیک می‌تواند باعث شود تا مقدار زیادی از بتاکاروتون به صورت طبیعی و توسط ترکیبات کیک حفظ شود و تاثیر دما و هم‌چنین اکسیژن محیط در آن به حداقل برسد. به همین دلیل احتمالاً غلظت بیوپلیمر و دمای نسبتاً پائین خشک کردن کیک‌ها پس از پوشش دهنی موجب کاهش بتاکاروتون در کیک‌ها نمی‌گردد. در این پژوهش خمیر کیک حاوی بتاکاروتون دارای رنگ نارنجی پررنگ بود که پس از پخت، رنگ کیک‌ها کم‌رنگ‌تر می‌شود که احتمالاً به دلیل تبدیل حالت ترانس به سیس بتاکاروتون است. در واقع مقدار بتاکاروتون در هر ۱۴ گرم خمیر کیک قبل از پخت برابر با  $1/14$  میلی‌گرم بود درحالی که مقدار آن در نمونه پخته شده بعد از حرارت‌دهی در  $120^\circ\text{C}$  درجه سانتی‌گراد به مدت ۲۵ دقیقه و بدون پوشش بیوپلیمری (کیک  $14$  گرمی) برابر با  $1/10$  میلی‌گرم بود. باید توجه داشت که سفیده‌ی تخم مرغ بعد از پخته شدن و شکر می‌توانند امولسیفایرهای خوبی جهت به دام انداختن بتاکاروتون باشند. کیک برنجی دارای بافت بسیار متراکمی است. بنابراین می‌تواند تا حدی از این رفتار بتاکاروتون داخل کیک و نه سطح آن جلوگیری کند. در پژوهشی ترکیب فیتو کمیکال پالپ گوجه حاوی لیکوپن، بتاکاروتون و ویتامین C را در شرایط دمایی مختلف مانند جوشاندن و سرخ کردن قرار دادند. سیس میزان کاهش مواد غذی ذکر شده را بررسی کردند. نتایج نشان داد دو دقیقه جوشاندن موجب افزایش لیکوپن از  $12/4$  به  $13/9$  میلی‌گرم در صد میلی‌لیتر و کاهش بتاکاروتون از  $15/7$  به  $12/2$  میلی‌گرم در صد میلی‌لیتر و هم‌چنین کاهش ویتامین C شد. شرایط سرخ کردن نیز به همین ترتیب موجب افزایش لیکوپن و کاهش بتاکاروتون در مدت زمان  $30$  دقیقه سرخ کردن شد [۱۰]. افزایش لیکوپن در تحقیق ذکر شده می‌تواند به دلیل تبدیل مقداری از بتاکاروتون به لیکوپن باشد. هم‌چنین در مطالعه‌ای که تأثیر فرآیندهای دمایی بر روی ایزومریزاسیون‌های سیس و ترانس بتاکاروتون در آب هویج انجام شد، نتایج نشان دادند، فرآیندهای پاستوریزاسیون و استریلیزاسیون در  $121^\circ\text{C}$  درجه سانتی‌گراد موجب ایزومریزاسیون جزئی بتاکاروتون می‌شوند. درحالی که استریلیزاسیون در دمای  $130^\circ\text{C}$  درجه سانتی‌گراد و بلانچینگ (آنژم‌زادی) موجب افزایش سطح ایزومرهاي سیس می‌شوند [۱۱]. تیمارهای دمایی عمدهاً تمام بتاکاروتون‌های ترانس را در درجه حرارت زیر  $100^\circ\text{C}$  درجه سانتی‌گراد به شکل  $13$  و  $15$  سیس- بتاکاروتون تبدیل می‌کند. درحالی که ایزومر  $-9$  سیس بالای  $100^\circ\text{C}$  درجه سانتی‌گراد شکل می‌گیرد. غلظت

سنچش فعالیت آبی نمونه‌های شاهد و پوشش داده شده با بیوپلیمر در زمان صفر و پس از ۷ روز در جدول ۱۳ نشان داده شده است.

### ۳-۴- سنجش فعالیت آبی Water) (activity

Table 13 Water activity of control and coated sample at Day zero and seven of storage

Water activity (%)		Sample
Day seven	Day zero	
0.24	0.31	Control (no coating)
0.26	0.78	Coated cake with 2.2% corn starch solution

نمونه‌ها مشاهده نشد. بنابراین روش مورد استفاده برای پوشش دهنی می‌تواند بدون ایجاد آلودگی در کیک‌ها برای پوشش دهنی استفاده شود.

جدول ۱۴ مقدار رطوبت نمونه‌های شاهد و پوشش دار را نشان می‌دهد.

اکثر باکتری‌های عامل فساد مواد غذایی در فعالیت آبی کمتر از ۰/۹۱ رشد نمی‌کنند. کپک‌های عامل فساد مواد غذایی نیز در حداقل فعالیت آبی ۰/۸۰ قادر به رشد هستند. نتایج نشان می‌دهند که خطر فساد باکتریایی هم در نمونه شاهد و هم در نمونه با پوشش بیوپلیمری ۲/۲٪، بسیار کم است. ولی امکان رشد کپک‌ها وجود دارد. در هر حال به منظور اطمینان نمونه‌ها به مدت سه هفته در هوای آزاد نگهداری شد و میزان رشد کپک و باکتری در آن بررسی شد و هیچ‌گونه رشد و فسادی در

Table 14 Moisture content (%) of control and coated samples

Muisture content (%)	Control(no coating)	Coated cake with 2.2% corn starch solution
8.09%		
16.07%		

برنجی پوشش داده شده با چهار نوع بیوپلیمر وجود نداشت، می‌توان از این بیوپلیمرها در جهت غنی‌سازی محصولات غذایی به خصوص کیک‌ها بهره برد. آنتی‌اکسیدان‌ها نیز یکی از موادی هستند که در غنی‌سازی غذاها استفاده می‌شوند. کیک‌ها مخصوصاً کیک برنجی به دلیل تراکم بافتی که دارند می‌توانند با انواع آنتی‌اکسیدان غنی شده و موجب حفظ آن در شرایط بسته‌بندی شوند. پوشش‌های بیوپلیمری نیز قادر به حفظ آنتی‌اکسیدان‌ها در کیک‌ها هستند. در این مطالعه محلول بیوپلیمری ۲/۲٪ نشاسته ذرت عملکرد خوبی در حفظ بتاکاروتین به عنوان یک آنتی‌اکسیدان قوی داخل کیک برنجی در مدت سه و ده روز نگهداری را داشت.

همان‌طور که نتایج نشان می‌دهد پوشش بیوپلیمری به مقدار قابل توجهی موجب افزایش رطوبت نمونه پوشش دار شده نسبت به نمونه شاهد در زمان صفر و پس از ۲۴ ساعت گرماخانه‌گذاری شده است. حفظ رطوبت در کیک‌ها موجب ماندگاری بیشتر و مطبوعیت کیک‌ها می‌شود. از آنجا که کیک‌های بدون گلوتن بسیار سریع خشک شده و قادر به حفظ رطوبت به اندازه کیک‌های معمولی نیستند، معمولاً ماندگاری کیک‌ها علاوه بر افزایش ماندگاری بتاکاروتین در داخل کیک، موجب بهبود و نرمی بافت کیک در شرایط نگهداری کوتاه مدت و در نتیجه افزایش ماندگاری این کیک‌ها می‌گردد.

### ۵- منابع

- [1] Nourani, M., Elhami, rad. M., Hosseini tabatabaei, F. 1393. Functional foods. National Conference of new technologies in food industry, 1-7
- [2] Nahid, P., Alamzade, A., Hashtochahar, S., Akhlaghpasand, H. 1393. Extraction

### ۴- نتیجه‌گیری

با توجه به نتایج بدست آمده کیک بدون گلوتن می‌تواند به عنوان یک ماده غذایی پر مصرف و پایه جهت تولید محصول غذایی عملگرای مطرح شود. با توجه به اینکه در ارزیابی حسی تفاوت معناداری در طعم، بافت، رنگ و بو بین کیک‌های

- base on shrimp concentrate obtained from marine industrial waste for fish sausage preservation. *Food control*, 70:325-332.
- [9] Fortoul -Altamirano, R., Moreno-Terrazas, R., Quezada-Gallo, A., Rosell, M, C. 2012. Viability of some probiotic coating in bread and its effect on crust mechanical properties. *Food Hydrocolloids*, 29:166-174.
- [10] Charles, I. N., Jude, I. O., James, O. E., Tochukwu, E, C. 2014. Effect of thermal processing on lycopene, beta-carotene and vitamin C content of tomato. *Journal of Food and Nutrition Sciences*,2(3):87-92.
- [11] Marx, M., Stuparic, M., Schieber, A., Carle, R. 2003. Effect of thermal processing on trans-cis isomerization of Beta-carotene in carrot juices and carotene-containing preparation. *Food Chemistry*, 83: 609-617.
- [12] Doering Von, W . E., Sotirio-Leventis, C., Roth,W,R.1995.Thermal interconversions among 15-cis, 13-cis, and all trans Beta-carotene: kinetics, Arrhenius parameters, thermochemistry, and potential relevance to anticarcinogenicity of all Beta- carotene. *Journal of the American Chemical Society*,117:2747-2757.
- methods of Beta carotene s from carrot and compare these methods.. *Handbook of food engineering*, 1-8.
- [3] Ghambarzadeh, B., Pezeshki najafabadi, A., Almasi, H. 1388. Active biopolymers at food packaging. *Journal of Food Science and Technology*,8.31.123-135
- [4] Gross, J. 1991. Pigments in vegetables, New York: Van Nordstrand Reinhold.
- [5] Standard of Iran. No 2507. 1374. <http://isiri.org/portal/file/108865/14728.pdf>.
- [6] Feng, X., Bansal, N., Yang, H., 2016. Fish Gelatin combined with Chitosan coating Inhabits Myofibril degradation of golden pomfret (*Trachinotus ovatus*) fillet during cold storage. *Food science and Technology Programme*,1-20.
- [7] Farajzadeh, F., Motamedzadegan, A., Shahidi, A., Hamzeh, S. 2016. The effect of Chitosan- Gelatin coating on the quality of shrimp (*Litopenaeus vannamei*) under refrigerated condition. *Department of food science and technology*,10.1-28.
- [8] Aleman, A., Gonzales, F., Arancibia, Y, M., Lopez-Caballero, E, M., Montero, P., Gomez-Guillen, C, M. 2016. Comparative study between film and coating packaging

## **Optimization of envelopment in enriched gluten free cakes with beta – carotene using response surface methodology**

**Bahari, Z.<sup>1</sup>, Zare, D.<sup>2\*</sup>, Movahed, S.<sup>3</sup>**

1. M.Sc Student, Department of Food Science, Varamin – Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran.

2. Department of Biotechnology, Iranian Research Organization for Science and Technology

3. Associate Professor, Department of Food Science, Varamin – Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran.

In celiac disease, patients are not capable to digest the gluten of food. Beta-carotene is precursor for vitamin A and one of the most powerful fat-soluble antioxidants. Enrichment of gluten free cakes with beta-carotene and extension of shelf life of beta-carotene by coating can improve nutritional quality of diet in celiac patients and even healthy people. In the present research the effect of coating of gluten free cakes on sustainability of added beta-carotene was investigated and effective factors on coating and enrichment of gluten free cakes were optimized. In the first phase, gluten free cakes were covered by alginate, xanthan, corn starch and caseinate polymer solution (1%) and sensory evaluated. In the second phase, beta-carotene was added into the cakes dough, directly or into the biopolymer solutions of sodium caseinate or corn starch and cakes were sensory evaluated. According to the results, cakes contain beta-carotene coated with corn starch solution were selected. The concentration of biopolymer and drying temperature was then optimized by response surface methodology (RSM). Based on RSM results, the optimum condition was 2.2% corn starch for biopolymer concentration and 42 °C for drying temperature. After this, beta-carotene durability in optimized condition was evaluated. Results showed that reduction of beta-carotene in coated samples was significantly lower than control (without coating) during 10 days storage. Therefore, coating with 2.2% corn starch could increase durability of beta-carotene inside the cake during storage.

**Keywords:** Gluten free cakes, Coating, Biopolymer, Beta-carotene, Optimization

---

\* Corresponding Author E-Mail Address: zare@irost.ir