

بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن هسته عناب

الله پوشانه^۱، محمدعلی سحری^{۲*}، نجمه شمس نجف آبادی^۳

۱- دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

۲- استاد گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

۳- دانش آموخته دکتری، گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

(تاریخ دریافت: ۹۵/۰۴/۱۰ تاریخ پذیرش: ۹۶/۰۲/۱۰)

چکیده

عناب با نام علمی *Ziziphus jujuba Mill* از خانواده رامنه بومی مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری ایران است. هسته عناب حاوی ترکیب روغنی با ارزش تغذیه‌ای بالا بوده که غنی از ترکیبات مختلف است و کاربردهای زیادی در صنایع خوارکی دارویی و بهداشتی دارد. در این تحقیق برخی از ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی روغن هسته عناب مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله اول روغن هسته عناب توسط حلal هگران در دمای محیط به روش غرقابی استخراج شد. درصد روغن موجود در روغن هسته عناب اندازه‌گیری شد. سپس خصوصیات فیزیکوشیمیایی (رنگ، ضریب شکست، نقطه ذوب، شاخص‌های یدی، اسیدی، صابونی، پراکسید و تیوباریتوريک اسید (TBA)، ترکیب اسیدهای چرب، اندیس‌های تغذیه‌ای (ω₃، ω₆، ω₉، PUFA، SFA)، مقدار توکوفرول و استرول موجود در روغن هسته عناب مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج بدست آمده: مقدار روغن درصد، اندیس رنگ قرمزی / زردی (۱۴/۴۷۰۵) ضریب شکست (۱/۴۶۷nD) و نقطه ذوب (۰/۰۴۲ ± ۰/۰۸) عدد یدلی I₂ بر ۱۰۰ گرم روغن، عدد اسیدی (۰/۰۵۲ ± ۰/۰۵۲) میلی گرم پتاں بر گرم روغن)، عدد صابونی (۷۲۸۱ ± ۱۰۰/۵۳۸۵) میلی گرم پتاں بر گرم روغن)، عدد پراکسید (بسیار ناچیز) و شاخص تیوباریتوريک اسید (بسیار ناچیز) بود. همچنین روغن هسته عناب دارای ۴۷/۳ درصد اولئیک اسید و ۳۲/۶ درصد لینولئیک اسید بوده و از جهت خواص تغذیه‌ای و پایداری، روغن مناسبی است. اندیس‌های تغذیه‌ای (ω₃ و ω₆) به ترتیب ۲/۸۳۴ و ۳۴/۷۵۷ درصد و PUFA ۱۳/۴۴ درصد، SFA ۸/۵۵ درصد بود. روغن هسته عناب مورد مطالعه حاوی ۹۳۵ بی‌بی ام آلفا توکوفرول، ۷/۸۲ بی‌بی ام بتا و گاما توکوفرول و نیز ایزومر دلتا ۴/۴۵ بی‌بی ام و میزان استرول کل ۲۳۳۰/۸ بی‌بی ام بود؛ بنابراین از جهت خواص پایداری و تغذیه‌ای روغنی مناسب تشخیص داده شد.

کلید واژگان: اسیدهای چرب، استرول، توکوفرول، خصوصیات فیزیکوشیمیایی، روغن هسته عناب

۱- مقدمه

(E)، آسکوربیک اسید، توکوفرولها، کاروتونوئیدها، ترکیبات فنولیک، آنتوسیانین‌ها و املاح فسفر و کلسیم هستند [۳]. روغن‌ها و چربی‌ها بخش مهمی از رژیم غذایی انسان را تشکیل می‌دهد و در بسیاری از فرآورده‌های غذایی به عنوان ماده اولیه کاربردهای ویژه‌ای دارند. چربی‌ها و روغن‌ها مواد غذایی با ارزشی هستند که علاوه بر تأمین انرژی نقش مهمی در بقای سلامت و ادامه حیات داشته و در گروه مواد مصرفی ضروری جای دارد. چربی‌ها و روغن‌ها منبع فشرده‌ای از انرژی غذایی بوده و ویتامین‌های محلول در چربی (A, D, E, K) که در تأمین سلامت نقش مهمی را به عهده دارند، از طریق مصرف این مواد به بدن می‌رسند، همچنین اسیدهای چرب اساسی که نقش آنها در سلامت و انجام اعمال بدن به اثبات رسیده و بدن قادر به ساختن آنها نیست از راه مصرف روغن‌های خوارکی تأمین می‌شود. روغن‌ها و چربی‌ها را کنسانتره کالری می‌گویند زیرا نقش اساسی در متابولیسم بدن انسان دارند، از سوختن هر گرم چربی در بدن در حدود ۹ کیلو کالری انرژی حاصل می‌شود [۴].

با توجه به اهمیت تغذیه‌ای روغن‌های خوارکی در رژیم غذایی و همچنین جایگاه ارزشمند روغن هسته‌عناب در طب سنتی ایران، انجام تحقیقات بیشتر در زمینه استفاده از روغن هسته عناب در صنایع غذایی ضروری به نظر می‌رسد. در این پژوهش خصوصیات فیزیکوшیمیایی (رنگ، ضریب شکست، نقطه ذوب، شاخص‌های پراکسید، یدی، اسیدی، صابونی، شاخص تیوباریتومیک اسید (TBA)، ترکیب اسیدهای چرب، اندیس‌های تغذیه‌ای (ω₃, ω₆, ω₉) PUFA SFA)، مقدار توکوفرول‌ها، استرول‌ها و همچنین درصد روغن موجود در روغن هسته عناب مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۲- مواد و روش‌ها

مواد اصلی مورد آزمایش دانه عناب واریته بیرونی با مراجعه به موسسه اصلاح نهال و بذر کرج تهیه و به آزمایشگاه منتقل شد. مواد شیمیایی مورد استفاده نیز همگی با بالاترین خلوص از شرکت مرک آلمان تهیه گردید.

۱-۱- استخراج روغن

ابتدا هسته میوه عناب شکسته و توسط دستگاه آسیاب آزمایشگاهی خرد شدند. به مدت ۴۸ ساعت در دمای محیط

عناب با نام علمی *Ziziphus jujuba Mill* که معمولاً تحت عنوانی خرمائی قرمز، خرمائی چینی یا خرمائی هندی نیز شناخته شده است، از خانواده رامناسه بوده، فرم درختچه عناب با ارتفاع متوسط ۱۰-۵ متر، خزان دار و بدون کرک با قابلیت رویش در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری است. مجموعاً شامل ۵۰ جنس و ۶۰۰ گونه‌اند که بیشتر در اروپا و نواحی استوایی می‌رویند. دو گونه اصلی *Ziziphus mauritania* و *Ziziphus jujuba* به صورت اقتصادی و با بازدهی کشت بالا در بیشتر کشورهای جهان تولید می‌شود. در ایران نیز عناب از گیاهان بومی فلات نواحی مدیترانه و آسیای معتدل است و به طور عمده در استان‌های خراسان، گلستان، مازندران، فارس، اصفهان، یزد، همدان، قزوین و قم وجود دارد. عناب به عنوان یکی از محصولات مهم و استراتژیک با غبانی استان خراسان جنوبی جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد کشاورزی این استان دارد و از ۱۲۶۰ هکتار باغات عناب ایران، میزان ۱۱۶۸ هکتار مربوط به خراسان جنوبی بوده که با تولید ۱۷۰۲ تن عناب خشک مقام اول این محصول را به خود اختصاص داده است، به گونه‌ای که ۹۸ درصد تولید عناب در این استان محقق می‌گردد. عناب گیاهی مقاوم به خشکی، شوری، نوسانات دما، آفات و بیماری‌ها بوده و در طی دوران خشکسالی کمترین خسارت را در مقابله با سایر محصولات متحمل شده و به همین دلیل به عنوان یکی از محورهای توسعه باغات در الگوی کشت استان خراسان جنوبی مدنظر می‌باشد. میوه نارس آن نرم، سبز رنگ و زیتونی شکل با خواص دارویی و ضد اکسایشی بالا است و میوه رسیده آن چروکیده و قهوه‌ای مایل به ارغوانی تیره می‌باشد. میوه عناب طبق نظر حکماء طب سنتی در تقویت فعالیت‌های معده، طحال و دستگاه گوارش مؤثر بوده و آرام‌کننده اعصاب، خواص ضد قارچی و ضد باکتری، ضدالتهابی و ضد اکسایشی، مقابله با افزایش قند خون، درمان سرماخوردگی و آنفلوانزا، مقوی کبد و قلب، کاهش فشار خون، تصفیه خون و نیز کاهش تری‌گلیسرید و کلسترول خون از دیگر خصوصیات مفید آن به شمار می‌آید [۱ و ۲].

میوه‌هایی مانند عناب بخش کوچکی از کالری روزانه را تأمین می‌کند ولی دارای ترکیبات با ارزشی نظیر ویتامین‌ها (ویتامین‌های گروه C, A, B)، پروویتامین‌ها (نظیر ویتامین

۹-۲- اندازه گیری عدد پراکسید

عدد پراکسید با روش پیشنهادی محاسبه گردید [۷].

۱۰-۲- اندازه گیری اندیس تیوباربیتوريک اسید (TBA)

محصولات ثانویه اکسیداسیون چربی با شاخص اسید تیوباربیتوريک اندازه گیری شد. عدد اسید تیوباربیتوريک شاخصی از میزان مالون دی الدهید موجود در ۱۰۰۰ گرم چربی می باشد. عدد اسید تیوباربیتوريک مطابق استاندارد ایران به شماره ۱۰۴۹۴ (روغن ها و چربی های گیاهی- اندازه گیری عدد اسید ۲- تیوباربیتوريک به روش مستقیم) انجام شد [۹].

۱۱-۲- تعیین ترکیب اسیدهای چرب در نمونه ها توسط کروماتوگرافی گازی

از دستگاه کروماتوگرافی گازی مدل Chrompack CP 9002 استفاده شد. ستون CP-FFAP-CB fused silica به طول ۳۰ متر، قطر ۰/۲۵ میلی متر و ضخامت نازک داخل لوله (فاز ثابت) ۰/۳ میکرومتر مورد استفاده قرار گرفت. گاز حامل هلیم با خلوص ۹۹/۹۹ بود. فشار گاز حامل ابتدای ستون ۲۰ کیلو پاسکال و برنامه حرارتی به این صورت بود که در دمای 140°C به مدت ۲۰ دقیقه و نیم، سپس با سرعت ۲۰ درجه سانتی گراد در دقیقه تا 180°C گرم شده و ۲۰ دقیقه در این دما مانده و سپس با سرعت 20°C در دقیقه دما تا 200°C درجه افزایش یافته و تا پایان در این دما نگه داشته شد. زمان کلی ۴۰ دقیقه و نیم و عمل تزریق و شیر تزریق split-split less نسبت ۱ به ۱۰ است.

عمل مشتق سازی اسیدهای چرب برای تزریق به دستگاه کروماتوگرافی گازی به روش متکalf (Metcalf, 1996) انجام شد: ۳-۴ قطره از نمونه را در یک لوله ای آزمایش ریخته شد، سپس ۵ سی سی سود متابولی ۲ درصد به آن اضافه شد، سپس ۱ سی سی استاندارد داخلی (اسید چرب C₁₅) با غلظت ۲ میلی گرم بر میلی لیتر اضافه و تکان داده شد، سپس ۱۰ دقیقه در حمام آب جوش گذاشت، سپس لوله را خارج تا خشک شود. سپس ۵۲/۱۷۵ سی سی BF₃ ۲۰ درصد به آن اضافه شد و سپس ۳ دقیقه در حمام آب جوش گذاشت، بعد از خشک شدن مجدد ۱ سی سی هگزان اضافه کرده و تکان داده شد و سپس ۱ سی سی محلول نمک اشباع (۱۰۰ ml/۳۰ g) اضافه و به شدت تکان داده شد. بعد از دو فازی شدن، فاز رویی در

خشک شد [۵]. به میزان سه برابر وزن نمونه از پودر حاصل از خرد کردن مغز دانه هسته عناب برای استخراج روغن به روش غرقابی و با حلال هگزان استفاده شد. به مدت ۲۴ ساعت در دمای 40°C عمل استخراج روغن توسط گرمخانه تحت تکان مداوم قرار گرفت، سپس مخلوط حلال و روغن توسط دستگاه تبخیر کننده چرخان تحت خالا در دمای 45°C جدا شد [۶].

۲-۲- تعیین درصد روغن

استخراج روغن با کمک حلال هگزان (مرک، آلمان) با روش سوکسله بر اساس روش پیشنهادی [۷] صورت گرفت.

۲-۳- اندازه گیری رنگ روغن

رنگ نمونه ای روغن با استفاده از رنگ سنج لاویاند (مدل F, Tintometer) اندازه گیری شد. نمونه ای روغن به یک سل ۱۰ میلیمتری انتقال و رنگ آن در دمای ۳۰ درجه سانتی گراد با انطباق بر اسلایدهای رنگی استاندارد، اندازه گیری گردید [۷].

۲-۴- تعیین ضریب شکست

برای تعیین ضریب شکست نمونه ها با استفاده از رفراکتومتر، مدل RX-7000a ساخت شرکت ATAGO کشور ژاپن در دمای 20°C طبق روش استاندارد ملی ایران شماره (۵۱۰۸) اندازه گیری ضریب شکست در روغن ها و چربی ها خواراکی آبان (۱۳۷۷) انجام شد [۸].

۲-۵- اندازه گیری نقطه ذوب روغن

به کمک روش لوله ای موین اندازه گیری شد [۷].

۲-۶- اندازه گیری عدد یدی

تعیین عدد یدی نمونه ها طبق روش استاندارد ملی ایران شماره ۴۸۸۶ (اندازه گیری عدد یدی به روش هانوس در روغن ها و چربی ها خواراکی - مرداد ۱۳۷۹) انجام شد [۹].

۲-۷- اندازه گیری عدد اسیدی

عدد اسیدی بر طبق Aa 6-38 (AOCS, 1995) اندازه گیری شد [۱۲].

۲-۸- اندازه گیری عدد صابونی

برای تعیین عدد صابونی نمونه ها طبق روش استاندارد ملی ایران شماره (۱۰۵۰۱) اندازه گیری عدد صابونی در روغن ها و چربی ها گیاهی و حیوانی انجام شد [۱۰].

سرعت $10 \text{ min}^{\circ}\text{C}$ تا رسیدن به دمای 300°C و نگهداری در این دما به مدت ۱۰ دقیقه انجام گرفت تا ترکیب‌های مختلف جدا شوند. از آشکارساز یونیزاسیون شعله‌ای با دمای 300°C استفاده شد. شناسایی استرول‌ها بر حسب زمان بازداری نسبی انجام شد [۱۳].

۱۴-۲ طرح آماری

با توجه به این‌که در این طرح فقط یک تیمار (روغن هسته عناب) وجود دارد، امکان تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها وجود نداشته و نتایج به صورت انحراف معیار \pm میانگین نشان داده شده‌اند. برای رسم نمودارها از نرم افزار Excel ۲۰۱۳ استفاده گردید. همچنان انجام آزمایشات سه بار تکرار شده بودند.

۳- نتایج و بحث

۱-۳ خواص فیزیکوشیمیایی روغن هسته عناب

مشخصات هسته و برخی ویژگی‌های هسته روغن عناب در جدول ۱ آورده شده است. با تعیین ویژگی‌های روغن و چربی می‌توان ارزیابی دقیقی از کیفیت تغذیه‌ای و پایداری اکسایشی آن‌ها به منظور تعیین زمان مناسب نگهداری و کاربرد آن‌ها انجام داد. لازم به ذکر است به ازای هر 100 g روغن عناب ۸ گرم مغز و 0.08 g آن روغن نمونه حاصل شد. میانگین مقدار روغن موجود در هسته عناب $8/9$ درصد بود. این مقدار در مقایسه با بازده روغن استحصالی از هسته انگور $10-9$ درصد روغن و هسته انار $19/3-6/6$ درصد، متفاوت می‌باشد [۱۴].

رنگ از جمله ویژگی‌های مهم روغن بوده و به عنوان راهنمای در تصفیه‌ی روغن‌های خوراکی استفاده می‌شود. متوسط مقادیر شاخص‌های رنگی روغن هسته عناب R، Y و B به ترتیب میزان قرمزی (کدورت) و زردی (شفافیت) و سبزی روغن را نشان می‌دهند. در سیستم رنگ‌سننجی لاویباند، رنگ روغن را به صورت نسبت Y/R (نسبت درجه زردی به قرمزی) نشان می‌دهند (AOCS AOCS 45-43b) روش (Cc 13b-45) مقدار این عدد در روغن هسته عناب، $14/4705$ تعیین گردید، این ویژگی در روغن کنجد و آفتابگردان مطابق استاندارد ایران و کدکس 10 می‌باشد.

فالکون ۱ میلی‌لیتری ریخته، پس از تغليظ با نیتروژن $0/2$ میکرو لیتر، به دستگاه کروماتوگرافی گازی تزریق شد [۱۱].

= غلط اسید چرب مجہول وزن نمونه/سطح زیر پک استرول $2/7 \times$ سطح زیر پک اسید چرب مجہول

$$\omega_3 = C_{18:3}$$

$$\omega_6 = C_{18:2} + \text{ARA}$$

(۲-۲)

$$C_{16:0} + C_{17:0} + C_{18:0} + C_{14} + C_{15}$$

$$= C_{18:1} + C_{18:2} + C_{18:3} + C_{16:1}$$

۱۲-۲ اندازه گیری ترکیبات توکولی

به منظور تعیین مقدار توکوفرول‌ها از دستگاه HPLC مجهز به ستون Partisil Si 5μ ساخت شرکت Technochroma (طول ستون 25 سانتی متر ، قطر ستون $4/6 \text{ میلی متر}$ و اندازه ذرات فاز ساکن 5 میکرومتر) و آشکارساز ماوراء بنفس با طول موج 292 نانومتر استفاده شد. از مخلوط پروپانل: هگزان به نسبت $1:2$ با سرعت جریان 1 میلی لیتر بر دقیقه به عنوان فاز متحرک استفاده شد. عمل جداسازی در دمای محیط انجام شد و از گاز هلیوم با درجه خلوص $99/999$ درصد برای گاز زدایی فاز متحرک استفاده گردید.

در ابتدا نمونه روغن به نسبت 2 g در 100 میلی لیتر هگزان رقیق شده و از صافی $0/45$ میکرون عبور داده شد و به مقدار 20 میکرو لیتر به دستگاه تزریق گردید. استاندارد ایزومرهای توکوفرول نیز در شرایط مشابه به دستگاه تزریق شد. برای شناسایی گونه‌های توکوفرول، زمان بازداری استانداردها مقایسه شد و محل پیک هر یک از گونه‌ها معین گردید. برای اندازه گیری غلظت هر یک از گونه‌های توکوفرول از روش استاندارد خارجی استفاده شد [۱۲].

۱۳-۲ اندازه گیری استرول کل

محتوای استرول کل بر اساس روش Nyme و همکاران، سال ۲۰۰۹ انجام گرفت. جداسازی با کروماتوگرافی گازی youngling 6500 ساخت کشور کره جنوبی مجهز به ستون Supelco TYM-5 مارک $30 \text{ سانتی متر} \times 0/25 \text{ میلی متر}$ انجام شد. از گاز هلیم به عنوان گاز حامل با سرعت 20 cm/s استفاده شد و دمای محل تزریق 280°C بود. برنامه ریزی دمایی در 285°C با نگهداشتن به مدت 30 دقیقه و افزایش با

Table 1 Physicochemical properties of jujube seed oil

Average ± SD	Physicochemical properties
14.4705 ± 0.01	Color redness/yellowness (Lovibond, cell 1 inch)
1.4665 ± 0.00	Refractive index (25 °C)
3.8001 ± 0.42	Melting point (°C)
100.5385 ± 6.28	Saponification value (mg KOH/g oil)
60.7120 ± 3.87	Iodine value (g I ₂ /100g oil)
4.5855 ± 0.05	Acid value (mg KOH/g oil)
8.7480 ± 0.00	Percentage of oil (%)
Not detected	Peroxide value (mEq O ₂ /kg oil)
Not detected	TBA value (mEq Malonaldehyde /kg oil)

یدی نشان می‌دهد روغن هسته عناب نسبت به این دو روغن اثباعیت بیشتری داشته باشد [۱۸].

عدد پراکسید روغن مورد مطالعه بسیار ناچیز بود. عدد پراکسید نشان دهنده محصولات اولیه اکسیداسیون روغن‌ها و چربی‌هاست. ناچیز بودن این عدد نشان از بالا بودن ترکیبات آنتی‌اکسیدانی موجود در این روغن دارد. برای اطمینان عدد TBA اندازه‌گیری شد.

در تعیین عدد اسید تیوبارتوریک میزان مالون دی‌آلدهیدها اندازه‌گیری می‌شود. مالون دی‌آلدهید محصول ثانویه اکسیداسیون روغن‌ها می‌باشد. این عدد در روغن هسته عناب نیز مشاهده نشد. برای اطمینان بیشتر روغن‌ها مورد نظر دو هفته بعد از استخراج دوباره مورد آزمایش قرار داده شد و عدد پراکسید و TBA هم چنان ناچیز بود. ناچیز بودن عدد پراکسید و عدد TBA نشان دهنده کیفیت مناسب و غیراکسایشی روغن مورد مطالعه و وجود آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی در این روغن دارد [۱۹].

۲-۱-۳- ترکیب اسیدهای چرب روغن هسته عناب

روغن مورد مطالعه از جهت درصد اسیدهای چرب توسط (دستگاه اسپکتروفوتومتر گازی) بررسی شد و اندازه‌گیری اندیس‌های تغذیه‌ای آن محاسبه شد که در جدول زیر آورده شده است (جدول ۲)

اسیدهای چرب موجود در روغن هسته عناب شامل اسیدهای چرب: میریستیک (۱/۲۵۹ درصد)، پالمتیک (۸/۲۰۹ درصد)، پالمیتوئیک (۸/۶۲۹ درصد)، استئاریک (۲/۷۳۹ درصد)، اولئیک (۴۷/۳۲۴ درصد)، لیتوئیک (۳۲/۵۸۱ درصد)، لیونلیک (۲/۸۳۴ درصد)، آراشیدیک اسید (۲/۱۷۶ درصد) بود. میزان اسیدهای چرب اولئیک و لیتوئیک در روغن هسته عناب بیشترین مقدار را دارا بودند..

به نظر می‌رسد علت بیشتر بودن این عدد بالا بودن ترکیبات رنگی از جمله کاروتونئیدها، فلاونوئیدها و ... است [۱۵ و ۱۶]. عدد اسیدی نمونه ۴/۵۸۵۵ میلی‌گرم هیدروکسید پتاسیم بر گرم روغن شد این مقدار در مقایسه با روغن خام کنجد در استاندارد ایران که ۳ میلی‌گرم هیدروکسید پتاسیم بر گرم روغن است، کمی بیشتر است [۹]. به نظر می‌رسد بالاتر بودن عدد اسیدی روغن هسته عناب به دلیل هیدرولیز بیشتر روغن باشد [۱۷].

یکی دیگر از شاخص‌های تشخیص نوع روغن، ضربی شکست روغن می‌باشد. ضربی شکست روغن هسته عناب در محدوده (۱/۴۶۷) بود که در مقایسه با ضربی شکست روغن‌های کلزا و پنبه دانه طبق گزارش موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به ترتیب (۱/۴۶۷ - ۱/۴۶۴) و (۱/۴۶۴ - ۱/۴۵۸)، نسبتاً در یک محدوده است [۸ و ۹] و نشان دهنده‌ی مقدار بالای اسیدهای چرب غیر اشباع روغن می‌باشد. هرچه میزان غیر اشباع بودن روغن بیشتر باشد، ضربی شکست آن نیز بیشتر خواهد بود [۷]. نقطه ذوب روغن هسته عناب پایین است (۳/۸°C) و در دمای محیط مایع است.

عدد صابونی روغن هسته عناب به میزان (۱۰۰/۵۳ میلی‌گرم در گرم روغن) اندازه‌گیری شد. میزان اندیس صابونی روغن زیتون ۱۹۰/۳ و روغن بذر چای ۱۹۴/۹ میلی‌گرم پتاس در گرم روغن می‌باشد، به نظر می‌رسد پایین بودن عدد صابونی نسبت به دو روغن ذکر شده وجود میانگین وزن مولکولی چربی بالا در این روغن باشد [۱۸].

هم‌چنین اندیس یدی (هانوس) در روغن زیتون و بذر چای به ترتیب ۷۵/۱۰ و ۸۵ گرم یدید بر صد گرم روغن می‌باشد که در مقایسه با عدد یدی روغن هسته عناب (۶۰ گرم یدید بر صد گرم روغن) مقدار بیشتری را داراست. پایین بودن عدد

Table 2 Fatty acid profile of jujube seed oil in comparison with grape seed and pomegranate seed oils

Pomegranate seed oil (%)	Grape seed oil (%)	Jujube seed oil (present study) (%)	Nutritional value	Saturation degree	Carbon number	Fatty acid
-	0-0.3	1.259	-	Saturation	C ₁₄	Myristic acid (C ₁₄)
3.89	5.5-11	8.209	-	Saturation	C _{16:0}	Palmitic acid(C _{16:0})
-	0-1.2	1.639	-	Unsaturation	C _{16:1}	Palmitoleic acid(C _{16:1})
2.81	3-6.5	2.731	-	Saturation	C ₁₈	Stearic acid(C _{18:0})
8.48	12-28	47.324	ω ₉	Unsaturation	C _{18:1}	Oleic acid(C _{18:1} ,n ₉)
8.56	58-78	32.581	ω ₆	Unsaturation	C _{18:2}	Linoleic acid (C _{18:2} ,n ₆)
0.65	0-1	2.834	ω ₃	Unsaturation	C _{18:3}	Linolenic acid (C _{18:3} ,n ₃)
0.50	0-0.3	2.176	ω ₆	Unsaturation	C _{20:4}	Arachidonic acid (C _{20:4} ,n ₆)

می دهد با وجود درصد بالای غیراشباعی در روغن هسته عناب، اعداد پراکسید و TBA آن بسیار ناچیز است. این دو واقعیت نشان از وجود ترکیبات آنتی اکسیدانی قوی و ترکیبات زیست فعال بالا دارد [۲۲].

۱-۳-۳-ترکیبات استروولی

استروول های گیاهی گروهی از الکل های استروئیدی بوده که بخش عده فاز صابونی نشده روغن های گیاهی را تشکیل می دهند. یکی از شاخص های شناسایی روغن گیاهی به منظور تعیین کیفیت، اندازه گیری مقادیر فیتوستروول های آن ها می باشد. مقدار کل استروول در روغن هسته عناب ۲۳۳۰/۸ میلی گرم در ۱۰۰ گرم روغن تعیین شد. در بین استروول های موجود در روغن هسته عناب، سیتوستروول (۶۱/۰۹۳۳) درصد بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است. ترکیب استروول های روغن هسته عناب در جدول ۳ آورده شده است. این مقدار در مقایسه با مقادیر استروول های موجود در روغن های هسته انگور (۲۰۰۰ میلی گرم در ۱۰۰ گرم روغن) [۸] پایین تر و از استروول های دانه ای انار (۵۹۸۱/۷ میلی گرم در ۱۰۰ گرم روغن) [۲۱] بالاتر است. استروول ها ترکیبات آنتی اکسیدانی طبیعی بوده و وجود این ترکیبات در روغن پایداری آن را تضمین می نماید.

وجود آراشیدونیک اسید به عنوان اسید چرب ضروری چند غیراشباعی در روغن هسته عناب به عنوان عامل سلامتی برای انسان نقش مهمی را در این مورد بازی می کند. روغن هسته عناب، دارای ۱۳/۴۴۶ درصد اسیدهای چرب اشباع (SFA) و ۸۶/۵۵۸ درصد اسیدهای چرب غیراشباع (USFA) بود، هم چنین مجموع اسیدهای چرب ضروری امگا ۶ و امگا ۳ در روغن هسته عناب به ترتیب ۳۲/۷۴۱ و ۱۳۵۰ درصد بود نسبت اسیدهای چرب غیراشباع به اشباع معمولاً به عنوان معیاری از میزان سیرنشدگی روغن ها و چربی ها بوده و نیز تمایل آن ها به خوداکسایشی را نشان می دهد [۲۰]. طبق مقایسه ویژگی های ترکیبی روغن هسته عناب با روغن هسته انگور و هسته انار در جدول ۳ مشخص شد: اسید چرب غالب در روغن هسته عناب اولینیک اسید و در روغن هسته انگور و انار لینولئیک اسید می باشد. هم چنین میزان متوسط کل اسیدهای چرب اشباع در روغن هسته انگور ۱۵-۲۰ درصد و در انار ۷/۲ درصد و میزان متوسط کل اسیدهای چرب غیراشباع آن ها به ترتیب ۸۰-۸۵ درصد و ۸۲/۳۲ درصد است [۸ و ۲۱]. درصد نسبتاً بالای درجه غیراشباعی روغن هسته عناب در مقایسه با دو روغن هسته انگور و دانه ای انار نشانگر حساسیت این روغن نسبت به اکسیداسیون است. از طرفی نتایج نشان

Table 3 The percentage of sterols (mg per 100 g) of jujube seed oil in comparison with grape seed and pomegranate seeds oils

Pomegranate seed oil	Grape seed oil	Jujube seed oil (present study)	Sterol profile
0.17	0.5	0.1872	(CHOL) Cholesterol
8.55	7.5	7.9337	(CAMP) Campesterol
4.90	7.5	9.7962	(STIG) Stigmastanol
76.01	64	61.933	(SITOS) Sitosterol
5961.7	2000	2330.8	Total sterols

توکوفرول‌ها کاربرد وسیعی در صنایع غذایی، دارویی، بهداشتی و خوراک دام دارند. در صنایع غذایی از توکوفرول‌ها به عنوان آنتی اکسیدان به صورت افزودنی در تولید مارگارین، روغن سرخ کردنی و اسنک‌ها استفاده می‌شود. اجزای مختلف توکولی به عنوان آنتی اکسیدان، زنجیره‌ی رادیکالی را در غشاها و لیپوپروتین‌های پلاسمما و غذا شکسته، باعث کاهش ابتلای به بیماری‌های قلبی و انواع خاصی از سرطان‌ها می‌شود [۲۳].

جدول ۴ مقدار توکوفرول‌های موجود در روغن هسته عنب در مقایسه با روغن هسته انگور و دانه‌ی انار (بر حسب میلی‌گرم در کیلوگرم) [۲۱ و ۲۲].

Table 4 Tocopherols content (mg per 100 g) of jujube seed oil in comparison with grape seed and pomegranate seeds oils

Pomegranate seed oil	Grape seed oil	Jujube seed oil (present study)	Tocopherols
27.38	16-38	935.55	Alpha
5.7	0-89	7.825	Beta
140.261	0-73	7.825	Gamma
187.72	0-4	4.45	Delta
425.95	240-410	955.65	Total

- [3] Tripathi, M. Pandey, M.B. Jha, R.N. Pandey, V.B. Tripathi, P.N. and Singh, J.P. 2011. Cyclopeptide alkaloids from *Zizyphus jujube*. Fitoterapia. 72: 507-510.
- [4] Malek, F. 2000. Fats and Edible Vegetable Oils (Translation). First Ed. Agricultural Extension and Education Press. 474.
- [5] Weaver, C.M. and Daniel, J.R. 2003. The Food Chemistry Laboratory. 2nd Ed. Printed in the United States of America. 137.
- [6] AOCS. 2006. Official Methods and Recommended Practices of the American Oil Chemists' Society. Champaign, IL. AOCS Press.
- [7] Husaini, Z. 1999. Conventional methods for food analysis. 3rd Ed. Shiraz University Press.
- [8] Anonymous. 2006. Iranian National Standard. Standard No. 8920, Published by the Institute of Standards and Industrial Research of Iran. Properties of grape seed oil. First Edition.
- [9] Anonymous. 1999. Iranian National Standard. Standard No. 4935, Published by the Institute of Standards and Industrial Research of Iran. Edible rapeseed oil properties. First Edition.
- [10] Anonymous. 2001. Iranian National Standard. Standard No. 10501, Published by

۱-۴-۴- ترکیبات توکوفرولی

مقدادر توکوفرول‌های موجود در روغن هسته عنب در جدول ۴ آورده شده‌اند. در روغن هسته عنب هر چهار نوع توکوفرول آلفا، گاما و بتا و دلتا وجود دارد. همان‌طور که می‌دانیم آلفا توکوفرول بیشترین فعالیت حیاتی (ویتامین E) و گاما توکوفرول دارای اثر ضد اکسیدانی در روغن را دارا است [۴]. مقدادر کل توکوفرول‌ها در روغن هسته عنب ۹۵۵/۶۵ میلی‌گرم بر کیلوگرم روغن بود که در مقایسه با نمونه‌هایی از روغن هسته انگور (۴۱۰-۴۲۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم) و هسته انار (۴۲۵/۹۵ میلی‌گرم بر کیلوگرم) [۸ و ۲۱] بیشتر است (جدول ۴).

۳- نتیجه‌گیری کلی

ویژگی‌های مختلف روغن هسته عنب برای اولین بار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که از ۸۲/۰۳۸ درصد اسیدهای چرب غیر اشباع روغن هسته عنب، اسید اولنیک بیشترین میزان را به خود اختصاص می‌دهد و می‌توان آن را به عنوان یکی از روغن‌های گیاهی مناسب از نظر محتوای اسیدهای چرب تک غیر اشباعی به حساب آورد. روغن مورد مطالعه، با وجود مایع بودن پایداری خوبی از خود نشان داد ۹۴۷/۸۲ (میلی‌گرم بر کیلوگرم روغن) و ترکیبات استرولی (۲۳۳۰/۸ میلی‌گرم بر کیلوگرم روغن) بود.

۴- منابع

- [1] Zargari, A. 1992. Medicinal Plants. Tehran University Press. First Volume. 603-605.
- [2] Mirhedar, H. 2007. Plant Sciences. Iranian Islamic Culture Publications Office. Volume VI. 542.

- [18] Sahari M. A., Ataii D. and Hamed M. 2004. Characteristics of tea seed oil in comparison with sunflower and olive oils and its effect as a natural antioxidant. *Journal of the American Oil Chemists' Society*, 81: 585-588.
- [19] Yan-Fang Sun. Zong-Suo Liang. Chang-Juan Shan. Helmut Viernstein. and Frank Unger. 2011. Comprehensive evaluation of natural antioxidants and antioxidant potentials in *Ziziphus jujuba* Mill. Var. *spinosa* (Bunge) Hu ex H. F. Chou fruits based on geographical origin by TOPSIS method. *Food Chemistry*. 124(4): 1612-1619.
- [20] Metcalf, L.C. Schmitz, A.A and Pelka, J.R. 1996. Rapid preparation of methyl esters from lipid for gas chromatograph analysis. *Analytical Chemistry*. 38: 514-515.
- [21] Basiri, SH .Shahidi, F. Farhosh, R. and Kadkhodaei, R. 2013. Determining of physico-chemical and thermal properties of pomegranate seed oil in Sabzevar region. *Innovation in Food Science and Technology (Journal of Food Science and Technology)*. 4:97-107.
- [22] Lee, J. Durst, R.W. and Wrolstad, R.E. 2013. Determination of total monomeric anthocyanin pigment content of fruit juices, beverages, natural colorants, and wines by the pH differential method: collaborative study. AOAC 88: 1269-1278.
- [23] Schwartz, H. Ollilainen, V. Piironen, V and Lampi, A-M. 2008. Tocopherol, tocotrienol and plant sterol contents of vegetable oils industrial fats. *Journal of Food Compostition and Analysis*, 21(2): 152-161.
- the Institute of Standards and Industrial Research of Iran. Features. Edible oils and fats - cotton seed oil. First Edition.
- [11] AOCS. 2006. Official Methods and Recommended Practices of the American Oil Chemists' Society. Champaign, IL. AOCS Press.
- [12] AOAC. 1995. Official Methods of Analysis. Association of Official Analytical Chemists. 12th Ed. Washington, D.C.
- [13] AOCS. 1998. Official Methods Recommended Practices of the American Oil Chemists' Society. 5th Ed. Firestone, D. AOCS: Champaign, IL.
- [14] Parashar, A. Sinha, N. and Singh, P. 2010. Lipid contents and fatty acids composition of seed oil from twenty-five pomegranates varieties grown in India. *Advance Journal of Science and Technology*. 2(1):12-15.
- [15] Pawlowska, A.M. Camangi, F. Bader, A. and Braca, A. 2009. Flavonoids of *Zizyphus jujuba* L. & *Zizyphus spina-christi* Willd (Rhamnaceae) fruits. *Food Chemistry*. 112: 858-862.
- [16] Gul – Guerrero, J. L. 2004. Fatty acids and carotenes in (*Ziziphus jujuba*) plant food for human, *Journal of Agriculture Science and Technology*, 108: 421-428.
- [17] Hao, Zhang. Lu, Jiang. Shu, Ye. Yubin, Ye. and Fazheng, Ren. 2010. Systematic evaluation of antioxidant capacities of the ethanolic extract of different tissues of jujube (*Ziziphus jujuba* Mill) from China. *Food and Chemical Toxicology*. 48: 1461-1465.

Investigation of Physicochemical Properties of Jujube Seed Oil (*Ziziphus jujuba*)

Pooshaneh, E.¹, Sahari, M. A. ^{2*}, Shams Najafabadi, N.³

1. M.Sc. Student, Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, Azad University of Tabriz
2. Professor of Food Technology, Faculty of Agriculture Tarbiat Modares University
3. Ph.D. Student, Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, University of Tarbiat Modares

(Received: 2016/12/24 Accepted: 2017/04/30)

Jujube (*Ziziphus jujuba Mill*) sub family of Rammaseh is native of tropical and subtropical regions in Iran. Jujube seed is rich in oily compound which have nutritional value and it has many applications in food, medicine, and cosmetic industries. In this study, some physico-chemical properties of Jujube seed were investigated. At first stage, Jujube seeds were extracted by hexane solvent in ambient temperature by submerge. Then, the oil percent of Jujube seed was measured. After that, the physico-chemical properties of oil such as (color, refractive index, melting point, iodine, acidity, saponification, peroxide and thiobarbituric acid (TBA) values), fatty acid composition, nutritional indices (PUFA, SFA, ω_6 , ω_3), tocopherol and sterol contents were investigated. Results were as following: oil = 8/9%, index of red / yellow = 14/4705, refractive index = , melting point= 3/8 ± 0/42, iodine value = 3/87 ± 60/71 g I₂/ 100 g oil, acidity= 4/5855 ± 0/052 mg KOH/ g of oil, saponification value= 100/5385 ± 6/281 mg of KOH/ g of oil, peroxide value= trace, and thiobarbituric acid value= trace. Moreover, Jujube seed oil was consisted of 47/3% oleic and 32/6% linoleic acids, which good in nutritional and stability values. Nutritional indices of ω_6 , ω_3 , SFA and PUFA, respectively, were 34/757%, 2/834%, 13/446%, and 86/558%. The oil of Jujube seeds contained 935/55 ppm alpha-tocopherol, 7/82 ppm beta and gamma tocopherol, 4/45 ppm isomer of delta one and 2330/8 ppm of total sterol. In consequence, Jujube seed oil was diagnosed as a good stability and nutritional properties.

Keywords: Fatty acids, Jujube seed oil, Physicochemical properties, Sterols, Tocopherols.

* Corresponding Author E-Mail Address: sahari@modares.as.ir