



مجله علوم و صنایع غذایی ایران

سایت مجله: www.fsct.modares.ac.ir

مقاله علمی-پژوهشی

بررسی زنده ماننی لاکتوباسیلوس/اسیدوفیلوس ریزپوشانی شده در امولسیون دوگانه با صمغ فارسی در

طول انبارداری و شرایط شبیه سازدستگاه گوارش

خزر پورعلی رشتی نژاد^۱، محمد محسن زاده^{۲*}، محمد مالکی^۳

۱- کارشناس ارشد بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.

۲- استاد گروه بهداشت مواد غذایی و آبیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.

۳- پژوهشگر پسا دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.

چکیده

اطلاعات مقاله

تاریخ های مقاله :

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۱۰/۰۵

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۰۱/۱۶

کلمات کلیدی:

پروبیوتیک، ریز پوشانی،

زنده ماننی،

لاکتوباسیلوس/اسیدوفیلوس،

امولسیون.

ریز پوشانی روشی رایج برای بهبود قابلیت زنده ماننی باکتری های پروبیوتیک در برابر تنش های محیطی است. در این پژوهش با استفاده از امولسیون دوگانه با صمغ فارسی، پایداری امولسیون، خصوصیات فیزیکی و مورفولوژیکی، راندمان ریز پوشانی و زنده ماننی ریز پوشینه ها، در طول ذخیره سازی و محیط شبیه ساز دستگاه گوارش مورد بررسی قرار گرفت. اندازه ذرات، پتانسیل زتا و شاخص پراکندگی به ترتیب معادل 525 nm ، $44/68 \text{ mV}$ و $0/33$ بود. راندمان ریز پوشانی 88% و پایداری امولسیون بین 85% تا $95/43\%$ بود. ریزپوشانی لاکتوباسیلوس/اسیدوفیلوس در امولسیون دوگانه (W/O/W) با صمغ فارسی باعث بهبود زنده ماننی آن در شرایط نگهداری در دمای 4°C به مدت ۲۸ روز شد. جمعیت باکتریایی در تیمارهای ریز پوشانی نشده بعد از گذشت ۷ روز به صفر رسید درحالی که در تیمارهای ریز پوشانی شده فقط $0/58 \log$ کاهش داشت. در محیط شبیه ساز معده تعداد باکتری ها برای تیمار ریز پوشانی شده $1/97 \log$ و برای تیمار حاوی باکتری آزاد $3/9 \log$ کاهش یافت، و در محیط شبیه ساز روده نیز برای تیمار ریز پوشانی شده $0/45 \log$ و برای تیمار حاوی باکتری آزاد $1/3 \log$ کاهش یافت. نتایج نشان داد که استفاده از امولسیون دوگانه صمغ فارسی باعث بهبود زنده ماننی لاکتوباسیلوس/اسیدوفیلوس در شرایط نگهداری در دمای 4°C و محیط شبیه سازی شده دستگاه گوارش می شود.

DOI: 10.22034/FSCT.20.134.61
DOR: 20.1001.1.20088787.1402.20.134.5.9

* مسئول مکاتبات:

mohsenzadeh@um.ac.ir

۱- مقدمه

پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های زنده ای هستند که تأثیرات فیزیولوژیکی مثبتی بر فلور میکروبی روده ای میزبان دارند. در سال های اخیر، استفاده از فراورده های حاوی باکتری های پروبیوتیک توجه محققان را به خود جلب کرده است [۱]. طبق تعریف اکثر محققان محصولات پروبیوتیک باید حاوی CFU/g 10^6-10^7 باکتری بودند تا برای سلامتی مفید باشند. اثرات مفید این سویه ها بر سلامت انسان شامل بهبود سلامت و عملکرد روده، کاهش کلسترول خون، بهبود مکانیسم های دفاعی و غیره می باشد [۲]. پروبیوتیک ها که عمدتاً جزء باکتری های گرم مثبت می باشند طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها را شامل می شوند. باکتری های اسید لاکتیک و مخمرها نیز می توانند به عنوان پروبیوتیک در نظر گرفته شوند [۳]. فعالیت و زنده ماندن پروبیوتیک ها هنگام رسیدن به روده شرط اساسی برای بروز اثرات دارویی می باشد ولی عواملی مانند شرایط تولید، تغییرات pH، تنش های مکانیکی و شرایط اسیدی- صفراوی دستگاه گوارش باعث کاهش تعداد باکتری های پروبیوتیک می شود [۱]. ریز پوشانی از روش های مفید برای بهبود زنده مانی پروبیوتیک ها و کاهش اثرات تخریبی محیط می باشد [۴].

ریز پوشانی پروبیوتیک ها به منظور تثبیت و افزایش زنده مانی آن ها در محیط های نامطلوب انجام می شود [۱]. درواقع ریز پوشانی کردن یک فناوری محافظتی برای پوشش دادن ترکیبات حساس در داخل یک پلیمر خوراکی می باشد. پروبیوتیک ها به عنوان ماده اصلی درون پلیمر پوشش دهنده پوشش داده می شوند و از طریق کاهش واکنش پذیری آن با محیط خارج از تخریب، محافظت می شوند [۳]. مطالعات زیادی در خصوص استفاده از پلیمرها مانند آلژینات، کیتوزان، کربوکسی متیل سلولز و غیره به عنوان مواد پوششی وجود دارد [۳]. ساوامین و همکاران اثر پوشش چندلایه آلژینات را بر بقای لاکتوباسیلوس پلاتناروم محصور شده در محلول شبیه سازی شده معده و در حین نگهداری در آب انار در دمای 4°C مورد بررسی قرار دادند و نتایج، نشان دهنده بقای بالای باکتری های چند لایه بود [۵]. بر اساس مطالعات امین و همکاران پنیر چدار حاوی *B. longum* ریز پوشانی شده در آلژینات بقای خوبی را با کاهش $2 \log \text{CFU/mL}$ پس از ۲۱

روز در مقایسه با سلول های آزاد با کاهش $4 \log \text{CFU/mL}$ نشان داند [۶]. برای ریز پوشانی باکتری های پروبیوتیک از روش های مختلفی مانند خشک کردن پاششی، امولسیون و روش اکستروژن استفاده می شود [۱]. ارتاکی و همکاران زنده مانی باکتری لاکتوباسیلوس پاراکازئی ریز پوشانی شده به روش اکستروژن در طول فرآیند ساخت پنیر مورد بررسی قرار دادند و زنده مانی بالای باکتری را گزارش کردند [۷]. همایونی و همکاران دو نوع بستنی سین بیوتیک حاوی ۱٪ نشاسته مقاوم با باکتری لاکتوباسیلوس کازئی آزاد و ریز پوشانی شده به روش امولسیون تولید کردند و بقای باکتری را به مدت ۱۸۰ روز مورد بررسی قرار دادند و نتایج میزان بالای زنده مانی باکتری ریز پوشانی شده را نشان داد [۸].

صمغ فارسی یا زرد شفاف بوده و از درخت بادام کوهی (*Amygdalus scoparia* Spach.) به دست می آید. این صمغ در اثر تنش های دمایی، رطوبتی و گزش حشرات ترشح می شود [۹]. به دلیل ساختار ویژه ای که دارد کاربردهای گسترده ای در صنایع غذایی و دارویی پیدا کرده است. صمغ فارسی با رطوبت ۳ تا ۱۳ درصد در مقایسه با سایر صمغ ها از فعالیت سطحی و امولسیون کنندگی بسیار خوبی برخوردار است. صمغ فارسی یک هیدروکلوئید آنیونی با محتوای پروتئین کم و ظرفیت جذب آب بالا است [۱۰].

لاکتوباسیلوس ها باسیل های گرم مثبت منظم هستند که خاصیت تخمیر کنندگی دارند و پروبیوتیک می باشند. لاکتوباسیلوس /اسیدوفیلوس جزو این خانواده بوده و به راحتی در سطوح pH پایین (زیر ۵) رشد می کند و دمای رشد بهینه آن 37°C است. اثرات آنتاگونیستی (ماده ای که عملکرد فیزیولوژیکی ماده دیگر را مختل می کند یا برای آن مزاحمت ایجاد می کند) آن بر روی رشد استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیا کلی، سالمونلا تیفی موریوم و کلستریدیوم پرفرنجنس مورد مطالعه قرار گرفته است [۱۱]. امولسیون ها که در صنایع مختلف کاربرد دارند به صورت آب در روغن (W/O) یا روغن در آب (O/W) هستند که به صورت مکانیکی یا خود به خودی ایجاد می شوند. امولسیون های دوتایی قطرات یک مایع پراکنده در مایع دیگر هستند و به دلیل خصوصیات و ساختار مجزا، مورد توجه محققان قرار گرفته اند. دو نوع امولسیون چندگانه با ساختار آب در روغن

سوسپانسیون باکتریایی توسط بافر فسفات شست‌وشو شد. در نهایت سوسپانسیون سلولی با استفاده از سرم فیزیولوژی با غلظت ۴ مک فارلند تهیه گردید.

۲-۳- تهیه امولسیون دوگانه

امولسیون دوگانه آب در روغن در آب در دمای اتاق (25°C) با استفاده از روش دو مرحله ایی تهیه گردید. امولسیون اولیه آب در روغن به وسیله سوسپانسیون سلولی که حاوی CFU/ml 6×10^8 باکتری بود، تهیه شد و برای فاز روغن از روغن ذرت استفاده گردید. غلظت کلی امولسیفایرها در امولسیون اولیه ۸٪ وزنی بود (۱ قسمت DATEM و ۴ قسمت PGPR). نسبت حجمی فاز پراکنده در امولسیون اولیه ۰/۳ بود. تهیه امولسیون به وسیله هموژنایزر با دور 9000 rpm به مدت ۵ دقیقه انجام شد. سوسپانسیون سلولی توسط سرنگ استریل به صورت قطره قطره داخل روغن ریخته شد. در مرحله دوم ۳۰ میلی لیتر از امولسیون اولیه به ۷۰ میلی لیتر محلول صمغ ۸٪ اضافه شد و امولسیون دوگانه به وسیله هموژنایزر با دور 4500 rpm به مدت ۵ دقیقه یکنواخت گردید و در دمای 4°C نگهداری شد [۱۲].

۲-۴- شمارش سلول های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ریز پوشانی شده

امولسیون دوگانه حاوی سلول های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس انکپسوله شده در 15800 g به مدت ۱۰ دقیقه سانتیفریوژ شد. در نتیجه، امولسیون های دوگانه شکسته شده و سلول های به دام افتاده آزاد شدند. ۱ میلی لیتر از امولسیون شکسته شده را به ۹ میلی لیتر فسفات بافر ۰/۲ مولار اضافه کرده و از آن رقت های متوالی تهیه شد. از رقت های تهیه شده روی محیط MRS agar به صورت پورپلیت کشت داده و در دمای 37°C در شرایط بی هوازی به مدت ۷۲ ساعت گرمخانه گذاری گردید. بعد از این مدت پرگنه های رشد کرده شمارش شدند. شمارش باکتریایی در طی یک دوره ۲۸ روزه و به فواصل ۷ روزه تکرار گردید.

در آب (W1/O/W2) یا روغن در آب در روغن (O1/W/O2) وجود دارد، که در کاربردهای صنعتی مانند مواد غذایی، دارویی و آرایشی مورد استفاده قرار می گیرند. از آنجاکه در صنایع غذایی بسیاری از امولسیون های غذایی، فاز پیوسته آبی دارند و تثبیت کننده های آب گریز با درجه غذایی بیشتر در دسترس هستند، تهیه امولسیون های آب در روغن در آب (W1/O/W2) بیشتر معمول می باشد. روش معمول پذیرفته شده در تهیه امولسیون های دوتایی استفاده از امولسیفایر هایی با مقادیر مختلف تعادل هیدروفیل-لیپوفیل (HLB) می باشد تا بتوان امولسیون های دوگانه مطلوب بر اساس نوع ماده ای که قرار است ریزپوشانی شود تشکیل داد. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر ریز پوشانی با صمغ فارسی با استفاده از تکنیک امولسیون دوگانه بر روی زنده مانی باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس /اسیدوفیلوس در طول دوره نگهداری و بررسی محیط شبیه ساز گوارش و برخی خصوصیات امولسیون تولیدی است.

۲- مواد و روش ها

۲-۱- مواد

کشت خالص باکتری لاکتوباسیلوس /اسیدوفیلوس (LA-5) از شرکت کریستین هانسن، دانمارک تهیه شد و در شرایط استریل فعال گردید. امولسیفایر لیپوفیلیک PGPR^1 (پیشگامان شیمی، مشهد، ایران) و امولسیفایر هیدروفیلیک DATEM^2 (شرکت دانش بنیان پارس بهبود آسیا، مشهد، ایران)، صمغ فارسی (ریحان گام پارسیان، اصفهان، ایران) و سایر مواد مصرفی از شرکت مرک آلمان تهیه گردید.

۲-۲- آماده سازی سوسپانسیون باکتری

لاکتوباسیلوس /اسیدوفیلوس در ۲۰۰ سی سی محیط کشت MRS Broth^3 در دمای 37°C در شرایط بی هوازی تا رسیدن به فاز لگاریتمی به مدت ۲۴ ساعت انکوبه گردید. پس از اینکه باکتری ها به فاز لگاریتمی خود رسیدند، در دور 3400 g در دمای 10°C به مدت ۲ دقیقه سانتیفریوژ شدند و سپس

1. Polyglycerol polyricinoleate

2. Diacetyl tartaric acid ester of mono- and diglycerides

3. DE MAN, ROGOSA and SHARPE Broth

۲-۵- راندمان ریز پوشانی

راندمان ریز پوشانی توسط روش ژانگ و همکاران (۲۰۱۶) محاسبه شد که در آن تعداد باکتری‌ها در سوسپانسیون اولیه (N_0)، تعداد باکتری‌های ریز پوشانی شده در امولسیون دوگانه (N_1) و تعداد کل باکتری‌های امولسیون (N_2) طبق فرمول زیر محاسبه شد [۱].

$$\text{Encapsulation efficiency} = \frac{N_1 - N_2}{N_0}$$

۲-۶- پایداری امولسیون

پایداری امولسیون در طول دوره نگهداری در دمای اتاق پس از سانتریفیوژ با ۵۰۰۰ دور در دقیقه به مدت ۱۰ دقیقه در دمای اتاق با استفاده از معادله زیر محاسبه شد، که در آن V_t (میلی‌لیتر) حجم کل نمونه‌ها و V_s (میلی‌لیتر) حجم فاز زیرین بود [۳].

$$\text{Emulsion stability} = \frac{V_t - V_s}{V_t}$$

۲-۷- تعیین اندازه ذرات و شاخص پراکندگی

خواص فیزیکیوشیمیایی ریزپوشینه‌های تهیه‌شده ازجمله توزیع اندازه ذرات و شاخص پراکندگی (PDI) مورد ارزیابی قرار گرفت. برای میانگین اندازه قطرات و شاخص پراکندگی (PDI) ریزپوشینه‌ها از دستگاه پراکنش نور دینامیکی (DLS) استفاده شد. شدت نور در ۹۰ درجه تنظیم شد و نمونه به نسبت ۱:۱۰۰۰ با آب دی‌یونیزه رقیق شد و pH آنها تنظیم شد و سپس در محفظه-ی اندازه گیری DLS قرار گرفتند [۱۳].

۲-۸- پتانسیل زتا

به‌منظور تعیین پتانسیل زتای نمونه‌ها، از دستگاه زتا سایزر (CAD، شرکت Zeta compact - فرانسه) استفاده شد [۱۳].

۲-۹- مورفولوژی

شکل ذرات به‌وسیله‌ی میکروسکوپ نوری با بزرگ‌نمایی ۴۰ موردبررسی قرار گرفتند به این صورت که از امولسیون دوگانه یک اسمیر تهیه شد و زیر میکروسکوپ نوری مشاهده گردید [۱۴].

۲-۱۰- بررسی میزان زنده مانی لاکتوفیلوس

اسیدوفیلوس در شرایط شبیه‌ساز دستگاه گوارش

محیط شبیه ساز معده با حل کردن ۱/۱۲ گرم کلریدپتاسیم، ۲ گرم کلریدسدیم، ۰/۱۱ گرم کلریدکلسیم و ۰/۴ گرم فسفاتپتاسیم بازیکی در یک لیتر آب مقطر تهیه شد. ۱ گرم از سوسپانسیون باکتریایی با ۵۰ سی‌سی از محیط شبیه ساز معده مخلوط شد و ۲ ساعت در انکوباتور شیکر دار در دمای 37°C نگهداری شد و زنده‌مانی باکتری طی زمان‌های ۰، ۶۰ و ۱۲۰ دقیقه با کشت پور پلت در محیط MRS آگار موردبررسی قرار گرفت. برای محیط شبیه ساز روده ۱/۹۵ گرم در لیتر پانکراتین و ۱/۹۵ گرم در لیتر نمک صفراوی به ظرف حاوی محیط شبیه ساز معده اضافه شد و با سود ۱ نرمال pH آن به حدود ۷ رسانده شد و به مدت ۴ ساعت در انکوباتور شیکر دار در دمای 37°C نگهداری گردید. برای بررسی میزان زنده مانی باکتری کشت پور پلیت بر روی محیط MRS آگار در زمان‌های ۰، ۶۰، ۱۲۰، ۱۸۰ و ۲۴۰ دقیقه انجام شد [۱۵].

۲-۱۱- تجزیه و تحلیل آماری

در این پژوهش آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه (ANOVA) و مقایسه میانگین‌ها با استفاده از آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح احتمال ۹۵ درصد انجام پذیرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری SPSS نسخه ۲۰ (SPSS Inc. Chicago, USA) استفاده شد.

۳- نتایج و بحث

۳-۱- زنده‌مانی باکتری لاکتوباسیلوس

اسیدوفیلوس در طی دوره نگهداری

میزان زنده‌مانی لاکتوباسیلوس/اسیدوفیلوس در طول دوره نگهداری در دمای 4°C در شکل ۱ نشان داده شده است. تعداد لاکتوباسیلوس/اسیدوفیلوس برای همه‌ی تیمارها پس از نگهداری ۴ هفته ای به‌طور معنی‌دار ($P < 0.05$) کاهش یافت ولی زنده‌مانی باکتری‌های پروبیوتیک در طول دوره نگهداری به‌طور معنی‌داری ($P < 0.05$) افزایش یافت. لاکتوباسیلوس/اسیدوفیلوس آزاد در طول دوره نگهداری در یخچال بعد از گذشت ۷ روز تعداد آن‌ها به‌شدت کاهش پیدا کرد ولی لاکتوباسیلوس/اسیدوفیلوس ریز پوشانی شده در صمغ فارسی




Fig 1 Bacterial survival during storage at 4°C

۳-۳- پایداری امولسیون

اصطلاح "پایداری امولسیون" به توانایی مقاومت یک امولسیون نسبت به تغییر خصوصیات آن در طول زمان اشاره دارد. هرچه امولسیون پایدارتر باشد، تغییر خواص آن آهسته‌تر صورت می‌گیرد. یک امولسیون ممکن است به دلیل انواعی از فرایندهای فیزیکی و شیمیایی ناپایدار شود [۲۰]. نتایج مربوط به پایداری امولسیون در شکل ۲ آمده است و با توجه به نتایج در روز صفر میزان پایداری ۹۵/۴۳٪ و در روز ۲۸، ۸۵٪ بود که با یافته‌های پژوهش جیانگ و همکاران (۲۰۰۶) برای امولسیون آب در روغن در آب مطابقت دارد [۲۱]. افزایش غلظت صمغ باعث افزایش پایداری امولسیون گردید این افزایش احتمالاً به این دلیل است که در غلظت‌های بالاتر، مولکول‌های پلی ساکارید با تشکیل زنجیره‌های پیچیده پلیمری می‌توانند یک شبکه سه‌بعدی برای به دام انداختن قطرات روغن تشکیل دهند، و حرکت آن‌ها را مسدود کنند. رئیس و همکاران (۲۰۱۹) روغن ماهی و اسانس سیر را با کیتوزان و صمغ فارسی ریزپوشانی کردند و نتایج نشان داد که بیشترین پایداری در نسبت صمغ: کیتوزان ۱:۲ با پایداری ۱۰۰٪ و کمترین پایداری در نسبت صمغ: کیتوزان ۲:۱ با پایداری ۸۰٪ بود که با نتایج پژوهش ما هم راستا بود [۲۲].

بعد از گذشت ۲۸ روز فقط $\log 0.58$ کاهش داشت و تا روز ۲۸ نگهداری، تعداد آن‌ها مطابق با میزان موردنظر ($\log 6$) بود. اثر محافظت‌کنندگی صمغ فارسی باعث شد میزان لاکتوباسیلوس /سیدوفیلوس بالاتر از میزان موردنظر باشد. برینکس و همکاران (۲۰۱۱) و گندمی و همکاران (۲۰۱۶) به ترتیب زنده‌مانی سلول‌های آزاد و ریز پوشانی شده باکتری لاکتوباسیلوس پلاتاروم در آلزینات سدیم و پکتین و ریز پوشانی لاکتوباسیلوس /رامنوس با آلزینات و کیتوزان در آب سیب طی ۹۰ روز نگهداری در دمای ۴°C و ۲۵°C را بررسی کردند و نشان دادند که ریز پوشانی باکتری موجب افزایش زنده‌مانی می‌شود [۱۶ و ۱۷].

۳-۲- راندمان ریزپوشانی

راندمان ریزپوشانی یکی از فاکتورهای مهم در تعیین ترکیبات کپسوله شده می‌باشد. راندمان ریزپوشانی ۸۸٪ محاسبه شد، این راندمان بالای ریزپوشانی مربوط به روش ریزپوشانی یعنی امولسیون دوگانه می‌باشد. در امولسیون دوگانه باکتری‌ها ابتدا در داخل قطرات آب حفظ‌شده و سپس در قطرات روغن پراکنده می‌شوند و در انتها با صمغ فارسی پوشانده می‌شوند، که می‌تواند مانع خوبی برای باکتری‌ها در برابر تنش‌های خارجی باشد. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده می‌توان گفت که ریزپوشانی با روش امولسیون دوگانه با استفاده از صمغ فارسی در افزایش زنده‌مانی باکتری لاکتوباسیلوس /سیدوفیلوس مؤثر بوده است. سیلوا و همکاران (۲۰۱۸) در پژوهش خود با بهره‌گیری از ژلاتین و صمغ عربی در pH ۴ برای ریز پوشانی باکتری بیفیدوباکتریوم لاکتیس، بازدهی ریزپوشانی ۸۶٪ را به دست آوردند که با نتایج بدست آمده در این مطالعه همخوانی دارد و نشان‌دهنده اثر مثبت ریزپوشانی می‌باشد [۱۸]. ارات و همکاران (۲۰۱۵) ریزپوشانی امگا ۳ و باکتری‌های پروبیوتیک را با استفاده از پروتئین آب‌پنیر و صمغ عربی انجام دادند که بازده ریز پوشانی را ۸۴/۹۵٪ اعلام کردند که با نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد [۱۹]. ریز پوشانی به روش امولسیون دوگانه منجر به راندمان بالا در ریزپوشانی می‌شود و باعث حفاظت مؤثر از ماده ریزپوشانی شده در مقابل فشار مکانیکی و تغییرات دما می‌شود [۴].

در تهیه غذاهای حاوی باکتری های پروبیوتیک، ضروری است که این باکتری ها نه تنها در طول فرایند تولید و شرایط ذخیره سازی، بلکه در طول دستگاه گوارش، زنده مانی خود را حفظ کنند. باکتری ها باید در برابر قرار گرفتن در معرض اسیدیته معده و نمک صفراوی در روده کوچک مقاومت کنند. فلور روده در انسان رابطه ی نزدیکی با سلامت دارد و اطمینان از رسیدن تعداد کافی باکتری پروبیوتیک به روده ی کوچک و روده ی بزرگ موجب تامین فلور روده می شود. نتایج زنده مانی باکتری ها در محیط شبیه ساز دستگاه گوارش در شکل ۴ ارائه شده است. با توجه به نتایج ارائه شده اثر زمان بر تیمارهای مختلف معنی دار بود. ($P < 0.05$) تعداد باکتری های هر دو تیمار در محیط شبیه ساز گوارش در طول دوره نگهداری کاهش پیدا کردند. بر اساس شکل ۴ تعداد باکتری در تیمار ریز پوشانی شده و آزاد در محیط شبیه سازی شده معده به ترتیب از $\log 9.06 \pm 0.03$ و $\log 8.18 \pm 0.02$ به $\log 7.09 \pm 0.02$ و $\log 4.9 \pm 0.05$ و در شرایط شبیه سازی شده روده به ترتیب برای تیمار ریز پوشانی شده و آزاد از $\log 6.9 \pm 0.05$ و $\log 4.9 \pm 0.07$ و $\log 0.15 \pm 0.05$ و $\log 0.36 \pm 0.04$ کاهش یافت. نتایج نشان داد که باکتری لاکتوباسیلوس/اسیدوفیلوس ریز پوشانی شده در امولسیون دوگانه، در شرایط سخت دستگاه گوارش مقاومت می کند و بیشتر از حد استاندارد (10^6) به اتمام مورد نظر می رسند تا مزایای سلامتی بخش را برای میزبان فراهم کند. گاباسی و همکاران (۲۰۱۱) سه سویه ی (*L. plantarum* Lp299v, Lp159 and Lp800) را در دانه های آلژینات کلسیم و پروتئین آب پنیر محصور کردند و تحت محیط شبیه ساز دستگاه گوارش قرار دادند نتایج نشان داد که کپسولاسیون باعث حفظ باکتری در محیط شبیه ساز دستگاه گوارش شد که با نتایج ما همسو بود [۲۳]. برآش و همکاران (۲۰۱۱) گزارش دادند که تعداد لاکتوباسیلوس پلانتاروم کپسوله شده در دانه های آلژینات که در معرض محیط شبیه ساز معده قرار گرفتند، از $\log 8.9$ به $\log 5.2$ در طول دوره نگهداری رسید و نشان دادند که کپسوله کردن باکتری موجب حفظ باکتری در محیط شبیه ساز دستگاه گوارش می شود و مطابق با نتایج ما بود [۱۶]. رودریگز و همکاران (۲۰۱۴) زنده مانی باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم انکپسوله شده در امولسیون دوگانه در




Fig 2 Emulsion stability during storage period

۳-۴- مورفولوژی کپسول ها

از فاکتورهای مهم در ریزپوشانی باکتری ها مورفولوژی سطحی کپسول می باشد زیرا هرچه این سطح کروی تر و دارای شکاف کمتر باشد، بهتر می باشد. مورفولوژی کپسول ها در شکل ۳ نشان داده شده است. با توجه به شکل مشخص می شود که قطرات داخلی آب (W1) به طور متراکم گروه بندی شده و در داخل قطرات روغن (O) توزیع شده اند و در فاز آبی خارجی (W2) پراکنده شده اند، بنابراین ساختار مشخص امولسیون های دوگانه را نشان می دهند و با نتایج تحقیقات پائولا و همکاران مطابقت دارد [۴].




Fig 3 The image from the light microscope (400x) of the microcapsules

۳-۵- زنده مانی لاکتوباسیلوس/اسیدوفیلوس در

محیط شبیه ساز دستگاه گوارش

دهانی شن مانند، نباید استفاده شوند، و اندازه ۳۰ میکرومتر هیچ‌گونه احساس نامطلوبی را در دهان ایجاد نمی‌کند [۲۶]. مقدار PDI توزیع اندازه نانو ذرات کلئیدی را نشان می‌دهد و هرچه میزان PDI کمتر باشد نشان دهنده یکنواختی بیشتر ذرات می‌باشد و به‌طورمعمول، مقدار PDI کمتر از ۰/۳ یک سوسپانسیون کلئیدی نسبتاً همگن را نشان می‌دهد. در مطالعه حاضر میزان PDI ۰/۳۳ محاسبه شد [۲۷].

۳-۷- پتانسیل زتا

پتانسیل زتا پارامتری برای ثبات بالقوه سیستم کلئیدی می‌باشد. اگر همه ذرات داخل سوسپانسیون دارای بار منفی یا مثبت باشند، ذرات تمایل به دفع یکدیگر دارند و موجب عدم انباشتگی می‌شود. تمایل ذرات هم‌بار به دفع یکدیگر، رابطه مستقیمی با پتانسیل زتا دارد. به‌طورکلی مرز پایداری و ناپایداری سوسپانسیون را می‌توان برحسب پتانسیل زتا تعیین کرد [۲۸]. طبق نتایج مطالعات قبلی، پتانسیل زتا منفی بالاتر از ۳۰ میلی ولت برای جلوگیری از ادغام قطرات کافی است [۲۹]. مقدار پتانسیل زتای بدست آمده در این پژوهش (جدول ۱) ۴۴/۶۸- بود که نشان می‌دهد ریز پوشینه‌های تولیدی دارای تعادل کلئیدال مناسبی هستند. بار منفی کم امولسیون ممکن است مربوط به محتوای اسید اورونیک صمغ فارسی باشد. این پایداری در جلوگیری از انباشته شدن مهم می‌باشد. با توجه به نتایج تحقیقات عبدوالخالق و همکاران (۲۰۱۸) افزایش غلظت صمغ منجر به افزایش بار منفی سطح قطرات امولسیون و در نتیجه پتانسیل زتا با بار منفی می‌شود که سیستم امولسیون را پایدار می‌کنند و مطابق با نتایج ما بود [۳۰].

Table 1 Properties of emulsion

Treatment	Zeta potential	PDI	Particle size
Emulsion	-44.68	0.33±0.35	525nm

۴- نتیجه‌گیری

نتایج نشان داد که استفاده از صمغ فارسی برای تهیه امولسیون‌های w/o/w برای ریزپوشینه‌دار کردن باکتری‌های لاکتوباسیلوس/اسیدوفیلوس باعث بهبود زنده مانی آن شد. اندازه

طی ساخت پنیر اکساکا^۴ و همچنین در محیط شبیه‌ساز دستگاه گوارش بررسی کردند و نتایج نشان داد که سلول‌های لاکتوباسیلوس پلانتاروم انکپسوله شده در امولسیون‌های دوگانه، در برابر شرایط سخت گوارشی مقاومت می‌کنند که با نتایج ما هم‌راستا بود [۱۲].




Fig 4 Survival of bacteria under conditions simulating digestion during storage

۳-۶- اندازه ذرات و شاخص پراکندگی

جدول ۱ اندازه ذرات و شاخص پراکندگی (PDI) را نشان می‌دهد. تجزیه و تحلیل پراکندگی نور دینامیکی (DLS) نشان داد که ریز پوشینه‌های لاکتوباسیلوس/اسیدوفیلوس با صمغ فارسی دارای اندازه متوسط ۵۲۵ نانومتر بودند. میزان عملکرد ریز پوشینه‌ها (قابلیت محصور کردن، محافظت کردن و رساندن اجزا زیست فعال) مستقیماً تحت تأثیر ویژگی‌های فیزیکیو شیمیایی آن، مانند اندازه، مورفولوژی و بار الکتریکی سطحی می‌باشد [۱]. بنابراین اندازه ذرات پارامتر مهمی از نظر حفظ ساختار ریز پوشینه‌ها در طول عبور از دستگاه گوارش هستند. اندازه ذرات بزرگ با تولید منافذ بزرگ در هیدروژل‌ها بر زنده مانی باکتری‌های ریز پوشینه شده تأثیر می‌گذارد و به مولکول‌های کوچک مانند اکسیژن، اسیدها، نمک‌های صفراوی یا آنزیم‌های گوارشی اجازه می‌دهند تا به راحتی باکتری‌های محصور شده را منتشر و غیرفعال کنند [۲۴]. با این حال، دانه‌های بزرگ منجر به احساس دهانی نامناسب هنگام مصرف می‌شود [۲۵ و ۲۶]. کپسول‌هایی با اندازه بزرگ‌تر از ۱۰۰ میکرومتر به دلیل احساس

4. Oaxaca cheese

- during production and storage. Food Control. 2014 Mar 1;37:193-9
- [7] Ortakci FA, Broadbent JR, McManus WR, McMahon DJ. Survival of microencapsulated probiotic *Lactobacillus paracasei* LBC-1e during manufacture of Mozzarella cheese and simulated gastric digestion. Journal of dairy science. 2012 Nov 1;95(11):6274-81
- [8] Homayouni A, Azizi A, Ehsani MR, Yarmand MS, Razavi SH. Effect of microencapsulation and resistant starch on the probiotic survival and sensory properties of synbiotic ice cream. Food chemistry. 2008 Nov 1;111(1):50-5
- [9] Nami Y, Lornezhad G, Kiani A, Abdullah N, Haghshenas B. Alginate-Persian Gum-Prebiotics microencapsulation impacts on the survival rate of *Lactococcus lactis* ABRINW-N19 in orange juice. LWT. 2020 Apr 1;124:109190
- [10] Maleki M, Mohsenzadeh M. Optimization of a biodegradable packaging film based on carboxymethyl cellulose and Persian gum containing titanium dioxide nanoparticles and *Foeniculum vulgare* essential oil using response surface methodology. Journal of Food Processing and Preservation. 2022 Apr;46(4):e16424.
- [11] Sanders ME, Klaenhammer TR. Invited review: the scientific basis of *Lactobacillus acidophilus* NCFM functionality as a probiotic. Journal of dairy science. 2001 Feb 1;84(2):319-31
- [12] Rodríguez-Huezo ME, Estrada-Fernández AG, García-Almendárez BE, Ludeña-Urquiza F, Campos-Montiel RG, Pimentel-González DJ. Viability of *Lactobacillus plantarum* entrapped in double emulsion during Oaxaca cheese manufacture, melting and simulated intestinal conditions. LWT-Food Science and Technology. 2014 Dec 1;59(2):768-73..
- [13] Li K, Wang B, Wang W, Liu G, Ge W, Zhang M, Yue B, Kong M. Microencapsulation of *Lactobacillus casei* BNCC 134415 under lyophilization enhances cell viability during cold storage and pasteurization, and in simulated gastrointestinal fluids. Lwt. 2019 Dec 1;116:108521.
- [14] Flores-Andrade E, Pascual-Pineda LA, Alarcón-Elvira FG, Rascón-Díaz MP, ذرات، پتانیل زتا و شاخص پراکندگی نشان داد که امولسیون ازپایداری مناسبی برخوردار بود. باکتری های ریزپوشانی شده لاکتوباسیلوس/اسیدوفیلوس در مقایسه با باکتری های آزاد در محیط شبیه ساز دستگاه گوارش مقاومت خوبی از خود نشان دادند. نتایج نشان داد که استفاده از امولسیون دوگانه صمغ فارسی باعث بهبود زنده مانگی لاکتوباسیلوس/اسیدوفیلوس در برابر شرایط ذخیره سازی و محیط شبیه سازی شده دستگاه گوارش می شود.
- ### ۵- منابع
- [1] Zhang Y, Lin J, Zhong Q. S/O/W emulsions prepared with sugar beet pectin to enhance the viability of probiotic *Lactobacillus salivarius* NRRL B-30514. Food Hydrocolloids. 2016 Jan 1;52:804-10.
- [2] Flores-Andrade E, Pascual-Pineda LA, Alarcón-Elvira FG, Rascón-Díaz MP, Pimentel-González DJ, Beristain CI. Effect of vacuum on the impregnation of *Lactobacillus rhamnosus* microcapsules in apple slices using double emulsion. Journal of Food Engineering. 2017 Jun 1;202:18-24.
- [3] Eslami P, Davarpanah L, Vahabzadeh F. Encapsulating role of β -cyclodextrin in formation of pickering water-in-oil-in-water (W1/O/W2) double emulsions containing *Lactobacillus delbrueckii*. Food hydrocolloids. 2017 Mar 1;64:133-48..
- [4] de Almeida Paula D, Martins EM, de Almeida Costa N, de Oliveira PM, de Oliveira EB, Ramos AM. Use of gelatin and gum arabic for microencapsulation of probiotic cells from *Lactobacillus plantarum* by a dual process combining double emulsification followed by complex coacervation. International journal of biological macromolecules. 2019 Jul 15;133:722-31.
- [5] Nualkaekul S, Lenton D, Cook MT, Khutoryanskiy VV, Charalampopoulos D. Chitosan coated alginate beads for the survival of microencapsulated *Lactobacillus plantarum* in pomegranate juice. Carbohydrate polymers. 2012 Oct 15;90(3):1281-7.
- [6] Amine KM, Champagne CP, Raymond Y, St-Gelais D, Britten M, Fustier P, Salmieri S, Lacroix M. Survival of microencapsulated *Bifidobacterium longum* in Cheddar cheese

- [22] Raeisi S, Ojagh SM, Quek SY, Pourashouri P, Salaün F. Nano-encapsulation of fish oil and garlic essential oil by a novel composition of wall material: Persian gum-chitosan. *LWT*. 2019 Dec 1;116:108494.
- [23] Gbassi GK, Vandamme T, Yolou FS, Marchioni E. In vitro effects of pH, bile salts and enzymes on the release and viability of encapsulated *Lactobacillus plantarum* strains in a gastrointestinal tract model. *International Dairy Journal*. 2011 Feb 1;21(2):97-102.
- [24] Ding WK, Shah NP. Acid, bile, and heat tolerance of free and microencapsulated probiotic bacteria. *Journal of food science*. 2007 Nov;72(9):M446-50.
- [25] Hansen LT, Allan-Wojtas PM, Jin YL, Paulson AT. Survival of Ca-alginate microencapsulated *Bifidobacterium* spp. in milk and simulated gastrointestinal conditions. *Food microbiology*. 2002 Feb 1;19(1):35-45.
- [26] Çabuk B, Harsa ŞT. Protection of *Lactobacillus acidophilus* NRRL-B 4495 under in vitro gastrointestinal conditions with whey protein/pullulan microcapsules. *Journal of bioscience and bioengineering*. 2015 Dec 1;120(6):650-6.
- [27] Su J, Wang X, Li W, Chen L, Zeng X, Huang Q, Hu B. Enhancing the viability of *Lactobacillus plantarum* as probiotics through encapsulation with high internal phase emulsions stabilized with whey protein isolate microgels. *Journal of agricultural and food chemistry*. 2018 Oct 31;66(46):12335-43.
- [28] Shi L, Li Z, Yu L, Jia H, Zheng L. Effects of surfactants and lipids on the preparation of solid lipid nanoparticles using double emulsion method. *Journal of dispersion science and technology*. 2011 Jan 20;32(2):254-9.
- [29] Wiącek A, Chibowski E. Zeta potential, effective diameter and multimodal size distribution in oil/water emulsion. *Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects*. 1999 Dec 1;159(2-3):253-61.
- [30] Golkar A, Taghavi SM, Aghili Dehnavi F. The emulsifying properties of Persian gum (*Amygdalus scoparia* Spach) as compared with gum Arabic. *International Journal of Food Properties*. 2018 Jan 1;21(1):416-36.
- Pimentel-González DJ, Beristain CI. Effect of vacuum on the impregnation of *Lactobacillus rhamnosus* microcapsules in apple slices using double emulsion. *Journal of Food Engineering*. 2017 Jun 1;202:18-24..
- [15] Gebara C, et al., Viability *Lactobacillus acidophilus* La5 in pectin-whey protein microparticles during exposure to simulated gastrointestinal condition food research international, 2013. 51: p. 8-872.
- [16] Brinques GB, Ayub MA. Effect of microencapsulation on survival of *Lactobacillus plantarum* in simulated gastrointestinal conditions, refrigeration, and yogurt. *Journal of food engineering*. 2011 Mar 1;103(2):123-8.
- [17] Gandomi H, Abbaszadeh S, Misaghi A, Bokaie S, Noori N. Effect of chitosan-alginate encapsulation with inulin on survival of *Lactobacillus rhamnosus* GG during apple juice storage and under simulated gastrointestinal conditions. *LWT-Food Science and Technology*. 2016 Jun 1;69:365-71.
- [18] da Silva TM, Lopes EJ, Codevilla CF, Cichoski AJ, de Moraes Flores ÉM, Motta MH, da Silva CD, Grosso CR, de Menezes CR. Development and characterization of microcapsules containing *Bifidobacterium* Bb-12 produced by complex coacervation followed by freeze drying. *LWT*. 2018 Apr 1;90:412-7.
- [19] Eratte D, McKnight S, Gengenbach TR, Dowling K, Barrow CJ, Adhikari BP. Co-encapsulation and characterisation of omega-3 fatty acids and probiotic bacteria in whey protein isolate-gum Arabic complex coacervates. *Journal of functional foods*. 2015 Dec 1;19:882-92.
- [20] McClements DJ. Food emulsions: principles, practices, and techniques. CRC press; 2004 Dec 16.
- [21] Su J, Flanagan J, Hemar Y, Singh H. Synergistic effects of polyglycerol ester of polyricinoleic acid and sodium caseinate on the stabilisation of water-oil-water emulsions. *Food Hydrocolloids*. 2006 Mar 1;20(2-3):261-8.



Investigating the survival of microencapsulated *Lactobacillus acidophilus* in double emulsion with Persian gum during storage and digestive simulating conditions

Pourali Rashti-Nejad, Kh. ¹, Mohsenzadeh, M. ^{2*}, Maleki, M. ³

1. Department of Food Hygiene and Aquaculture, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad (FUM), Mashhad, Iran.
2. Department of Food Hygiene and Aquaculture, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad (FUM), Mashhad, Iran.
3. Department of Food Hygiene and Aquaculture, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad (FUM), Mashhad, Iran.

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Article History: Received 2022/ 12/ 26 Accepted 2023/ 04/ 05 Keywords: Probiotic, Microencapsulation, Survival, <i>Lactobacillus acidophilus</i>, Emulsion. DOI: 10.22034/FSCT.20.134.61 DOR: 20.1001.1.20088787.1402.20.134.5.9 *Corresponding Author E-Mail: mohsenzadeh@um.ac.ir	Microencapsulation is a common method to improve the viability of probiotic bacteria against environmental stresses. In this research, by using double emulsion with Persian gum, emulsion stability, physicochemical properties, microcoating efficiency and microcoating viability were investigated during storage and in a simulated gastrointestinal conditions of the digestive system. Encapsulation of <i>Lactobacillus acidophilus</i> in double emulsion (W/O/W) with Persian gum improved the survival under storage conditions at 4 °C for 28 days, and encapsulation treatment only 0.58 log decreased and the treatment without capsules reached zero after 7 days. The microcoating efficiency was 88% and the emulsion stability was between 85% and 95.43%. The optical microscope image showed a distinct double emulsion. In the simulating conditions of the stomach, the number of bacteria for encapsulation treatment decreased by 1.97 log and the treatment without capsules 3.9 log, and in the simulating conditions of the intestine, for encapsulation treatment it decreased by 0.45 log and for the treatment without capsules 1.3 log decreased. The particle size, zeta potential and dispersion index was 525 nm, -44.68 mv and 0.33 respectively. The results showed that the use of Persian gum double emulsion improves the survival of <i>Lactobacillus acidophilus</i> against storage conditions and the simulated environment of the digestive system.