

# تأثیر هیدروکلوبیدهای کتیرا و ثعلب بر خواص رئولوژیک خمیر و کیفیت نان برابری

زهرا قرایی<sup>۱</sup>، محمد حسین عزیزی<sup>۲\*</sup>، محسن برزگر<sup>۲</sup>، رویا آقا قلی زاده<sup>۳</sup>

۱- دانشجوی دکتری علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

۲- دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

۳- محقق پژوهشکده غلات

(تاریخ دریافت: ۹۲/۱۰/۲۳ تاریخ پذیرش: ۹۳/۴/۸)

## چکیده

در این تحقیق تأثیر هیدروکلوبیدهای کتیرا و ثعلب، بر خواص رئولوژیک خمیر و کیفیت نان بربری حاصل بررسی گردید. خمیرها از آرد ستاره، با دو صمغ کتیرا و ثعلب در دو سطح ۰/۰۵٪ و ۱٪ تهیه شدند و آزمون های فارینوگراف و اکستنسوگراف روی خمیرها انجام شد. بعد از پخت نان و انجام ارزیابی حسی، نان ها برای انجام ارزیابی بیاتی در یک دوره ۱ تا ۵ روزه، بسته بندی شده و در دمای اتاق نگهداری شدند. در نتایج فارینوگراف، تفاوت معنی داری در جذب آب نمونه کنترل (بدون صمغ) و سایر نمونه ها مشاهده شد ( $P < 0/05$ ). زمان گسترش خمیر نمونه حاوی ۱٪ کتیرا به میزان قابل ملاحظه ای نسبت به نمونه کنترل بیشتر بود. زمان مقاومت خمیر نمونه های حاوی کتیرا نیز نسبت به نمونه کنترل، افزایش معنی داری داشت. نتایج آزمون اکستنسوگراف در فاکتورهای تغییرات انرژی، مقاومت به کشش و ضربه کشش، تفاوت معنی داری را بین نمونه کنترل و نمونه های حاوی کتیرا نشان داد. نتایج ارزشیابی کیفی نیز نشان داد، که با افزودن کتیرا ویژگی های کیفی به میزان قابل ملاحظه تحت تأثیر قرار نگرفت. تنها از نظر بو و طعم، نمونه های حاوی ثعلب امتیاز کمتری نسبت به کنترل داشتند. نتایج ارزشیابی بیاتی نیز نشان داد، ثعلب در مقایسه با کتیرا در تعویق بیاتی موثرتر است، اما این تغییر نسبت به نمونه کنترل قابل ملاحظه نمی باشد. در مجموع با توجه به نتایج حاصل، استفاده از کتیرا جهت بهبود ویژگی های رئولوژیک خمیر پیشنهاد می شود.

**کلید واژگان:** اکستنسوگراف، ثعلب، فارینوگراف، کتیرا، نان بربری

\* مسئول مکاتبات: Azizit\_m@modares.ac.ir

(بدون شاخه) و دیگری نوع پنجهای (با شاخه). ثعلب پنجهای نسبت به ثعلب گرد، از نظر محتوای نشاسته پایین تر ولی از نظر مقدار گلوكومانان بالاتر است. بنابراین نوع پنجهای منع با ارزش گلوكومانان است [۱۲]. گلوكومانانها، توجه قابل ملاحظه‌ای را به عنوان مواد ایجاد کننده ژل، قوام دهنده، تشکیل دهنده فیلم و امولسیفایر در زمینه غذا دریافت کرده‌اند [۱۱].

کتیرا عصاره خشک شده به دست آمده از ساقه نوعی گون از جنس (*Astragalus*) بوده که این گیاه به طور طبیعی در مناطقی از ایران، ترکیه و بعضی کشورهای دیگر رشد می‌نماید. این صمغ توسط سازمان غذا و داروی امریکا (FDA) به عنوان یک ماده غذایی سالم (GRAS) طبقه بندی [۱۳] و به عنوان پایدار کننده، امولسیون کننده و قوام دهنده در صنایع غذایی، داروسازی و آرایشی - بهداشتی کاربرد دارد [۱۴]. تحقیق حاضر نیز، تاثیر هیدروکلوبیدهای کتیرا و ثعلب را بر ویژگی‌های رئولوژیک خمیر و کیفیت نان حاصل مورد بررسی قرار می‌دهد.

## ۲- مواد و روش‌ها

### ۱-۲- مواد

آرد گندم از نانوایی محلی، نمک یددار و مخمر خشک سوزنی از بازار تهران تهیه شدند. کتیرای نواری و ثعلب پنجهای از بازار تهران خریداری شده، بعد از آسیاب کردن و الک کردن (مش ۷۰) مورد استفاده قرار گرفته‌اند. درصد ترکیبات اصلی تشکیل دهنده ثعلب پنجهای به این شرح است: رطوبت: ۱۵/۷۹٪، گلوكومانان: ۴۷/۵۵٪، نشاسته: ۲/۳۰٪، چربی: ۲۰/۸٪، پروتئین: ۳/۴۹٪ و خاکستر: ۷/۱۳٪ [۱۲]. کتیرا از لحاظ شیمیایی از دو بخش محلول (تراگاکانتین) و نامحلول (باسورین) تشکیل شده است. بخش محلول حدود ۴۰-۳۰ درصد وزن کتیرا را تشکیل می‌دهد و شاخه اصلی آن از تکرار واحدهای D-گالاكتوز تشکیل شده و بخش نامحلول که قسمت عمده وزن کتیرا را به خود اختصاص می‌دهد، از واحدهای D-گالاكتورونیک اسید تشکیل شده است [۱۴].

### ۱- مقدمه

نان یکی از مهم‌ترین و معروف‌ترین محصولات غذایی در بسیاری از کشورهای جهان، به دلیل ویژگی‌های مهم تغذیه‌ای، حسی و بافتی آن است [۱]. به منظور افزایش مدت زمان ماندگاری این محصول، فرمولاسیون‌ها و شرایط نگهداری متفاوت می‌تواند کاربرد داشته باشد [۲]. هیدروکلوبیدها از جمله افزودنی‌هایی هستند که به طور گسترده در محصولات غذایی، به منظور اصلاح بافت، بهبود نگهداری رطوبت، کنترل تحرک آب و حفظ کیفیت کلی محصول در طول نگهداری استفاده می-شوند [۳]. در صنعت نان هیدروکلوبیدها اهمیت زیادی به عنوان بهبود دهنده دارند، که می‌توانند تغییرات ساختمانی در ترکیبات اصلی سامانه‌های آرد گندم و در کنار آن در مراحل پخت نان و نگهداری آن ایجاد کنند [۴]. برای مثال متیل سلولز و صمغ عربی به عنوان جایگزین گلوتن در فرمولاسیون‌های نان‌های بدون گلوتن استفاده شده‌اند [۵]. کربوکسی متیل سلولز و صمغ گوار در نان چاودار، به منظور بهبود کیفیت نان استفاده شدند [۶]. علاوه بر این بهبود در پایداری خمیر گندم در طی تخمیر، با افزودن هیدروکلوبیدهایی همچون سدیم آژینات، کاراگینان، زانتان و هیدروکسی پروپیل متیل سلولز بدست آمد [۷]. مطالعات دیگری نیز استفاده از هیدروکلوبیدها را به عنوان ترکیبات ضد بیاتی نشان دادند. شیرالدی و همکاران (۱۹۹۶)، گزارش کردند که صمغ لوبيای لوکاست و صمغ گوار باعث بهبود کیفیت نان می-شود، اما یک تاثیر مشخص ضد بیاتی یافت نشد [۸]. مطالعه مشابهی نیز نشان داد، صمغ لوبيای لوکاست، زانتان و آژینات اثر نرم کنندگی بر بافت نان می‌گذارند، که این امر به دلیل ظرفیت بالای نگهداری آب، در مورد صمغ لوبيای لوکاست و جلوگیری از برهم کنش گلوتن - نشاسته در مورد زانتان و آژینات است [۹].

از غله‌های زیرزمینی ثعلب آردی به دست می‌آید که در تهیه بستنی، شیرینی سازی و تولید نوشیدنی ثعلب [۱۰]، نوعی دسر ترکی و همچنین در داروسازی و طب سنتی کاربرد دارد. پودر ثعلب علاوه بر ویژگی پایدار کنندگی، در ایجاد عطر و طعم در محصول نهایی نیز نقش مهمی ایفا می‌کند [۱۱]. گونه‌های ثعلب که در ایران رشد می‌کنند به دو شکل هستند، یکی نوع گرد

## ۲-۲- روش‌ها

### ۲-۲-۱- آزمون‌های شیمیایی آرد

میزان رطوبت، خاکستر، پروتئین، فیبر خام، چربی و گلوتون مرتبط آرد، به ترتیب با استفاده از روش‌های مصوب AACC(2000) به شماره ۱۶-۴۴، ۰۸-۱۲، ۰۱-۴۶، ۱۷-۳۲، ۱۱-۳۸ تعیین شد. مقدار عدد رسوبی یا عدد زلی و عدد فالینگ با استفاده از روش‌های AACC(2000) به شماره ۱۱-۵۶ و ۸۱-۵۶ انجام شد [۱۵].

### ۲-۲-۲- اندازه‌گیری اندازه ذرات آرد

برای اندازه‌گیری اندازه ذرات آرد، از الکهایی با اندازه سوراخ ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۸۰، ۴۷۵ میکرون که به ترتیب از مش بزرگ به کوچک روی هم قرار گرفته‌اند، استفاده گردید. جهت انجام آزمون مقدار ۱۰۰ گرم آرد به مدت ۵ دقیقه به وسیله الک لرزانده ساخت کارخانه سایمون انگلستان تکان داده شد و سپس مقادیر آرد باقیمانده روی هریک از الک‌ها وزن شده و به صورت درصد گزارش گردید [۱۶].

### ۲-۲-۳- آزمون‌های رئولوژیک خمیر

این آزمایش‌ها ویژگی‌ها و پایداری خمیر را در برابر عمل آمیختن و تنفس کششی نشان می‌دهند و ویژگی‌های تکنولوژیک خمیر را روشن می‌سازند. آزمون‌های فارینوگراف و اکستنسوگراف نمونه‌ها (کترل و نمونه‌های حاوی دو سطح ۰/۵ و ۱٪ کتیرا و شلب)، به ترتیب با استفاده از روش‌های مصوب AACC(2000) به شماره ۲۱-۵۴ و ۱۰-۵۴ تعیین گردید [۱۵].

### ۲-۲-۴- ارزیابی حسی ویژگی‌های کیفی نان

ارزیابی نان‌های سنتی ایران از طریق بررسی نظرات اخذ شده از هفت نفر داور آموزش دیده جهت تعیین معیارهای کیفی و ضرایب انجام گردید و اهمیت هر یک از این معیارها به توجه به ویژگی نان‌ها طبقه‌بندی شد [۱۷].

جدول ۱ نتایج آزمون‌های شیمیایی آرد

درصد رطوبت (در ماده خشک)	درصد خاکستر (در ماده خشک)	درصد پروتئین (در ماده خشک)	درصد فیبر خام (در ماده خشک)	درصد چربی (در ماده خشک)	درصد گلوتون (در ماده خشک)	عدد رسوبی (در ماده خشک) (میلی لیتر)	عدد فالینگ (ثانیه)
۰/۷۵	۱۲/۸	۰/۶۰	۲/۳۴	۲۰/۲	۲۲/۵	۵۳۰	۱۱/۳

مقایسه با نمونه کنترل شده‌اند. نمونه حاوی ۱٪ کتیرا بیشترین افزایش را در جذب آب ایجاد کرده است و کمترین میزان جذب آب مربوط به نمونه کنترل است (P<0.05). این امر به دلیل رقابت هیدروکلوبیدها و گلوتن برای اتصال به آب است و قابلیت اتصال به آب در هیدروکلوبیدها، نسبت به گلوتن بیشتر است [23]. تیمار ۱٪ کتیرا به شکل معنی داری زمان گسترش خمیر را نسبت به نمونه کنترل افزایش داده است. این نتایج در توافق با یافته‌های Guarda و همکاران (۲۰۰۴)، برای هیدروکلوبیدهای (آژینات، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، زانتان و کاراگینان)، است. نتایج بررسی‌های این محققین نشان داد، با افزودن هیدروکلوبیدهای ذکر شده، زمان توسعه خمیر به میزان کمی افزایش یافت و آژینات بیشترین افزایش را داشت [24]. تیمارهای حاوی ۱٪ و ۰.۵٪ کتیرا منجر به افزایش معنی دار زمان مقاومت خمیر شدند. علاوه بر این، ۱٪ کتیرا درجه سست شدن خمیر را نیز کاهش داد و بیشترین عدد کیفیت فارینوگراف نیز، مربوط به ۱٪ کتیرا می‌باشد. در مطالعه انجام شده توسط Rosell و همکاران (۲۰۰۷) تأثیر هیدروکلوبیدهای هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، پکتین، گوار و زانتان بر ویژگی‌های رئولوژیکی آرد گندم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز بیشترین تاثیرات مفید را بر رفتار خمیر می‌گذارد. افزودن این هیدروکلوبید به آرد، باعث افزایش جذب آب، زمان توسعه خمیر و افزایش پایداری حین مخلوط کردن شد و علاوه بر این درجه سست شدن خمیر را نیز کاهش داد [25].

### ۲-۳- نتایج اندازه‌گیری ذرات آرد

نتایج مربوط به اندازه‌گیری ذرات نمونه آرد، در جدول شماره ۲ آمده است. همان طور که ملاحظه می‌شود، قسمت اعظم ذرات زیر الک ۱۰۶ میکرون قرار گرفته‌اند و این نشان دهنده این است که مقدار زیادی از ذرات درشت درشت سبوس و پوسته از آرد جدا شده‌اند [22]. بر اساس استاندارد آرد ستاره، میزان آرد باقیمانده روی الک ۱۸۰ حداقل ۲۰، روی الک ۱۲۵ حداقل ۳۲/۵ و زیر الک ۱۰۶ حداقل ۶۰ باید باشد. همان طور که مشاهده می‌شود اعداد بدست آمده مطابق استاندارد است.

جدول ۲ نتایج اندازه‌گیری ذرات آرد

اندازه منفذ الک (میکرون)	آرد باقیمانده روی الک (درصد)
۰/۳	۴۷۵
۰/۷	۱۸۰
۷/۱	۱۲۵
۵/۵	۱۰۶
۸۷/۴	زیر الک ۱۰۶

### ۳-۳- نتایج آزمون فارینوگراف

نتایج فارینوگراف برای نمونه شاهد و نمونه‌های حاوی هیدروکلوبیدهای کتیرا و ثعلب در دو سطح (۰/۱٪ و ۰/۵٪)، در جدول شماره ۳ آورده شده است. همان گونه که مشاهده می‌شود، تمام تیمارهای موجود، منجر به افزایش معنی دار جذب آب در

جدول ۳ تأثیر تیمارها بر خصوصیات فارینوگراف

تیمار	میزان جذب آب (%)	زمان گسترش خمیر (Min)	زمان مقاومت خمیر (Min)	درجه سست شدن بعد از ۱۰ دقیقه (FU)	عدد کیفیت فارینوگراف
کنترل	۵۳/۸۰ <sup>d</sup>	۱/۹۰ <sup>b</sup>	۵/۳۵ <sup>b</sup>	۷۱/۵۰ <sup>a</sup>	۵۹/۵۰ <sup>b</sup>
۱٪/کتیرا	۵۶/۳۰ <sup>b</sup>	۱/۰۵ <sup>b</sup>	۵/۸۵ <sup>a</sup>	۶۵/۰ <sup>ab</sup>	۶۶/۵۰ <sup>ab</sup>
۱٪ کتیرا	۵۸/۲۰ <sup>a</sup>	۵/۴۵ <sup>a</sup>	۶/۰۵ <sup>a</sup>	۵۴/۵۰ <sup>b</sup>	۷۵/۰ <sup>a</sup>
۰/۵٪/ثعلب	۵۴/۸۰ <sup>c</sup>	۱/۸۵ <sup>b</sup>	۵/۷۰ <sup>ab</sup>	۶۲/۵۰ <sup>ab</sup>	۶۴/۰ <sup>b</sup>
۱٪/ثعلب	۵۴/۶۰ <sup>c</sup>	۱/۴۵ <sup>b</sup>	۵/۳۵ <sup>b</sup>	۶۸/۰۰ <sup>a</sup>	۵۸/۵۰ <sup>b</sup>

حرف مختلف نشان دهنده اختلاف معنی دار در سطح ۹۵ درصد است (P<0.05).

به فرمولاسیون خمیرنان مقاومت به کشش ، انرژی و ضربی کشش را افزایش می دهد [۲۳].

### ۵-۳- تاثیر تیمارها بر ویژگی های کیفی نان بربری

نتایج بررسی ویژگی های کیفی نمونه های حاوی ۱٪ کثیرا، ۱٪ ثعلب و نمونه بدون صمغ، در جدول شماره ۵ آمده است. همان گونه که مشاهده می شود، در مورد شکل و خصوصیات سطح زیرین نان تفاوت معنی دار نمی باشد ( $P>0/05$ ). امتیاز سفتی و نرمی بافت و قابلیت جویدن نان ، گرچه توسط ۱٪ کثیرا افزایش یافته است، اما این افزایش امتیاز، معنی دار نیست ( $P<0/01$ ). در ارتباط با بو و طعم نیز ، بین ۱٪ کثیرا و نمونه کترول تفاوت نداریم، ولی ۱٪ ثعلب امتیاز کمتری نسبت به دو نمونه دیگر دارد. نتایج در توافق با نتایج بدست آمده توسط Guarda و همکاران (۲۰۰۴) است. در این بررسی هیدروکلوئیدهای هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، زانتان، کاراگینان و سدیم آژینات، به آرد اضافه شدند و نان حاصله مورد ارزشیابی حسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، هیدروکلوئیدها ویژگی های حسی را تحت تاثیر قرار ندادند، تنها زانتان امتیاز کمتری نسبت به نمونه بدون صمغ داشت [۲۴].

### ۶-۳- تاثیر تیمارها بر بیاتی نان

نتایج مقایسه بیاتی نمونه های حاوی صمغ و نمونه کترول در جدول شماره ۶ نشان داده شده است. با توجه به نتایج به نظر می رسد، ثعلب در مقایسه با کثیرا، نقش موثرتری در تعویق بیاتی داشته باشد، اما این افزایش امتیاز نسبت به نمونه کترول، معنی دار نیست ( $P<0/01$ ).

### ۳-۴- نتایج آزمون اکستنسو گراف

تأثیر هیدروکلوئیدها بر مشخصات اکستنسو گراف نمونه های آرد بعد از گذشت ۱۳۵ دقیقه استراحت، در جدول شماره ۴ نشان داده شده است. همان گونه که در جدول مشاهده می شود، تیمارهای حاوی ۰/۰۵ و ۱٪ کثیرا، منجر به افزایش انرژی نسبت به کترول شده اند. مقاومت در برابر کشش، در اثر افزودن ۰/۰۵ و ۱٪ کثیرا) و ۱٪ ثعلب افزایش یافت. ضربی کشش نیز، توسط تمام هیدروکلوئیدها افزایش یافت، که بیشترین افزایش مربوط به ۱٪ کثیرا بود. در مطالعه انجام شده توسط Shalini و همکاران (۲۰۰۷)، تاثیر هیدروکلوئیدهای گوار، کربوکسی متیل سلولز، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز و کاپاکاراگینان بر شاخص های رئولوژیکی آرد مورد استفاده در نان چاپاتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، افزودن هیدروکلوئیدهای ذکر شده، باعث بهبود مقاومت در برابر کشش شد [۲۶]. در کل دو عامل، ویژگی کششی پلیمرها را تحت تاثیر قرار می دهد: باندهای کووالانس و لغزش زنجیرهای درگیر شده در پلیمر. بنا بر این هر ماده ای که درجه لغزندگی را اصلاح کند، به طور مستقیم ویژگی های کششی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. تعداد کمتر باندهای کووالانس لغزش زنجیرهها را حین اعمال استرس راحت تر کرده و باعث کاهش انرژی و ضربی کشش می شود [۲۷]. پدیده ذکر شده با افزودن صمغها به دلیل واکنش متقابل زنجیره مولکولهای صمغ با زنجیره ملکولهای گلوتن به تعویق می افتد و منجر به افزایش انرژی و ضربی کشش می شود [۲۸]. در تحقیق حاضر نیز این امر با افزودن صمغها خصوصاً کثیرا مشاهده شد. مطالعات Sim و همکاران (۲۰۱۱) نیز نشان داد، افزودن آژینات

جدول ۴ تأثیر تیمارها بر خصوصیات اکستنسوگراف در زمان ۱۳۵ دقیقه

تیمار	انرژی (cm <sup>2</sup> )	مقاومت به کشش (BU)	ضریب کشش (BU/mm)
کنترل	۱۰/۰۰ <sup>c</sup>	۶۴/۵۰ <sup>c</sup>	۰/۷۰ <sup>d</sup>
۱٪ کتیرا	۱۵/۰۰ <sup>ab</sup>	۹۵/۵۰ <sup>ab</sup>	۱/۰۰ <sup>b</sup>
۱٪ کتیرا	۱۸/۰۰ <sup>a</sup>	۱۱۵/۰۰ <sup>a</sup>	۱/۴۰ <sup>a</sup>
۰٪ ثعلب	۱۳/۰۰ <sup>bc</sup>	۸۰/۰۰ <sup>bc</sup>	۰/۸۵ <sup>c</sup>
۱٪ ثعلب	۱۴/۰۰ <sup>abc</sup>	۹۱/۰۰ <sup>b</sup>	۰/۹۵ <sup>bc</sup>

حروف مختلف نشان دهنده اختلاف معنی دار در سطح ۹۹ درصد است (P<0.01).

جدول ۵ نتایج ارزشیابی ویژگی‌های کیفی

تیمار	شكل	خصوصیات سطح فوچانی	خصوصیات سطح زیرین	سفتی بافت	قابلیت جویدن بو و طعم مزه
کنترل	۹/۶۱	۹/۴۲ <sup>a</sup>	۵/۰۰	۲۲/۶۲ <sup>a</sup>	۲۳/۳۳ <sup>a</sup>
۱٪ کتیرا	۹/۶۱	۹/۹۰ <sup>a</sup>	۴/۹۰	۲۳/۱۰ <sup>a</sup>	۲۳/۸۱ <sup>a</sup>
۱٪ ثعلب	۹/۷۱	۹/۷۱ <sup>a</sup>	۵/۰۰	۲۲/۱۴ <sup>a</sup>	۲۲/۱۴ <sup>a</sup>

حروف مختلف نشان دهنده اختلاف معنی دار در سطح ۹۹ درصد است (P<0.01).

متضاد ایجاد می‌شود، یکی افزایش در سفتی در نتیجه کاهش تورم گرانولهای نشاسته و کاهش تورم آمیلوژ و دیگری تاثیر تضعیف کنتدگی روی ساختار نشاسته، به دلیل جلوگیری از ارتباط‌های زنجیره‌های آمیلوژ. میزان تاثیر هر کدام از این دو عامل، بستگی به نوع هیدروکلوبید دارد [۳۰].

mekanisem تاثیر هیدروکلوبیدها بر بیاتی نان کاملاً روشن نیست. اما فرضیاتی در این رابطه مطرح شده است. هیدروکلوبیدها، با تاثیر بر ساختار نشاسته، باعث توزیع بهتر آب و نگهداری آن شده و مقاومت بافت نان را کاهش داده و منجر به تعویق بیاتی می‌شوند [۲۹]. فرضیه دیگر این است که تاثیر هیدروکلوبیدها از دو پدیده

جدول ۶ نتایج ارزشیابی حسی بیاتی

تیمار	روز اول	روز سوم	روز پنجم
کنترل	۴/۱۹ <sup>ab</sup>	۲/۹۵ <sup>a</sup>	۱/۸۰ <sup>a</sup>
۱٪ کتیرا	۴/۰۰ <sup>b</sup>	۲/۳۸ <sup>b</sup>	۱/۳۸ <sup>b</sup>
۱٪ ثعلب	۴/۳۸ <sup>a</sup>	۲/۴۷ <sup>b</sup>	۱/۷۶ <sup>a</sup>

حروف مختلف نشان دهنده اختلاف معنی دار در سطح ۹۹ درصد است (P<0.01).

کتیرا، وجود ندارد. اما نمونه حاوی ثعلب به طور معنی‌داری نسبت به دو نمونه دیگر رطوبت کمتری دارد. علت کمتر بودن رطوبت در نان‌های حاوی ثعلب با توجه به نتایج فارینوگراف،

نتایج اندازه‌گیری میزان رطوبت در جدول شماره ۷ آمده است. همان گونه که در جدول مشاهده می‌شود، در هر سه روز تفاوت معنی‌داری در سطح احتمال ۱٪ بین نمونه کنترل و نمونه حاوی

### ۷-۳ - تاثیر تیمارها بر میزان رطوبت نان

[Downloaded from fscf.modares.ac.ir on 2024-12-01]

نان‌های حاوی این دو هیدروکلولئیداز نظر رطوبت، با یکدیگر و با نان بدون صمغ تفاوتی نداشتند [۳۱]. همان گونه که مشاهده می‌شود، نتایج در مورد کثیرا، در توافق با یافته‌های این محققین است.

می‌تواند جذب آب کمتر تیمارهای حاوی ثعلب نسبت به کثیرا باشد. Mandala و همکاران (۲۰۰۹)، تاثیر هیدروکلولئیدهای هیدروکسی پروپیل متیل سلوژر و صمغ لوپیای لوکاست را بر رطوبت نان تازه بررسی کردند. یافته‌های این محققین نشان داد،

جدول ۷ نتایج اندازه گیری میزان رطوبت

تیمار	روز اول	روز سوم	روز پنجم
کنترل	۳۲/۲۵ <sup>a</sup>	۲۹/۹۵ <sup>a</sup>	۲۸/۸۳ <sup>a</sup>
۱٪ کثیرا	۳۰/۷۰ <sup>a</sup>	۲۸/۹۵ <sup>a</sup>	۲۷/۶۰ <sup>a</sup>
۱٪ ثعلب	۲۸/۷۰ <sup>b</sup>	۲۶/۹۰ <sup>b</sup>	۲۴/۴۰ <sup>b</sup>

حروف مختلف نشان دهنده اختلاف معنی دار در سطح 99 درصد است ( $P < 0.01$ ).

baking performance of frozen bread dough. *Food Hydrocolloids*, 18:305-313.

- [4] Appelqvist, I.A.M. and Debet, M.R.M. (1997). Starch-biopolymer interactions: a review. *Food Reviews International*, 13: 163–224.
- [5] Toufeili, I., Dagher, S., Shadarevian, S., Noureddine, A., Sarakbi, M. and Farran, M. T. (1994). Formulation of gluten-free pocket-type flat breads: optimization of methylcellulose, gum arabic, and egg albumen levels by response surface methodology. *Cereal Chemistry*, 71: 594–601.
- [6] Mettler, E.,&Seibel, W. (1995). Optimizing of rye bread recipes containing monodiglyceride, guar gum, and carboxymethylcellulose using a maturograph and an oven rise recorder. *Cereal Chemistry*, 72: 109–115.
- [7] Rosell, C. M., Rojas, J.A. and Benedito, C. (2001a). Influence of hydrocolloids on dough rheology and bread quality. *Food Hydrocolloids*, 15: 75–81.
- [8] Schiraldi, A., Piazza, L., Brenna, O. and Vittadini, E. (1996). Structure and properties of bread dough and crumb: calorimetric, rheological and mechanical investigations on the effects produced by hydrocolloids, pentosans and soluble proteins. *Journal of Thermal Analysis*, 47(5): 1339–1360.
- [9] Davidou, S., Le Meste, M., Debever, E. and Bekaert, D. (1996). A contribution to the study of staling of white bread: effect of water and hydrocolloid. *Food Hydrocolloids*, 10: 375–383.

#### ۴- نتیجه گیری کلی

نمونه حاوی ۱٪ کثیرا، بیشترین جذب آب را نسبت به کنترل ایجاد کرد، منجر به افزایش زمان گسترش خمیر شد و عدد کیفیت فارینوگراف را به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش داد. علاوه بر این ۱٪ کثیرا، منجر به افزایش مقاومت خمیر شد و بیشترین ضربیت کشش را نسبت به سایر تیمارها ایجاد کرد. در مجموع افزودن ۱٪ کثیرا به فرمولاسیون خمیر، باعث بهبود ویژگی‌های رئولوژیکی خمیر می‌شود. افزودن کثیرا ویژگی‌های کیفی را تحت تأثیر قرار نداد، اما ثعلب باعث کاهش امتیاز از نقطه نظر بو و طعم نان شد. از نظر بیاتی نیز ثعلب در مقایسه با کثیرا، تاثیر بیشتری در تعویق بیاتی داشت، اما نسبت به نمونه کنترل چشمگیر نبود. در نهایت جهت بهبود ویژگی‌های رئولوژیکی خمیر، افزودن کثیرا به میزان ۱٪ پیشنهاد می‌شود.

#### ۵- منابع

- [1] Cauvain, S.P. (1999). Bread – the product. In: Cauvain, S.P., Young, L.S. (Eds.), *Technology of Breadmaking*. Chapman & Hall, New York, pp: 1–17.
- [2] Gray, J. A. and BeMiller, J. N. (2003). Bread staling: Molecular basis and control. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 2, 1–21.
- [3] Ribota, P.D., Perez, G.T., Leon, A.E. and Anon, M.C. (2004). Effect of emulsifier and guar gum on micro structural, rheological and

- [22] Nikolaev, B.A. and Mityukova, L.A. (1976). Effects of extraction rate on baking quality of flour. *Journal of Industria Alimentara*, 24 (1): 12- 15.
- [23] Sim S.Y, Noor Aziah, A.A. and Cheng L.H.(2011). Characteristics of wheat dough and Chinese steamed bread added with sodium alginates or konjac glucomannan. *Food Hydrocolloids*, 25:951-957.
- [24] Guarda, A., Rosell, C.M., Benedito, C. and Galotto, M.J. (2004). Different hydrocolloids as bread improvers and antistaling agents. *Food Hydrocolloids*, 18:241-247.
- [25] Rosell, C.M., Collar, C. and Haros, M. (2007). Assessment of hydrocolloid effects on the thermo-mechanical properties of wheat using the Mixolab. *Food Hydrocolloids*, 21: 452–462.
- [26] Shalini, K.G. and Laxmi, A. (2007). Influence of additives on rheological characteristics of whole –wheat dough and quality of chapatti (Indian unleavened flat bread) part I –*Hydrocolloids*. *Food Hydrocolloids*, 21:110-117.
- [27] Singh, H., and MacRitchie, F. (2001). Application of polymer science to properties of gluten. *Journal of Cereal Science*, 33, 231-243.
- [28] Campbell, G. M. (2003). Bread aeration. In S. P. Cauvain (Ed.), *Bread making: Improving quality* (pp. 352-374). Cambridge, UK: Woodhead Publishing Ltd.
- [29] Armero, E., and Collar, C. (1996). Antistaling additive effects on fresh wheat bread quality. *Food Science and Technology International*, 2: 323–333.
- [30] Biliaderis, C. G., Arvanitoyannis, I., Izzydroczyk, M. S., and Prokopowich, D. J. (1997). Effect of hydrocolloids on gelatinization and structure formation in concentrated waxy maize and wheat starch gels. *Starch/Staerke*, 49(7/8): 278–283.
- [31] Mandala, I. Polaki, A. and Yanniotis, S. (2009). Influence of frozen storage on bread enriched with different ingredients. *Food Engineering*, 92: 137–145
- [10] Kayacier, A. and Dogan, M. (2006). Rheological properties of some gums-*salep* mixed solutions. *Journal of Food Engineering*, 72: 261–265.
- [11] Kaya, S. and A. R. Tekin. (2001). The effect of *salep* content on the rheological characteristics of a typical ice-cream mix. *Journal of Food Engineering*, 47: 59–62.
- [12] Farhoosh, R. and Riazi, A. (2007). A compositional study on two current types of *salep* in Iran and their rheological properties as a function of concentration and temperature. *Food Hydrocolloids*, 21: 660–666.
- [13] Weiping, W. and Branwell, A. (2000). Tragacanth and Karaya in: G.O. Philips and P.A.Williams, (eds). *Hand Book of Hydrocolloids*. Cambridge: Wood Head Publishing Ltd., PP.231-246.
- [14] Mohammadifar, M.A., Musavi, S.M., Kiumarsi, A. and Williams, P. (2006). Solution properties of targacthin (water- soluble part of gum tragacanth exudates from *Astragalus gossypinus*).
- [15] Anon (2000). Approved methods of the American Association of Cereal Chemists (AACC). The American Association of Cereal Chemists., St. Paul, Minnesota, USA.
- [16] Davidou, S., Lemeste, M., Debever, E. and Bekaert, D. (1996). Effects of native lipids, shortenings and bread moisture on bread firmness. *Food Hydrocolloids*, 10: 375-383.
- [17] Rajabzade, N. (1992). Evaluation of Iran industrial bread. Cereal research center, Iran. [In Persian].
- [18] Cereals and Cereal Products, Determination of moisture content. National standard of Iran NO. 2705, ISIRI publication, (1389).
- [19] Basiri, A. (1996). Statistical designs in agricultural science. Shiraz university press.
- [20] Azizi, M.H. and Hadian, Z. (2012). Cereal and Cereal Products Technology. Volume 1. National Nutrition and Food Technology Research Institute press. Tehran, Iran. [In Persian]
- [21] Rajabzade, N. (2008). Bread technology. 5th edition, Tehran university press.

## **Effects of Salep and Tragacanth Hydrocolloids on dough rheological properties and Barbari Bread Quality**

**Gharaie, Z.<sup>1</sup>, Azizi, M. H.<sup>2\*</sup>, Barzegar, M.<sup>2</sup>, Aghagholidzade, R.<sup>3</sup>**

1. Ph.D student of Food science and Technology, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2. Associate Prof, Dept. of Food science and Technology, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

3. Researcher of Iran Cereal Research Center, Tehran, Iran

(Received: 92/10/23 Accepted: 93/4/8)

The aim of this study was to investigate the influence of Tragacanth and Salep gums on the dough rheological properties and Barbari bread quality. Dough was prepared by straight method with gums in two levels (0.5 ,1%). Farinograph and extensograph tests were carried out on dough samples. After baking bread and sensory evaluation, the bread samples were stored for 1-5 day in polyethylene bags in order to do staling tests. According to farinograph results, water absorption of samples containing gums was significantly higher than control. Dough development time increased significantly by 1% Tragacanth. There was significant difference in dough stability between control and samples containing Tragacanth. Extensograph results showed significant differences in energy changes, resistance to extension and extension ratio of samples containing Tragacanth and control. Data obtained from sensory evaluation showed, gums had no significant effect on quality characteristics of bread samples, however in case of taste and aroma salap containing breads presented lower score. Both hydrocolloids didn't have any effect on bread staling, however salep was more effective. Overall results reveal that Tragacanth may improve dough rheological characteristics.

**Keywords:** Barbari Bread, Extensograph, Farinograph, Salep, Tragacanth

---

\* Corresponding Author E-Mail Address: Azizit\_m@modares.ac.ir