

مجله علوم و صنایع غذایی ایران

سایت مجله: www.fsct.modares.ac.ir



مقاله علمی پژوهشی

بررسی تاثیر آرد پوست موز، صمغ دانه ریحان و قدومه شیرازی بر کیک حاوی شیره انجیر و خرما

زهرا جواهری^۱، سارا انصاری^{۲*}، محمدتقی گلمکانی^۳

۱- دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران

۲- استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران.

۳- دانشیار بخش علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

اطلاعات مقاله

در این پژوهش به بررسی تاثیر صمغ دانه ریحان و قدومه شیرازی و سطوح مختلف آرد پوست موز

(۰، ۲۰ و ۴۰٪)، بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی کیک‌های حاوی شیره خرما و انجیر پرداخته شد. برای

این منظور پارامترهایی از جمله pH خمیر و کیک، دانسیته خمیر و کیک، عدد بوستویک، رنگ پوسته

و مغز کیک، بافت کیک و ویژگی‌های حسی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش میزان

آرد پوست موز باعث کاهش pH خمیر و کیک، افزایش دانسیته خمیر و کیک، افزایش قوام خمیر،

کاهش افت پخت، افزایش رطوبت، تیره شدن رنگ پوسته و مغز، سفتی بافت و کاهش ویژگی‌های

حسی گردید. صمغ دانه ریحان نیز در مقایسه با صمغ دانه قدومه شیرازی، تاثیر بیشتری در حفظ

رطوبت و افزایش قوام داشت اما رنگ کیک‌های حاوی صمغ قدومه روشن‌تر بود و بافت نرم‌تری

داشت. کیک‌های تولید شده با شیره انجیر به دلیل رنگ روشن‌تر و بافت نرم‌تر و طعم بهتر ویژگی‌های

حسی مطلوب‌تری داشت و شیره انجیر جایگزین مناسب‌تری برای ساکارز در فرمولاسیون کیک

می‌باشد.

تاریخ های مقاله :

تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۰۵/۲۹

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

کلمات کلیدی:

کیک،

آرد پوست موز،

Shirae خرما، شیره انجیر،

صمغ دانه ریحان،

صمغ دانه قدومه شیرازی.

DOI: 10.52547/fsct.18.09.13

* مسئول مکاتبات:

ansari@kau.ac.ir

و شیرینی‌های سنتی کاربرد فراوانی دارد [۷،۸]. آرد مورد استفاده در گیک معمولاً درجه استخراج پایینی دارد و میزان فیبر آن بسیار کم است. ضایعات میوه‌ها و سبزیجات منابع ارزان قیمت فیبرهای غذایی هستند که می‌توان از آن‌ها به منظور افزایش میزان فیبر، گیک استفاده نمود. پوست موز حاوی مقادیر زیادی فیبر، پروتئین، مواد معدنی و آنتی اکسیدان و دوپامین می‌باشد [۸]. اما عموماً این منبع مغذی به دور انداخته می‌شود که منجر به آلودگی محیط زیست نیز می‌گردد. می‌توان پوست موز را خشک و آسیاب نمود و از آرد حاصل از آن به منظور بهبود کیفیت تغذیه‌ای فرمولاسیون مواد غذایی نظری گیک استفاده نمود. کورهاده و همکاران [۹] به بررسی تاثیر آرد پوست موز بر نان چاپاتی پرداختند. آن‌ها ۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ درصد آرد پوست موز را جایگزین آرد نمودند و اظهار داشتند که میزان چسبندگی و سفتی خمیر با افزایش میزان آرد پوست موز افزایش می‌یابد. علاوه بر این به این نتیجه دست یافتند که با افزایش میزان آرد پوست موز میزان ترکیبات فنری و آنتی اکسیدانی نان افزایش می‌یابد. استفاده از صمغ‌ها در فرمولاسیون گیک می‌تواند منجر به افزایش تخلخل، حجم، نرمی بافت و جذب آب محصول شود و بیانی آن را به تعویق بیندازد [۱۰]. تاکنون انواع مختلفی از هیدروکلریدها از جمله زانتان، گوار، کاراگینان، صمغ لوییاً لوكاست، هیدروکسی پروپیل متیل سلولوز و صمغ دانه به و مرمرشک در تولید گیک به کار رفته اند [۱۱-۱۳]. این تحقیقات نشان داده‌اند که نوع صمغ بر کیفیت گیک تاثیر بسزایی دارد. صمغ دانه ریحان و قدومه از صمغ‌های بومی ایران هستند که پتانسیل زیادی برای کاربرد در محصولات غذایی از جمله گیک دارند. با توجه به عدم بررسی تاثیر همزمان این فاکتورها، هدف از انجام پژوهش فوق بررسی تاثیر صمغ دانه ریحان و قدومه و آرد پوست موز بر گیک‌های حاوی شیره انجیر و خرما می‌باشد.

۲- مواد و روش‌ها

۲-۱- تهیه آرد پوست موز

آرد پوست موز به روش موگو و همکاران [۱۴] تهیه شد. برای این منظور پوست موزهای رسیده با استفاده از بخار در دمای ۵۷ درجه سانتی‌گراد و به مدت ۱۲ ساعت آنزیم زدایی شد تا از تغییر رنگ آنزیمی جلوگیری شود. سپس به ابعاد ۱ سانتی‌متری برش

۱- مقدمه

کیک به دلیل طعم مطبوع، تنوع زیاد، بافت متخلخل و قیمت مناسب از محبوب ترین محصولات صنایع پخت محسوب می‌شود. شکر یکی از ترکیبات اصلی فرمولاسیون گیک است که نقش‌های عملکردی متفاوتی ایفا می‌کند. شکر باعث ایجاد طعم شیرین می‌گردد، ویسکوزیته را افزایش می‌دهد، ظرفیت نگهداری هوا را بهبود می‌بخشد، بر افزایش حجم، بهبود بافت و رنگ گیک تاثیر دارد [۱]. با وجود خواص عملکردی فوق العاده، مصرف غذاهای حاوی میزان زیاد شکر، منجر به افزایش خطر ابتلا به دیابت، چاقی و بیماری‌های قلبی-عروقی می‌گردد [۲]. بنابراین جایگزینی ساکارز با شیرین کننده‌های سالم، می‌تواند منجر به بهبود ارزش تغذیه‌ای گیک شود. شیره خرما و انجیر شیرین کننده‌های طبیعی هستند که ارزش تغذیه‌ای گیک را افزایش می‌دهد. شیره خرما از فیلتراسیون و تغلیط خرما که در آب خیسانده و له شده اند بدست می‌آید [۳]. شیره خرما منبع غنی از کربوهیدرات‌ها بویژه گلوكز و فروکتوز است و اغلب قند آن به فرم قند ساده است که در بدن براحتی می‌تواند جذب شود. پروتئین، چربی، پکتین، ویتامین‌ها و مواد معدنی نظری پتاسیم، منیزیم، سدیم، فسفر، آهن و کلسیم نیز در شیره خرما وجود دارد [۴]. علاوه بر این ترکیبات آنتی اکسیدانی قوی با اثرات ضد جهش و ضد تومور نیز در آن یافت می‌شود. شیره خرما می‌تواند به عنوان جایگزین شکر در محصولات غذایی مختلف از جمله انواع ژله، نوشیدنی، کمپوت، بستنی، نان، کلوچه و گیک مورد استفاده قرار گیرد. مجذوبی و همکاران (۲۰۱۶) در فرمولاسیون بیسکویت، شکر را با شیره خرما و قند مایع خرما جایگزین نمودند. آنان مشاهده نمودند که هر دو شیرین کننده pH و پیوستگی خمیر را کاهش و چسبندگی را افزایش دادند بیسکویت نیز دانسیته بیشتر، بافت سفت تر و رنگ تیره تری در مقایسه با نمونه تولید شده با شکر داشت و شدت تغییرات در خمیر تولید شده با شیره خرما شدیدتر از نمونه تولید شده با قند مایع خرما بود [۵]. شیره انجیر یک شیرین کننده سنتی است که از جوشاندن انجیر در آب و فیلتراسیون آن به دست می‌آید. شیره انجیر حاوی ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی مختلفی است که خاصیت آنتی اکسیدانی، ضد سرطانی و ضد میکروبی دارند بنابراین به عنوان یک غذادار و محسوب می‌شود. این شیرین کننده در تولید غذاها

داده شد و به مدت ۲۴ ساعت در خشک کن قرار داده شد. در ۱۲ ساعت اول، دمای خشک کن ۵۷ درجه سانتی گراد بود و برای ۱۲ ساعت بعد دما به ۵۷ درجه سانتی گراد کاهش داده شد.

۲-۲- مواد اولیه کیک

خمیر کیک حاوی ۱۰۰ گرم آرد، ۵۷ گرم روغن مایع، ۷۲ گرم تخم مرغ، ۶ گرم شیر خشک، ۰/۵ گرم وانیل، ۳ گرم بیکینگ پودر و ۱/۵ گرم صمغ دانه ریحان یا قدومه شیرازی، ۹۸/۶ گرم شیره خرما و ۱/۴ گرم آب و یا ۷۵/۷۹ گرم شیره انجیر و ۲۴/۲۱ گرم آب بود (این مقادیر بر حسب بربیکس شیره های خرما و انجیر تعیین گردید). در نمونه های غنی سازی شده با فیبر ۲۰ یا ۴۰ درصد از آرد با آرد پوست موز جایگزین گردید. در جدول ۱ تیمارهای تحقیق ارائه شده اند.

صمغ دانه ریحان و قدومه شیرازی از شرکت ریحان گام پارسیان تهیه شد. آرد نول شرکت کالله، تخم مرغ تازه پارسیرنگ، روغن مایع آفتابگردان لادن، شیر خشک پگاه و سایر ترکیبات از جمله وانیل، بیکینگ پودر از فروشگاه های مواد غذایی شهر شیراز خریداری گردید.

Table 1 Attributes of treatments used in this research.*

Items	Treatment
1	Wheat flour cake without BPF and hydrocolloids (as control) + DS
2	Wheat flour cake without BPF and hydrocolloids (as control) + FS
3	Wheat flour cake without BPF + BSG + DS
4	Wheat flour cake substituted with 20% BPF + BSG + DS
5	Wheat flour cake substituted with 40% BPF + BSG + DS
6	Wheat flour cake without BPF + AHSG + DS
7	Wheat flour cake substituted with 20% BPF + AHSG + DS
8	Wheat flour cake substituted with 40% BPF + AHSG + DS
9	Wheat flour cake without BPF + BSG + FS
10	Wheat flour cake substituted with 20% BPF + BSG + FS
11	Wheat flour cake substituted with 40% BPF + BSG + FS
12	Wheat flour cake without BPF + AHSG + FS
13	Wheat flour cake substituted with 20% BPF + AHSG + FS
14	Wheat flour cake substituted with 40% BPF + AHSG + FS

*DS=Date syrup; FS=Fig syrup; BSG= Basil seed gum; BPF= banana peel flour; AHSG=*Alyssum homolocarpum* seed gums

۲-۳- تعیین دانسیته خمیر

برای محاسبه دانسیته خمیر وزن حجم مشخصی از خمیر به وزن همان حجم از آب مقطر تقسیم گردید.

۲-۴- تعیین قوام خمیر

صد گرم از خمیر در محفظه یک قوام سنج بوستویک ریخته شد و بعد از ۲ دقیقه استراحت، دریچه قوام سنج برداشته شد و مدت زمانی که خمیر طی ۳۰ ثانیه طی کرده بود ثبت گردید.

۲-۵- پخت کیک

الخمیر کیک (۱۰۰ گرم) در قالب های با قطر ۸/۵ سانتی متر ریخته شد و به مدت ۳۵ دقیقه در فر با دمای ۱۸۰ درجه سانتی گراد قرار گرفت. پس از پخت کیک به مدت یک ساعت در دمای محیط قرار گرفت و سپس از قالب خارج شد. کیک ها تا زمان انجام

تخم مرغ، وانیل، شکر یا شیره انجیر و خرما به مدت ۲ دقیقه با استفاده از همزن برقی (کنوود، مدل KM330 ساخت چین) به هم زده شد و سپس آب و روغن به مخلوط اضافه شد و به مدت ۱ دقیقه مخلوط گردید. مواد خشک شامل آرد، آرد پوست موز، بیکینگ پودر و صمغ ها همزمان به مخلوط اضافه شدند و به آرامی مخلوط شدند تا یک خمیر یکنواخت ایجاد شود.

۲-۶- آزمون های خمیر کیک

۱-۱- اندازه گیری pH خمیر

اندازه گیری pH خمیر با سه تکرار و در دمای محیط (۲۲ درجه سانتی گراد) انجام شد. برای این منظور از pH متر (مدل 632 Metrohm)، ساخت سویس استفاده گردید.

معنی داری $0/05$ و توسط نرم افزار SPSS نسخه ۲۲ تعیین گردید.

آزمون‌ها درون کیسه‌های پلی اتیلنی بسته بندی شدند و در دمای محیط نگهداری شدند.

۷-۲-۱-۲- تعیین ویژگی‌های کیک

۷-۲-۱-۲- تعیین رطوبت، افت پخت و دانسیته کیک

رطوبت، افت پخت و دانسیته کیک طبق روش AACC ۱۰-۹۱ [۱۵] اندازه‌گیری شد.

۷-۲-۲- تعیین pH کیک

برای تعیین pH کیک، 10 گرم از هر نمونه کیک با 100 میلی لیتر آب مقطر مخلوط شد و به مدت 30 دقیقه به هم زده شد. سپس به مدت 10 دقیقه در دمای محیط قرار داده شد و pH با استفاده از pH متر (مدل Metrohm, 632 مدل ساخت سویس) تعیین گردید.

۷-۳-۲- تعیین بافت کیک

ویژگی‌های بافتی کیک از جمله سفتی، پیوستگی، ارتجاج پذیری و مقاومت به جویدن با استفاده از آزمون آنالیز پروفیل بافت با Stable Microsystems, TAXT2، ساخت انگلستان) تعیین گردید. قطعات مکعبی با ابعاد 25 میلی‌متری با استفاده از یک چاقوی تیز از مرکز کیک جدا شد و با استفاده از یک پروب 80 میلی‌متری تا 25 درصد ارتفاع اولیه فشرده گردید.

۷-۴-۲- رنگ کیک

برای ارزیابی رنگ پوسته و مغز کیک از دستگاه هانتر لب استفاده شد و پارامترهای رنگی L^* , a^* و b^* تعیین گردید.

۷-۵-۲- ارزیابی حسی

به منظور بررسی ویژگی‌های حسی کیک‌ها از آزمون هدونیک 9 نقطه‌ای استفاده شد. ویژگی‌هایی نظیر رنگ، بافت، طعم و پذیرش کلی توسط 20 ارزیاب آموزش دیده که سن بین 20 تا 40 سال داشتند مورد ارزیابی قرار گرفت.

۸-۲- آنالیز آماری

در تحقیق حاضر تعداد تیمارها 14 عدد بود و هریک از آزمون‌ها در سه تکرار انجام گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، از طرح کاملاً تصادفی استفاده شد و اختلاف معنی دار بین تیمارها با استفاده از آزمون دانکن و آنالیز واریانس یک طرفه در سطح

۳- نتایج و بحث

۳-۱-۳- pH خمیر و کیک

تاثیر ترکیبات مختلف بر pH خمیر و کیک در جدول 2 و 3 نشان داده شده است. نوع شیرین کننده تاثیر معنی داری بر pH خمیر و کیک داشت. pH شیره خرما $4/7$ و pH شیره انجیر $4/14$ بود در نتیجه pH کیک‌های حاوی شیره انجیر کمتر از کیک‌های حاوی شیره خرما بود. درصد آرد پوست موز نیز بر pH خمیر و کیک تاثیرگذار بود. پوست موز حاوی اسیدهای آلی نظیر مالیک، سوکسینیک، پالمیتیک، 12 -هیدروکسی استearیک اسید است و در نتیجه pH اسیدی دارد [۱۶]. در نتیجه با افزایش درصد آرد پوست موز pH خمیر و کیک کاهش یافت. افزودن صمغ‌ها منجر به کاهش pH شد، نوع صمغ نیز pH خمیر و کیک را تحت تاثیر قرار داد. صمغ‌ها دارای گروه‌های کربوکسیل می‌باشند و هر چه تعداد این گروه‌ها بیشتر باشد خاصیت اسیدی صمغ بیشتر خواهد بود. صمغ ریحان گروه‌های کربوکسیلی بیشتر و درنتیجه pH کمتری دارد [۱۷].

۳-۲- دانسیته خمیر و کیک

نتایج حاصل از بررسی دانسیته خمیر و کیک در جدول 2 و 3 ارائه شده است. دانسیته با میزان حباب هوایی که درون خمیر کیک به دام می‌افتد رابطه عکس دارد و هر چه حباب هوایی بیشتری در خمیر باشد دانسیته کمتر می‌باشد. میزان حباب هوایی که در خمیر محبوس می‌شود بر حجم و بافت کیک نیز تاثیرگذار خواهد بود، زیرا در طی پخت، حباب‌های هوای منبسط می‌شوند و منجر به افزایش حجم و متخلخل شدن بافت کیک می‌گردد. در خمیر فاقد صمغ به دلیل قوام کمتر خروج حباب‌های هوای از خمیر بیشتر بود که منجر به افزایش دانسیته گردید اما با افزودن هیدروکلوریک و افزایش قوام خمیر قابلیت نگهداری حباب‌های هوای در خمیر زیاد شد و دانسیته کاهش یافت. نوع شیرین کننده تاثیری بر دانسیته خمیر و کیک نداشت اما درصد آرد پوست موز بر این پارامتر تاثیر معنی داری داشت. با افزایش درصد آرد پوست

آب منجر به افزایش قوام خمیر و کاهش عدد بوسنیک می شوند. صمغ دانه ریحان در مقایسه با صمغ دانه قدومه شیرازی قوام را بیشتر افزایش داد زیرا ظرفیت جذب آب بیشتری داشت. نوع شیرین کننده نیز بر قوام خمیر موثر بود و نمونه های تولید شده با شیره انجیر قوام بیشتری داشتند.

۴-۳- رطوبت و افت پخت کیک

رطوبت نمونه های کیک با درصد جایگزینی آرد پوست موز رابطه مستقیم داشت. با افزایش درصد آرد پوست موز در فرمولاسیون کیک، میزان رطوبت افزایش یافت. این امر نیز به دلیل بیشتر بودن قابلیت نگهداری و اتصال با آب در پوست موز در مقایسه با آرد گندم می باشد. میزان افت پخت با رطوبت کیک رابطه عکس دارد. افت پخت نشان دهنده خروج رطوبت از کیک در طی پخت می باشد. بنابراین آرد پوست موز با حفظ رطوبت در محصول، میزان افت پخت را کاهش می دهد. میزان افت پخت در نمونه های فاقد صمغ بیشتر بود زیرا صمغ ها با جذب آب مانع از تبخیر رطوبت خمیر می شوند. افت پخت کیک های حاوی صمغ دانه ریحان کمتر از نمونه های حاوی صمغ دانه قدومه شیرازی بود که با روند مشاهده شده در میزان رطوبت نمونه های کیک هم خوانی دارد و به دلیل ظرفیت جذب آب بالاتر این هیدروکلرئید می باشد. نورلیلا و همکاران [۱۹] نیز اظهار داشتند که افزودن صمغ زانتان و هیدروکسی پروپیل متیل سلولز منجر به حفظ رطوبت و کاهش افت پخت در کیک می گردد.

Table 2 Influence of sweetener type, gum and banana peel flour on physicochemical properties of batter.

Treatment	Batter pH	Batter density	Bostwick number (cm)
DS+ 0%BPF	7.83±0.05 ^a	0.94±0.012 ^d	6.47±0.15 ^a
DS+BSG+0%BPF	7.71±0.02 ^{bc}	0.84±0.004 ^g	4.90±0.10 ^d
DS+BSG+20%BPF	7.47±0.01 ^{fgh}	0.95±0.002 ^d	3.27±0.21 ^g
DS+BSG+40%BPF	7.38±0.02 ^h	0.94±0.002 ^d	1.80±0.10 ^j
DS+AHSG+0%BPF	7.77±0.03 ^{ab}	0.81±0.004 ^h	5.23±0.15 ^c
DS+ AHSG +20%BPF	7.52±0.06 ^f	0.87±0.001 ^e	4.50±0.20 ^e
DS+ AHSG +40%BPF	7.55±0.05 ^{ef}	0.98±0.001 ^c	2.77±0.15 ^h
FS+ 0%BPF	7.67±0.05 ^{cd}	0.88±0.010 ^e	5.97±0.06 ^b
FS+BSG+0%BPF	7.64±0.05 ^{cd}	0.80±0.002 ⁱ	4.53±0.12 ^e
FS+BSG+20%BPF	7.39±0.06 ^h	0.86±0.003 ^f	2.90±0.10 ^h
FS+BSG+40%BPF	7.38±0.03 ^h	1.02±0.007 ^a	1.53±0.21 ^k
FS+AHSG+0%BPF	7.62±0.05 ^{de}	0.83±0.010 ^g	5.10±0.10 ^{cd}
FS+ AHSG +20%BPF	7.50±0.02 ^{fg}	0.83±0.002 ^g	4.10±0.10 ^e
FS+ AHSG +40%BPF	7.43±0.10 ^{gh}	0.99±0.001 ^b	2.37±0.15 ⁱ

*DS=Date syrup; FS=Fig syrup; BSG= Basil seed gum; BPF= banana peel flour; AHSG= *Alyssum homolocarpum* seed gums; Values are means ± standard deviations. Values with different letter within same columns are significantly different ($P<0.05$).

موز دانسیته افزایش یافت که نشان دهنده کاهش حباب های هوا در خمیر است. آرد پوست موز در مقایسه با آرد ظرفیت جذب آب بسیار بالای دارد و باعث افزایش قوام خمیر می شود. وقتی که قوام خمیر خیلی بالا است امکان تشکیل حباب هوا در خمیر وجود ندارد. زوایر و همکاران [۱۸] نیز اظهار داشتند که افزودن آرد پوست موز به کیک های فنجانی منجر به افزایش دانسیته آنها می شود.

۴-۳- قوام خمیر

عدد بوسنیک به عنوان شاخصی از قوام خمیر در نظر گرفته می شود. هرچه خمیر قوام بیشتری داشته و سفت تر باشد در مدت زمان ۳۰ ثانیه مسافت کمتری را طی می کند. همانطور که در جدول ۲ نشان داده شده است تاثیر آرد پوست موز بر قوام خمیر معنی دار است. با افزایش درصد جایگزینی آرد پوست موز قوام خمیر افزایش یافت. آرد پوست موز ظرفیت جذب آب بسیار بالای دارد و هر گرم از آن قادر است ۱۷/۹۲ گرم آب را به دام بیندازد درحالی که ظرفیت جذب آب هر گرم آرد گندم ۱/۹۶ گرم می باشد. بنابراین با به دام افتادن آب در پوست موز تحرک آن کم شده و خمیر سفت تر می شود. نوع صمغ نیز بر قوام خمیر تاثیر معنی داری داشت. کورهاده و همکاران [۹] نیز اظهار داشتند که افزودن آرد پوست موز به نان چاپاتی باعث سفت تر شدن خمیر می شود. نمونه های فاقد صمغ عدد بوسنیک بیشتری داشتند که نشان دهنده قوام خمیر است. صمغ ها با جذب

Table 3 Influence of sweetener type, gum and banana peel flour on physicochemical properties of cake.

Treatment	Cake density (g/cm ³)	Moisture (%)	Baking loss (%)	Cake pH
DS+ 0%BPF	0.37±0.006 ^a	17.22±0.10 ^k	12.80±0.11 ^a	7.72±0.06 ^a
DS+BSG+0%BPF	0.32±0.025 ^b	18.65±0.05 ^g	11.25±0.28 ^c	7.61±0.01 ^{cd}
DS+BSG+20%BPF	0.37±0.027 ^a	19.13±0.14 ^f	9.4±0.30 ^{ef}	7.50±0.02 ^{ef}
DS+BSG+40%BPF	0.39±0.009 ^a	20.06±0.11 ^{de}	9.29±0.37 ^{ef}	7.07±0.06 ^g
DS+AHSG+0%BPF	0.40±0.015 ^a	19.88±0.02 ^e	11.98±0.88 ^b	7.70±0.03 ^{ab}
DS+ AHSG +20%BPF	0.40±0.027 ^a	20.08±0.34 ^d	10.25±0.17 ^d	7.63±0.02 ^{bed}
DS+ AHSG +40%BPF	0.39±0.052 ^a	20.58±0.25 ^b	8.34±0.52 ^g	7.50±0.05 ^{ef}
FS+ 0%BPF	0.36±0.006 ^a	16.95±0.06 ^l	12.55±0.06 ^{ab}	7.57±0.06 ^{de}
FS+BSG+0%BPF	0.31±0.010 ^b	17.43±0.04 ^j	10.08±0.16 ^d	6.88±0.02 ^h
FS+BSG+20%BPF	0.38±0.005 ^a	17.95±0.05 ⁱ	9.90±0.10 ^{de}	6.79±0.08 ⁱ
FS+BSG+40%BPF	0.37±0.039 ^a	20.33±0.01 ^c	8.38±0.33 ^g	6.21±0.02 ^j
FS+AHSG+0%BPF	0.39±0.022 ^a	18.22±0.03 ^h	10.28±0.29 ^d	7.66±0.07 ^{abc}
FS+ AHSG +20%BPF	0.37±0.035 ^a	18.28±0.04 ^h	9.07±0.16 ^f	7.52±0.03 ^{ef}
FS+ AHSG +40%BPF	0.39±0.037 ^a	21.51±0.02 ^a	9.36±0.57 ^{ef}	7.46±0.02 ^f

*DS=Date syrup; FS=Fig syrup; BSG= Basil seed gum; BPF= banana peel flour; AHSG= *Alyssum homolocarpum* seed gums; Values are means ± standard deviations. Values with different letter within same columns are significantly different (P<0.05).

داشت. با افزایش میزان آرد پوست موز میزان سفتی بافت افزایش یافت که به دلیل متراکم تر شدن بافت در اثر کاهش حباب های هوا در خمیر کیک می باشد. بافت نمونه های حاوی صمغ سفت تر از نمونه های بدون هیدروکلولئید بود و بافت کیک حاوی صمغ دانه ریحان سفت تر از نمونه های حاوی صمغ دانه قدومه شیرازی بود زیرا ظرفیت جذب آب در این نمونه بیشتر بود.

۵-۳- بافت کیک

نتایج حاصل از آزمون بافت سنجی نمونه های کیک در جدول ۴ نشان داده شده است. بافت از ویژگی های بسیار مهم در کیک محسوب می شود. این ویژگی نیز تحت تاثیر دانسیته و میزان جذب آب می باشد. نوع شیرین کننده، میزان جایگزینی آرد پوست موز و نوع هیدروکلولئید بر بافت کیک تاثیر معنی داری

Table 4 Influence of sweetener type, gum and banana peel flour on textural properties of cake.*

Treatment	Hardness (g)	Cohesiveness (kg/s)	Springiness (mm)	Chewiness (mJ)
DS+ 0%BPF	48.49±3.57 ^g	0.88±0.015 ^{abc}	4.4±0.26 ^a	186±6.86 ^d
DS+BSG+0%BPF	62.0±3.10 ^e	0.92±0.046 ^a	4.63±0.23 ^a	264±20.12 ^c
DS+BSG+20%BPF	82.5±4.13 ^c	0.88±0.044 ^{abc}	4.79±0.24 ^a	348±18.17 ^b
DS+BSG+40%BPF	110.0±5.50 ^a	0.83±0.041 ^{bcd}	4.63±0.23 ^a	423±10.22 ^a
DS+AHSG+0%BPF	69.0±3.45 ^d	0.93±0.047 ^a	4.60±0.23 ^a	295±23.15 ^c
DS+ AHSG +20%BPF	69.5±3.48 ^d	0.88±0.044 ^{abc}	4.55±0.23 ^a	278±10.14 ^c
DS+ AHSG +40%BPF	96.50±4.83 ^b	0.86±0.043 ^{abcd}	4.64±0.23 ^a	385±29.21 ^b
FS+ 0%BPF	30.32±1.68 ^h	0.80±0.045 ^{de}	4.47±0.25 ^a	104±10.13 ^f
FS+BSG+0%BPF	51.50±2.58 ^{fg}	0.86±0.043 ^{abcd}	4.47±0.22 ^a	198±13.10 ^d
FS+BSG+20%BPF	71.0±3.55 ^d	0.87±0.044 ^{abcd}	4.54±0.23 ^a	280±9.10 ^c
FS+BSG+40%BPF	91.5±4.58 ^b	0.84±0.042 ^{bcd}	4.64±0.23 ^a	357±11.14 ^b
FS+AHSG+0%BPF	31.0±1.55 ^h	0.89±0.045 ^{ab}	4.66±0.20 ^a	129±6.04 ^e
FS+ AHSG +20%BPF	51.0±2.55 ^{fg}	0.81±0.041 ^{cd}	4.43±0.22 ^a	183±8.16 ^d
FS+ AHSG +40%BPF	55.5±2.78 ^f	0.73±0.037 ^e	4.57±0.23 ^a	185±6.14 ^d

*DS=Date syrup; FS=Fig syrup; BSG= Basil seed gum; BPF= banana peel flour; AHSG= *Alyssum homolocarpum* seed gums; Values are means ± standard deviations. Values with different letter within same columns are significantly different (P<0.05).

کمتر بود. پودر پوست موز نیز در مقایسه با آرد نول رنگ تیره تری دارد و جایگزینی آن با پوست موز منجر به تیره تر شدن رنگ کیک گردید. کورهاده و همکاران نیز به نتایج مشابهی در مورد نان چاپاتی حاوی آرد پوست موز دست یافتن و اظهار داشتند که وجود ترکیبات فنولی و زانتوفیل های مختلف در تیره بودن رنگ آرد پوست موز نقش دارد [۹]. نوع صمغ نیز بر رنگ مغز کیک تاثیرگذار بود. صمغ دانه ریحان در مقایسه با صمغ قدومه شیرازی رنگ تیره تری داشت و منجر به کاهش پارامتر رنگی * در مغز کیک گردید. پارامتر *^a و *^b نیز که به ترتیب نشان دهنده قرمزی و زردی رنگ کیک میباشد در اثر افزودن پوست موز افزایش یافتند. میزان پارامتر *^a و *^b در مغز کیک-های حاوی صمغ دانه ریحان و شیره خرما بیشتر بود. رنگ پوسته کیک عمدتاً تحت تاثیر واکنش های میلارد و کارامیلیزاسیون میباشد. در نمونه های حاوی صمغ دانه ریحان، شیره خرما و درصد بالاتر آرد پوست موز به دلیل کاهش آب آزاد و فعالیت آبی قهقهه ای شدن شدیدتر است. درنتیجه روشنابی بافت کمتر و قرمزی و زردی بیشتر میباشد.

Table 5 Influence of sweetener type, gum and banana peel flour on cake crumb and crust color.

Treatment	Crumb L*	Crumb a*	Crumb b*	Crust L*	Crust a*	Crust b*
DS+ 0%BPF	56.10±1.01 ^b	6.32±0.46 ^{cd}	30.43±1.40 ^{bc}	43.53±1.50 ^{cd}	11.34±0.43 ^c	25.37±0.57 ^d
DS+BSG+0%BPF	52.60±1.33 ^{bc}	9.09±1.53 ^b	30.07±1.14 ^{bc}	43.95±4.12 ^{cd}	15.54±1.13 ^{ab}	25.84±1.29 ^{cde}
DS+BSG+20%BPF	45.44±4.05 ^{ef}	9.58±1.48 ^b	31.57±3.76 ^b	42.75±4.05 ^{cde}	17.26±1.13 ^a	29.08±3.76 ^{bed}
DS+BSG+40%BPF	42.15±0.90 ^f	12.53±1.95 ^a	40.29±0.44 ^a	37.05±1.87 ^e	17.41±1.33 ^a	36.62±1.65 ^a
DS+AHSG+0%BPF	54.72±3.12 ^b	6.39±0.43 ^{cd}	31.81±3.26 ^b	46.15±6.70 ^{bc}	14.58±1.93 ^{bcd}	28.49±2.31 ^{bed}
DS+ AHSG +20%BPF	49.64±1.04 ^{cd}	7.86±1.13 ^{bc}	32.31±1.14 ^b	45.75±0.90 ^{bc}	15.79±1.53 ^{ab}	30.66±2.68 ^{bc}
DS+ AHSG +40%BPF	47.24±2.26 ^{de}	11.79±0.73 ^a	38.87±1.41 ^a	42.45±2.08 ^{cde}	16.53±0.85 ^{ab}	33.06±0.86 ^{ab}
FS+ 0%BPF	80.48±0.50 ^a	0.42±0.39 ^e	21.13±0.81 ^e	52.37±0.64 ^a	12.48±0.50 ^{de}	22.44±0.51 ^{ef}
FS+BSG+0%BPF	78.70±1.38 ^a	0.25±0.43 ^e	23.85±2.28 ^{de}	42.75±4.61 ^{cde}	12.59±0.85 ^{de}	22.35±4.80 ^{ef}
FS+BSG+20%BPF	46.34±3.74 ^{de}	5.16±0.074 ^d	26.34±2.40 ^{cd}	42.42±2.27 ^{cde}	12.84±1.13 ^{cde}	25.84±0.75 ^{cde}
FS+BSG+40%BPF	43.95±3.11 ^{ef}	4.91±3.23 ^d	31.81±2.58 ^b	39.75±0.52 ^{de}	15.30±2.55 ^{abc}	30.32±3.26 ^{bc}
FS+AHSG+0%BPF	77.20±0.90 ^a	0.49±0.43 ^e	27.33±2.99 ^{cd}	49.93±1.38 ^{ab}	12.59±1.13 ^{de}	18.87±3.02 ^f
FS+ AHSG +20%BPF	53.84±0.90 ^b	4.67±0.43 ^d	29.08±1.14 ^{bc}	46.64±3.24 ^{bc}	14.07±2.37 ^{bcd}	23.35±3.37 ^{ef}
FS+ AHSG +40%BPF	45.75±0.90 ^{ef}	5.65±0.85 ^{cd}	33.31±2.99 ^b	43.05±1.80 ^{cd}	14.81±0.43 ^{abcd}	29.58±1.98 ^{bed}

*DS=Date syrup; FS=Fig syrup; BSG= Basil seed gum; BPF= banana peel flour; AHSG= *Alyssum homolocarpum* seed gums; Values are means ± standard deviations. Values with different letter within same columns are significantly different ($P<0.05$).

شیره انجیر در مقایسه با شیره خرما رنگ روشن تری دارد و رنگ کیک های تولید شده با شیره انجیر به کیک هایی که با شکر تولید می شوند نزدیک تر است به همین دلیل رنگ کیک حاوی شیره انجیر، امتیاز بیشتری را کسب نموده است. بافت کیک های حاوی شیره انجیر و شیره خرما از نظر ارزیاب ها تفاوت چندانی با

کیک های تولید شده با شیره خرما بافت سفت تری داشتند دلیل این امر می تواند بالاتر بودن میزان فیبر در این نمونه در مقایسه با شیره انجیر باشد. نوع شیرین کننده و هیدروکلرولین، انسجام کیک را تحت تاثیر قرار نداد اما افزودن آرد پوست موز انسجام بافت کیک را کاهش داد. مجنوبی و همکاران نیز تفاله هویج را به عنوان یک منبع فیبر به کیک افزودند و به نتایج مشابهی دست یافته اند آنان اظهار داشتند که جایگزین نمودن بخشی از آرد با فیبر باعت کاهش غلظت گلوتن و تضعیف شبکه گلوتنی در کیک می شود و در نتیجه انسجام بافت را کاهش می دهد [۲۰]. ارجاع پذیری کیک در نمونه های مختلف تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشت و همه نمونه ها از ارجاع پذیری بالایی برخوردار بودند. تغییرات مقاومت به جویدن نیز با سفتی بافت هم راستا بود.

۶-۳- رنگ مغز و پوسته کیک

نتایج آنالیز رنگ پوسته و مغز کیک در جدول ۵ نمایش داده شده است. رنگ مغز کیک وابسته به ترکیبات موجود در فرمولاسیون کیک میباشد. از آنجا که شیره خرما در مقایسه با شیره انجیر رنگ تیره تری دارد، پارامتر * در نمونه های حاوی شیره خرما

۷-۳- ارزیابی حسی

نتایج ارزیابی حسی نمونه های کیک در جدول ۶ نشان داده شده است. از نظر ارزیاب ها کیک های حاوی شیره انجیر در مقایسه با کیک های حاوی شیره خرما از ویژگی های حسی بهتری برخوردار بودند و در کلیه ویژگی های حسی امتیاز بیشتری کسب نمودند.

می‌دهد. اما همه نمونه‌های حاوی پوست موز نیز نمرات قابل قبولی از نظر حسی کسب نمودند. نوع صمغ تاثیر معنی‌داری بر طعم کیک نداشت اما در سایر ویژگی‌های حسی کیک‌های حاوی صمغ قدمه شیرازی نمرات بیشتری کسب نمودند.

یکدیگر نداشت. طعم کیک‌های حاوی شیره انجیر نیز از نظر ارزیاب‌ها بهتر بود. با افزایش درصد آرد پوست موز، امتیاز پارامترهای حسی کاهش یافت و کیک‌های حاوی ۴۰٪ آرد پوست موز کمترین نمرات را کسب نمودند. پوست موز باعث سفت‌تر شدن و تیرگی کیک می‌شود و مطلوبیت طعم را کاهش

Table 6 Influence of sweetener type, gum and banana peel flour on sensory properties of cake.*

Treatment	Taste	Texture	Crust color	Crumb color	Overall acceptance
DS+0%BPF	5.6±0.72 ^{def}	5.6±0.67 ^{cde}	6.1±0.62 ^{bc}	6.2±0.54 ^b	6.2±0.75 ^d
DS+BSG+0%BPF	5.6±0.84 ^{def}	6.0±0.82 ^{abcde}	6.2±0.92 ^{bc}	6.2±0.42 ^b	6.4±0.52 ^{cd}
DS+BSG+20%BPF	5.2±0.79 ^{ef}	5.6±0.70 ^{cde}	6.0±0.67 ^{bc}	6.0±0.67 ^{bc}	6.4±0.70 ^{cd}
DS+BSG+40%BPF	5.2±0.79 ^{ef}	5.2±0.63 ^e	5.6±0.97 ^c	5.4±0.70 ^c	6.2±0.92 ^d
DS+AHSG+0%BPF	5.8±0.42 ^{cde}	6.2±1.03 ^{abcd}	6.4±0.64 ^b	6.4±0.97 ^{ab}	7.0±0.67 ^{bc}
DS+ AHSG +20%BPF	5.2±0.79 ^{ef}	5.6±0.70 ^{cde}	6.6±0.70 ^b	6.0±0.67 ^{bc}	6.2±0.79 ^d
DS+ AHSG +40%BPF	5.0±0.67 ^f	5.4±0.70 ^{de}	6.2±0.63 ^{bc}	5.8±0.63 ^{bc}	6.2±0.42 ^d
FS+ 0%BPF	7.0±0.59 ^a	6.2±1.06 ^{abcd}	7.5±0.64 ^a	6.6±0.63 ^{ab}	7.4±0.67 ^{ab}
FS+BSG+0%BPF	7.0±0.67 ^a	6.4±0.70 ^{abc}	7.8±0.79 ^a	7.0±0.82 ^a	7.4±0.70 ^{ab}
FS+BSG+20%BPF	6.6±0.70 ^{ab}	5.8±0.79 ^{bcde}	6.6±1.17 ^b	6.6±0.52 ^{ab}	7.2±0.92 ^{ab}
FS+BSG+40%BPF	6.4.0±0.52 ^{abc}	5.4±0.52 ^{de}	6.6±0.70 ^b	5.8±0.92 ^{bc}	6.2±0.42 ^d
FS+AHSG+0%BPF	6.6±0.84 ^{ab}	6.8±0.79 ^a	8.0±0.67 ^a	6.6±0.70 ^{ab}	7.8±0.79 ^a
FS+ AHSG +20%BPF	6.4±0.84 ^{abc}	6.6±0.1.17 ^{ab}	7.4±0.84 ^a	6.4±1.08 ^{ab}	7.4±0.70 ^{ab}
FS+ AHSG +40%BPF	6.2±0.42 ^{bcd}	6.4±1.08 ^{abc}	7.6±0.52 ^a	6.2±0.92 ^b	7.2±0.79 ^{ab}

*DS=Date syrup; FS=Fig syrup; BSG= Basil seed gum; BPF= banana peel flour; AHSG= *Alyssum homolocarpum* seed gums; Values are means ± standard deviations. Values with different letter within same columns are significantly different ($P<0.05$).

۵- منابع

- Wilderjans, E., Luyts, A., Brijs, K., & Delcour, J. A. (2013). Ingredient functionality in batter type cake making. *Trends in Food Science & Technology*, 30(1), 6-15.
- Hao, Y., Wang, F., Huang, W., Tang, X., Zou, Q., Li, Z., & Ogawa, A. (2016). Sucrose substitution by polyols in sponge cake and their effects on the foaming and thermal properties of egg protein. *Food Hydrocolloids*, 57, 153-159.
- Ashraf, Z. & Hamidi-Esfahani, Z. 2011. Date and Date Processing: A Review. *Food Rev. Int.*, 27: 101-133.
- Farahnaky, A., Mardani,M., Mesbahi, Gh., Majzoobi, M., and Golmakani, M. T. (2016) .Some Physicochemical Properties of Date Syrup, Concentrate, and Liquid Sugar in Comparison with Sucrose Solutions. *Journal of Agricultural Science and Technology*, (18) 657-668.

۴- نتیجه گیری

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که می‌توان با حذف شکر از فرمولاسیون کیک و استفاده از شیره خرما و شیره انجیر کیک‌هایی با ویژگی‌های حسی و فیزیکوشیمیابی مطلوب تولید نمود. از بین این دو شیرین کننده طبیعی، شیره انجیر ویژگی‌های فیزیکوشیمیابی و حسی بهتری داشت. علاوه بر این، نتایج حاکی از این بود که صمغ قدمه شیرازی در مقایسه با صمغ دانه ریحان در بهبود ویژگی‌های کیک تاثیر بیشتری دارد. استفاده از آرد پوست موز به عنوان یک منبع فیبر نیز مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که می‌توان از این ماده در فرمولاسیون کیک استفاده نمود تا علاوه بر بهبود ارزش تغذیه‌ای کیک، ضایعات صنایع غذایی را نیز کاهش داد.

- in intelligent quality control of celiac-friendly products. *Procedia Computer Science*, 120, 325-332.
- [13] Turabi, E., Sumnu, G., & Sahin, S. (2008). Rheological properties and quality of rice cakes formulated with different gums and an emulsifier blend. *Food Hydrocolloids*, 22(2), 305-312.
- [14] Mugo, M. W., & Njue, L. G. (2019). Development of a High Value Nutritious Baking Flour from Dried Ripe Banana Peels. *Asian Food Science Journal*, 1-7.
- [15] AACC. (2010). *AACC Approved Methods of Analysis* (11th ed.). Minnesota: American Association of Cereal Chemist, St. Paul
- [16] Nasution, Z., Lim, R. Y., & Wan Hafiz, W. Z. S. (2012). Banana peel flour: an alternative ingredient for wholemeal bread. In *UMT 11th International Annual Symposium on Sustainability Science and Management. 09th-11th July* (pp. 682-687).
- [17] Salehi, F., Kashaninejad, M., Tadayyon, A., & Arabameri, F. (2015). Modeling of extraction process of crude polysaccharides from Basil seeds (*Ocimum basilicum* L.) as affected by process variables. *Journal of Food Science and Technology*, 52(8), 5220-5227.
- [18] Zoair, A. S. A., Attia, R. S., Abou Garbia, H. A., & Youssef, M. M. (2016). Utilization of Orange, Banana and Potato Peels in Formulating Functional Cupcakes and Crackers. *Alexandria Journal of Food Science and Technology*, 367 (4210), 1-8.
- [19] Noorlaila, A., Hasanah, H. N., Yusoff, A., Sarijo, S. H., & Asmeda, R. (2017). Effects of xanthan gum and HPMC on physicochemical and microstructure properties of sponge cakes during storage. *Journal of food science and technology*, 54(11), 3532-3542.
- [20] Majzoobi, M., Vosooghi Poor, Z., Mesbahi, G., Jamalian, J., & Farahnaky, A. (2017). Effects of carrot pomace powder and a mixture of pectin and xanthan on the quality of gluten-free batter and cakes. *Journal of texture studies*, 48(6), 616-623.
- [5] Majzoobi, M., Mansouri, H., Mesbahi, G., Farahnaky, A., & Golmakani, M. T. (2016). Effects of sucrose substitution with date syrup and date liquid sugar on the physicochemical properties of dough and biscuits. *Journal of Agricultural Science and Technology*, (18) 643-656.
- [6] Dhaouadi, K., Raboudi, F., Funex-Gomez, L., Pamies, D., Estevan, C., Hamdaoui, M., & Fattouch, S. (2013). Polyphenolic extract of Barbary-Fig (*Opuntia ficus-indica*) syrup: RP-HPLC-ESI-MS analysis and determination of antioxidant, antimicrobial and Cancer-Cells cytotoxic potentials. *Food Analytical Methods*, 6(1), 45-53.
- [7] Puoci, F., Iemma, F., Spizzirri, U. G., Restuccia, D., Pezzi, V., Sirianni, R., ... & Picci, N. (2011). Antioxidant activity of a Mediterranean food product "fig syrup". *Nutrients*, 3(3), 317-329.
- [8] Sagar, N. A., Pareek, S., Sharma, S., Yahia, E. M., & Lobo, M. G. (2018). Fruit and vegetable waste: bioactive compounds, their extraction, and possible utilization. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 17(3), 512-531.
- [9] Kurhade, A., Patil, S., Sonawane, S. K., Waghmare, J. S., & Arya, S. S. (2016). Effect of banana peel powder on bioactive constituents and microstructural quality of chapatti: unleavened Indian flat bread. *Journal of Food Measurement and Characterization*, 10(1), 32-41.
- [10] Salehi, F. (2020). Effect of common and new gums on the quality, physical, and textural properties of bakery products: A review. *Journal of texture studies*, 51(2), 361-370.
- [11] Salehi, F. (2017). Rheological and physical properties and quality of the new formulation of apple cake with wild sage seed gum (*Salvia macrosiphon*). *Journal of Food Measurement and Characterization*, 11(4), 2006-2012.
- [12] Rezagholi, F., & Hesarinejad, M. A. (2017). Integration of fuzzy logic and computer vision

Iranian Journal of Food Science and Technology

Homepage: www.fsct.modares.ir



Scientific Research

Influence of banana peel flour, basil and *Alyssum homolocarpum* seed gums on cakes containing fig and date syrup

Javaheri, Z. ¹, Ansari, S. ^{2*}, Golmakan, M. ³

1. M.Sc. Graduated student, Department of Food Science and Technology, Kazerun Branch, Islamic Azad University, Kazerun, Iran.
2. Assistant Prof., Department of Food Science and Technology, Kazerun Branch, Islamic Azad University, Kazerun, Iran.
3. Associate Prof., Department of Food Science and Technology, School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran.

ABSTRACT

ARTICIE INFO

In this study the influence of *Alyssum homolocarpum* seed gum (AHSG), basil seed gum (BSG) and different levels of banana peel flour (BPF) (0, 20 and 40%) on physicochemical properties of cakes containing date syrup (DS) or fig syrup (FS) was investigated. Parameters such as batter and cake pH, density, bostwick number, cake crumb and crust color, texture and sensory attributes were determined. The results revealed that increasing the banana peel flour decreased batter and cake pH, baking loss and sensory scores while increased batter and cake density, batter consistency, cake moisture, darkness and hardness. The influence of basil seed gum on moisture retention and consistency improvement was more significant than *Alyssum homolocarpum* seed gum. However, the cakes incorporated with *Alyssum homolocarpum* seed gum had lighter color and softer texture. Cakes manufactured by fig syrup had lighter color, softer texture and better organoleptic properties and fig syrup was a better replacer for sucrose in cake formulation.

Article History:

Received 2020/08/19
Accepted 2021/05/12

Keywords:

Cake,
Banana peel flour,
Fig syrup,
Date syrup,
Basil seed gum,
Alyssum homolocarpum seed gum

DOI: 10.52547/fsct.18.09.13

*Corresponding Author E-Mail:
ansari@kau.ac.ir