

تأثیر برخی هیدروکلولئیدها و امولسیفایرها بر خواص رئولوژیکی و حسی کیک رژیمی

پیمان آریایی^{۱*}، مسعود قنبری^۲، محمد عبدالپور^۲

۱- استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت‌آباد-آمل

۲- مدعو گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت‌آباد-آمل

(تاریخ دریافت: ۹۳/۲/۱۸ تاریخ پذیرش: ۹۴/۴/۱۹)

چکیده

در این تحقیق تخم مرغ و چربی اشباع را از ترکیب کیک حذف کرده و به عنوان جایگزین از سه صمغ سلولز میکروکریستاله (MCC)، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز (HPMC) و زانتان، دو امولسیفایر گلیسرول منو استارتات (GMS) و سدیم استارتاریل لاتکیلات (SSL) و همچنین ایزوکله پروتئین آب پنیر (WPI) استفاده شد. تاثیر مواد مذکور بر دانسیته، ویسکوزیتهٔ خمیر، حجم، بافت و خواص حسی کیک مورد بررسی قرار گرفت. اضافه کردن هیدروکلولئیدها ویسکوزیته و دانسیته خمیر را افزایش داد. در میان هیدروکلولئیدها زانتان بیشترین تاثیر را داشت و بعد از آن سلولز میکروکریستاله (MCC) و هیدروکسی پروپیل متیل سلولز (HPMC) قرار گرفتند. خمیرهای حاوی هیدروکلولئید سنگین تر بودند و به خوبی نتوانستند هواهی شوند. نتایج ارزیابی حسی نشان داد که نمونه‌های حاوی زانتان امتیازهای کمتری به دست آورده‌اند. در بین کیک‌های بدون چربی و تخم مرغ HPMC توانست امتیاز کلی بیشتری کسب کند. استفاده از HPMC رنگ مغز کیک را بهبود بخشید و MCC توانست در مورد شاخص بافت امتیاز بیشتری را کسب کند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان دادند که بعضی از هیدروکلولئیدها به همراه WPI و امولسیفایرها می‌توانند جایگزین مناسبی برای تخم مرغ و روغن اشباع در فرمولاسیون کیک باشند.

کلید واژگان: هیدروکلولئید، امولسیفایر، خواص رئولوژیکی، کیک رژیمی

* مسئول مکاتبات: p.aryaye@yahoo.com

استفاده می شود در نتیجه این آرد ها نمی توانند در حفظ حالت اسفنجی کیک موثر باشند و برای جبران این نقیصه از تخم مرغ استفاده می شود. اما در کنار این خصوصیات مطلوب باید این نکته را در نظر داشت که زرده منع غنی کلسترول و چربی اشباع است [۳]. یک زرده ی تخم مرغ دارای ۲۱۰ میلی گرم کلسترول است. اضافه کردن یک تخم مرغ در روز به رژیم غذایی افراد با تغذیه ی معمول، میزان کلسترول بدن آنها را تا ۴ درصد و ریسک سکته های قلبی را ۸ درصد افزایش می دهد. مصرف بیش از ۳۰۰ میلی گرم کلسترول در روز مجاز نیست و این رقم برای افرادی که دارای بیماری های قلبی هستند تا ۲۰۰ میلی گرم در روز کاهش میابد. از لحاظ چربی یک زرده حاوی ۶/۱ گرم چربی اشباع است. علاوه بر بحث سلامتی، تخم مرغ گران ترین ماده در کیک بوده و ماندگاری نسبتاً پائینی دارد و کم کردن جزئی یا کامل تخم مرغ می تواند علاوه بر جنبه ی بهداشت و سلامتی باعث صرفه ی اقتصادی و کاهش قیمت تمام شده ی محصول شود و این مساله در نهایت به مصرف کننده ی نهایی منتقل می شود. امولسیفایرها در کیک سبب بهبود هوادهی، افزایش حجم، کاهش دانسیته، افزایش ویسکوزیته، افزایش ماندگاری و نرمی و لطافت کیک می شوند و پدیده ی بیاتی را به تعویق می اندازند [۴]. اثر طعم می تواند به عنوان یک مشکل در محصولات اثر اولیه آنها کاهش یافته است مطرح شود. در این محصولات اثر اولیه طعم کاهش می یابد تا هنگامی که ناگهان محو می شود. امولسیفایرها می توانند این مشکل را با طولانی کردن اثر طعم حل کنند. صمع ها نیز به دلیل توانایی در تشکیل ژل، افزایش ویسکوزیته و قدرت ثابتی کنندگی، امولسیون کنندگی و حجم دهنده گی برای این منظور انتخاب شدند و محققین معتقدند که صمع ها می توانند جایگزین خوبی برای چربی باشند و میزان از دست رفتن آب را کاهش و باعث تاخیر در پدیده ی بیاتی شوند [۵]. رفتار جریانی سلولز میکرو کریستاله شbahat زیادی به امولسیون روغن در آب دارد. افزودن درصد کمی از این صمع برای کاهش روغن، ویژگی های یک ژل تیکسوتروپیک را ایجاد می کند که مشابه امولسیونی است که روغن زیادی دارد. علاوه بر این سلولز میکرو کریستاله یک حالت خامه ای و کدری شبیه محصولات پر چرب ایجاد می کند. ایزوله ی پروتئین آب پنیر هم یکی از جایگزین های ارزان چربی است که به طور وسیعی در محصولات صنایع پخت کاربرد دارد و

۱- مقدمه

محصولات تهیه شده از آرد گندم یکی از پر مصرف ترین مواد غذایی را در تمام جهان شامل می شوند. در این میان کیک ها محبویت ویژه ای دارند و در نزد مردم به عنوان غذایی خوشمزه، دلپذیر و با ویژگی های حسی ویژه تلقی می شوند. آرد، روغن، شکر و تخم مرغ اجزای اصلی در تهیه کیک هستند که هر کدام یک نقش کاربردی مهم را در ویژگی های ساختمند و کیفی محصول ایفا می کنند. کیک ها ممکن است بین ۲۵-۱۰۰ درصد وزن آرد دارای چربی باشند. در سال های اخیر افزایش سریع و پیش رونده بیماری های قلبی و عروقی، لروم استفاده از مواد غذایی کم چرب یا حتی بدون چربی را نمایان می سازد. هر گرم چربی ۹ کیلو کالری انرژی تولید می کند. همچنین تخم مرغ به دلیل اینکه دارای کلسترول بالایی است می تواند خطری جدی برای افراد مبتلا به بیماری قلبی به همراه داشته باشد. با توجه به ارزش غذایی کیک که از نظر کالری می تواند تامین کننده ی قسمتی از انرژی روزانه باشد و همچنین عمومیت مصرف آن بین اقسام مختلف و منحصر نبودن این محصول به یک گروه سنی، جایگاه بسیار خوبی را برای مصرف دارد. لذا توجه به سلامت کیک و کاهش چربی و کلسترول و تبدیل آن به غذایی قابل استفاده برای تمام افراد جامعه حتی افرادی که تحت رژیم های غذایی و درمانی خاص هستند اهمیت پیدا می کند. تخم مرغ به دلیل داشتن قابلیت منحصر به فرد کف کنندگی، امولسیون کنندگی، ویژگی انعقاد حرارتی پروتئینهاش، هوادهی و ورآورندگی، نقش مهمی را در ویژگی های رئولوژیکی و کیفی خمیر و محصول نهایی (کیک) دارد. چربی های تخم مرغ که اغلب از نوع اشباع هستند نقش مهمی را در ویژگی های کیفی و حسی خمیر و یک بر عهده دارند. نقش عمدی این چربی ها به دام انداختن هوا و تولید حبابهای تقریباً بزرگ هوا در خمیر است که باعث انبساط خمیر و کیک در هنگام پخت و تولید کیک با حجم بیشتر و دانسیته ی کمتر و ایجاد حالت اسفنجی در کیک می شود. به علاوه چربی موجب تردی شده و افزایش چربی باعث افزایش قابلیت انعطاف می شود [۱،۲]. زرده ی تخم مرغ منع غنی لسیتین است که یک امولسیفایر است. وقتی آلموین تخم مرغ به شدت زده می شود کف کرده و حجم آن ۶ تا ۸ برابر افزایش می یابد. از طرفی چون در تهیه ی کیک از آرد های کم پروتئین و ضعیف

درجه سانتی گراد پخت شدند. بعد از پخت کیک ها به مدت ۳۰ دقیقه در دمای اتاق نگهداری شدند و سپس از قالب خارج شدند. سپس کیک ها بسته بندی شده و در شرایط یکسان نگهداری شدند و مورد آزمون های مختلف قرار گرفتند. با توجه به مطالب فوق شش تیمار به صورت زیر خواهیم داشت: الف - زاندان ۰/۵ درصد - GMS ۰/۵ درصد. (بر اساس وزن آرد)

ب - HPMC ۰/۵ درصد - GMS ۰/۵ درصد.

ج - سلولز میکروکریستاله (MCC) ۰/۵ درصد - GMS ۰/۵ درصد.

د - زاندان ۰/۵ درصد - SSL ۰/۵ درصد.

و - HPMC ۰/۵ درصد - SSL ۰/۵ درصد.

ه - MCC ۰/۵ درصد - SSL ۰/۵ درصد.

۲-۱-۲- اندازه گیری دانسیته و ویسکوزیته خمیر کیک

دانسیته خمیر کیک در دمای $20\pm2^{\circ}\text{C}$ با استفاده از تقسیم وزن قسمتی از خمیر بر وزن آب هم حجم آن محاسبه شدند. ویسکوزیته خمیر مطابق روش کیم و واکر (۱۹۹۲) [۷] با استفاده از ویسکومتر Model DV-III, Stoughton, Brookfield MA, USA محاسبه شد. ۱۰۰ گرم خمیر کیک به یک بشر منتقل شد به طوری که بشر لبریز از خمیر باشد. از محور شماره ۷ و با سرعت ۲۰ دور در دقیقه استفاده شد. تمام آزمایش ها در دمای ثابت $20\pm2^{\circ}\text{C}$ انجام شد.

۲-۳-۲- اندازه گیری حجم و سفتی کیک

حجم کیک های حاصل با استفاده از روش تغییر مکان (جابجایی) دانه کلزا محاسبه شدند. میزان سفتی بافت مغز کیک با استفاده از دستگاه تکسچر آنالایزر مدل texture analyzer (Texture Analyzer, CNS Famell) اندازه گیری شد. در این روش میزان نیروی لازم برای فشردن کیک تا یک حجم مشخص با شرایط زیراندازه گیری شد: ضخامت نمونه یک اینچ، سل بارگذاری ۵ کیلو گرم، سرعت پایین آمدن سل ۱۰۰ mm/min و قطر پلانگر ۳۵ میلیمتر (American Association of Cereal Chemists, 2000)

۲-۴- ارزیابی حسی

ارزیابی حسی توسط گروهی از دانشجویان و استادان گروه علوم و صنایع غذایی و به صورت تست هدونیک انجام گرفت. در این ارزیابی پارامترهای رنگ قشر کیک، شکل

خواص و عملکرد متنوع و مشابه چربی نظیر تشکیل ژل، تشکیل امولسیون، جذب آب، ناروان کردن و چسبندگی را از خود نشان می دهد و خصوصیات پخت، عطر، مزه، حجم نان و خواص فیزیکی و رئولوژیکی خمیر را نیز بهبود می بخشد [۳]. هدف از این تحقیق استفاده از سه صمع سلولز میکروکریستاله (MCC)، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز (HPMC) و زاندان، دو امولسیفایر گلیسرول منو استارتارات (GMS) و سدیم استاریل لاتکتیلات (SSL) و همچنین ایزوله پروتئین آب پنیر به عنوان جایگزین برای تخم مرغ و چربی اشباع در فرمولاژیون خمیر کیک است. در این تحقیق تاثیر مواد مذکور بر دانسیته و ویسکوزیته خمیر، حجم، بافت و خواص حسی کیک را مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

۲- مواد و روشها

۲-۱-۲- مواد و تهیه کیک

در این تحقیق آرد با درجه استخراج ۷۷ درصد از کارخانه آرد فرشته بابل تهیه شد. این آرد حاوی ۱۱ درصد پروتئین، ۰/۹۳ درصد خاکستر و ۳۱ درصد گلوتن مرطوب بود [۶]. هیدروکلرید زاندان، سلولز میکروکریستاله و هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، ۲ نوع امولسیفایر گلیسرول منو استارتارات و سدیم استاریل لاتکتیلات و ایزوله پروتئین آب پنیر (WPI) از شرکت کاراگام پارسیان خردباری شدند. شکر، روغن نباتی جامد، وانیل و بیکینگ پودر از فروشگاههای شهر آمل تهیه شد و تخم مرغ تازه نیز یک روز قبل از تولید روزانه کیک های تهیه و در یخچال نگهداری می شد. از فرمول زیر برای تهیه کیک استفاده شد. آرد گندم ۱۰۰ گرم، شکر ۶۰ گرم، شیر خشک ۵ گرم، بیکینگ پودر ۲ گرم، وانیل ۲/۱ گرم، آب پنیر ۰/۵ گرم و ایزوله پروتئینی آب پنیر ۰/۵ گرم. در نمونه شاهد (بدون هیدروکلریدها، امولسیفایر و WPI) از ۴۰ گرم تخم مرغ تازه و ۴۰ گرم روغن گیاهی هیدروژنه استفاده شد. با توجه به مطالعه تحقیقات مشابه انجام شده و همچنین توصیه شرکت های تولید کننده افزودنی های مذکور، هیدروکلریدها، امولسیفایرها و ایزوله پروتئینی آب پنیر به مقدار ۵ درصد وزن آرد اضافه شدند. خمیر کیک به درون قالب های مخصوص انتقال یافت و سپس در تنور در دمای ۲۰۰-۲۲۰

۱-۳- تاثیر هیدروکلورئیدها و گلیسرول منواستئارات (GMS) بر خواص فیزیکی و حسی کیک

اثرگذاری هیدروکلورئیدها و امولسیفایر GMS در جدول یک نشان داده شده است. اضافه کردن هیدروکلورئیدها ویسکوزیته خمیر را افزایش می دهد. در میان هیدروکلورئیدها زانتان بیشترین تاثیر را داشت و بعد از آن سلولز میکروکریستاله (MCC) و هیدروکسی پروپیل متیل سلولز (HPMC) قرار گرفتند. این تاثیر می تواند به خاطر ساختمان منحصر بفرد میله مانند (rod-like) زانتان باشد که نسبت به ساختمان مارپیچ تصادفی به نیروی برش حساس تر است.

سطحی کیک، رنگ مغز کیک، طعم کیک، بافت کیک و امتیاز نهایی مورد اندازه گیری قرار گرفت. در این ارزیابی از مقایسه نقطه ای هدونیک استفاده شد به طوری که عدد یک نشان دهنده خیلی متفاوت و عدد ۵ نشان دهنده خیلی دوست دارم بود.

۲-۵- آنالیز آماری

داده های به دست آمده از ۶ تیمار ذکر شده در قالب طرح کاملاً تصادفی و ۳ تکرار توسط آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل شدند. سپس تفاوت آماری بین گروه های آزمایشی توسط ازمون دانکن سنجیده شد.

۳- نتایج و بحث

جدول ۱ تاثیر هیدروکلورئیدها و گلیسرول منواستئارات بر خواص فیزیکی کیک

ویژگیهای فیزیکی کیک	نمونه	ویسکوزیته خمیر (cp)	خمیر	جرم حجمی	حجم کیک (cm ³)	سفتی کیک	force/g
شاهد	Xanthan + GMS	۲۴/۸ ^c	۰/۹۸ ^c	۸۰۰ ^a	۷۴۰ ^c		
	HPMC +GMS	۳۱/۵ ^a	۱/۱۳ ^a	۶۱۰ ^c	۸۹۰ ^a		
	MCC + GMS	۲۷/۹ ^b	۱/۰۷ ^b	۷۷۰ ^{ab}	۸۱ ^b		
		۲۹/۷ ^b	۱/۰۸ ^b	۶۳۰ ^{bc}	۸۰۰ ^b		

مقادیر میانگین سه تکرار بوده و حروف متفاوت در هر ستون نشان دهنده اختلاف معنی دار در سطح پنج درصد می باشند

در طی مخلوط کردن خمیر به درون آن وارد می شوند نقش دارند. در کیک داشتن جرم حجمی کم برای خمیر کیک مطلوب است و نشان می دهد که هوای بیشتری به درون خمیر وارد شده است. جدول یک نشان می دهد که هیدروکلورئیدها جرم حجمی خمیر را افزایش دادند. این نتایج نشان می دهد که خمیرهای حاوی هیدروکلورئید سنگین تر بودند و به خوبی نتوانستند هوادهی شوند. چربی یا روغن یکی از اجزای اصلی و مهم در فرمولاسیون کیک هستند. چربی در به دام انداختن هوا در طی مرحله کرم کردن نقش اساسی دارد و باعث هوادهی و بنابراین ورآوردن خمیر می شود. چربی همچنین در ایجاد طعم مطلوب و بافت نرمتر نقش دارد. اکثر انواع کیک ها برای توسعه ساختمان ویژه نیاز به مقدار بالایی چربی دارند.

حجم کیک در بین نمونه های حاوی هیدروکلورئید نسبت به نمونه شاهد کاهش یافت. اما نمونه حاوی HPMC حجم بهتری نسبت به نمونه های دیگر داشت. این اختلاف در بین هیدروکلورئیدها را می توان به تفاوت در خواص دی الکتریکی

ایونی و همکاران (۱۳۸۶) [۸] نشان دادند که با افزایش مقدار صمغ های گوار و زانتان قوام خمیر افزایش می یابد. اثر متقابل سطوح جایگزینی کنسانتره پروتئینی آب پنیر (WPC) و سطوح هریک از صمغ ها بر قوام خمیر نیز معنی دار بود. در تمامی سطوح جایگزینی WPC با افزایش سطح هر یک از صمغ های گوار و زانتان قوام خمیر افزایش یافت. توانایی جذب سریع و بالای آب توسط صمغ های بکاررفته از دلایل عمدۀ این امر می باشد. نتایج تحقیقات پرنل و همکاران بر روی مقایسه خصوصیات کیک های آنژل تولید شده با پروتئین سفیده تخم مرغ و ایزوله پروتئینی آب پنیر (WPI) نشان داد که با افزایش سطح WPI در فرمولاسیون خمیر و همچنین با افروده صمغ به خمیر بر میزان قوام و ویسکوزیته خمیر افروده می شود. نتایج تحقیقات لی و هاسنی (۱۹۸۲) [۹] نیز نشان داد که با افروden صمغ زانتان به خمیر کیک ، ویسکوزیته خمیر افزایش می یابد. جرم حجمی خمیر کیک یک ویژگی فیزیکی مهمی است، چونکه در حفظ جباب های کوچکی که در آغاز

می دهد [۱۵]. طبق گزارشات گاردا و همکاران (۲۰۰۴) [۱۰]، نانهای حاوی هیدروکلولئید اتلاف آب کمتری داشتند و در نتیجه سرعت خشک شدن کمتری در طی نگهداری داشتند. گومز و همکاران (۲۰۰۶) [۱۶] پیشنهاد کردند که تاثیر هیدروکلولئید بر حجم کیک به دلیل افزایش ویسکوزیته خمیر است که در تغییر سرعت انتشار گاز درون خمیر تاثیر گذاشته و به نگهداشتن گاز در طی مراحل اول پخت کمک می کند. ویسکوزیته پایین تر خمیر در طی پخت یکی از دلایل کاهش حجم محصول است. اگر ویسکوزیته خمیر خیلی کم باشد، CO_2 تکامل یافته و بخار آب تولید شده در سلول های هوا در طی پخت به دام نخواهد افتاد، در نتیجه حجم کیک حاصل کم خواهد شد. همانطور که در جدول نشان داده شده است، کیک های بدون چربی و تخم مرغ سفتی بیشتری نسبت به نمونه شاهد داشتند، گرچه این تفاوت در سطحی در مورد HPMC معنی دار نبود. HPMC فیلم های بین سطحی در مرز سلول های گازی تشکیل می دهد که در نتیجه باعث پایداری این سلول ها در مقابل انبساط گاز و تغییر در شرایط فرآوری خواهد شد. ارزیابی حسی کیک های حاوی هیدروکلولئیدهای مختلف در جدول ۲ آمده است. نتایج نشان می دهد که نمونه های حاوی زانتان نتوانستند نتایج مناسبی را ارائه دهند. در بین کیک های بدون چربی و تخم مرغ HPMC توانست امتیاز کلی بیشتری کسب کند. استفاده از HPMC رنگ مغز کیک را بهبود بخشید و MCC توانست در مورد شاخص بافت امتیاز بیشتری را کسب کند.

هیدروکلولئیدهای مختلف نسبت داد. به نظر می رسد دلیل اصلی کاهش حجم کیک بالا بودن جرم حجمی خمیرها بوده است. HPMC تاثیر بهبود دهنده ای بر روی حجم و سفتی مغز نان دارد [۱۰]. این خواص هیدروکلولئیدها به گروه های هیدروکسیل در ساختمان آنها نسبت داده می شود، این گروهها از طریق پیوند هیدروژنی با آب برهم کش می دهند. آنها قادرند آب را جذب کرده و حفظ کنند و از کریستالیزاسیون آمیلوبکتین جلوگیری کنند [۱۱]. اختلاف در تاثیر هیدروکلولئیدها می تواند به اختلاف در ساختمان شیمیایی و خواص عملکردی آنها نسبت داده شود. زانتان می تواند از طریق تشکیل یک برهم کنش قوی با پروتئین آرد باعث قوی تر شدن آرد شود [۱۲]. اتری شدن گروههای هیدروکسیل در سلولز توسط گروههای متوكسیل و هیدروکسی پروپیل حلالیت آنرا در آب افزایش می دهد و همچنین تمایل به فاز غیرقطبی را در خمیر ایجاد می کند. بنابراین دریک سیستم چند فاز مانند خمیر، این رفتار دوگانه به خمیر این اجازه را می دهد تا یکنواختی خود را حفظ کرده و پایداری امولسیون در طی پخت را حفظ کند [۱۳]. شبکه ای که HPMC در طی پخت تشکیل می دهد به عنوان مانعی برای انتشار گاز عمل کرده و این امر از دست رفتن بخار آب را کاهش داده و در نتیجه باعث نرمی بافت محصول می شود [۱۴]. تاثیر نرم کنندگی هیدروکلولئیدها و عدم توانایی HPMC را می توان به توانایی نگهداشتن آب نسبت داد. علاوه بر این HPMC ترجیحاً با نشاسته پیوند داده و برهم کنش های نشاسته - گلوتن را کاهش

جدول ۲ تاثیر هیدروکلولئیدها و گلیسرول متواسترات بر خواص حسی کیک

MCC + GMS	HPMC + GMS	Xanthan + GMS	شاهد	نمونه	ویژگیهای حسی
۴ ^b	۴ ^b	۳/۱ ^c	۴/۵ ^a	رنگ قشر کیک	
۳/۷ ^b	۳/۷ ^b	۳/۲ ^c	۴/۱ ^a	شكل سطح کیک	
۳/۰ ^b	۳/۷ ^b	۳/۱ ^c	۴/۱ ^a	رنگ مغز کیک	
۳ ^b	۳/۹ ^a	۳/۱ ^b	۳/۹ ^a	طعم کیک	
۳/۵ ^b	۴ ^a	۲/۳ ^b	۴/۳ ^a	بافت کیک	
۳/۷ ^b	۳/۸ ^b	۳/۵ ^b	۴/۴ ^a	امتیاز نهایی	

مقادیر میانگین سه تکرار بوده و حروف متفاوت در هر ردیف نشان دهنده اختلاف معنی دار در سطح پنج درصد می باشد.

فیزیکی کیک های بدون چربی و تخم مرغ در جدول ۳ نشان داده شده است. نتایج نشان می دهد که اضافه کردن هیدروکلوریکها باعث افزایش ویسکوزیته خمیر می شود. زانتان بیشترین تاثیر را در این مورد داشت و بعد از آن HPMC و MCC قرار داشتند.

جدول ۳ تاثیر هیدروکلوریکها و استاریل لکتیلات بر خواص فیزیکی کیک

<i>force/g</i>	softness (cm ³)	حجم کیک	$\frac{g}{cc}$	جرم حجمی خمیر	ویسکوزیته خمیر (cp)	نمونه	ویژگیهای فیزیکی کیک
۷۴ ^c	۸۰. ^a		۰/۹۸ ^c		۲۶/۸ ^c	شاهد	
۸۷۰ ^a	۶۹. ^c		۱/۱۱ ^a		۳۰/۴ ^a	Xanthan + SSL	
۷۸۵ ^b	۷۶۷ ^{ab}		۱/۰۳ ^b		۲۷/۷ ^b	HPMC + SSL	
۸۱۵ ^b	۷۲۹ ^b		۱/۰۶ ^b		۲۹ ^a	MCC + SSL	

مقادیر میانگین سه تکرار بوده و حروف متفاوت در هر ستون نشان دهنده اختلاف معنی دار در سطح پنج درصد می باشدند نشاسته را می پوشاند. کیم و همکاران (۱۹۹۹) [۱۸] بیان کردند که اضافه کردن اسید آسکوربیک و SSL یک ساختمان مدام از خمیرنان ایجاد می کند. آنها همچنین گزارش دادند که در ریز ساختمان، رشتہ ها مستحکم شدند و بین گرانولها و پروتئین ها یک برهمکنش وجود داشت. سفتی مغز کیک های نمونه شاهد ۷۴۰ گرم بود. این مقدار در کیک های بدون چربی و تخم مرغ افزایش نشان داد و در مورد زانتان به ۸۷۰ MCC و HPMC به ۷۸۵ رسید. کاهش در میزان سفتی کیک های حاوی HPMC نشان دهنده بهبود بافت کیک های بدون چربی و تخم مرغ است. جدول ۴ نتایج حاصل از ارزیابی حسی کیک های حاوی هیدروکلوریک های مختلف همراه با امولسیفایر SSL را نشان می دهد.

جدول ۴ تاثیر هیدروکلوریکها و استاریل لکتیلات بر خواص حسی کیک

MCC + SSL	HPMC + SSL	Xanthan + SSL	شاهد	نمونه	ویژگی های حسی
۴ ^b	۴ ^b	۳/۱ ^c	۴/۵ ^a	رنگ قشر کیک	
۳/۹ ^a	۳/۹ ^a	۳/۴ ^b	۴/۱ ^a	شكل سطح کیک	
۳/۷ ^b	۳/۸ ^b	۳/۴ ^c	۴/۱ ^a	رنگ مغز کیک	
۳/۱ ^b	۴ ^a	۳/۱ ^b	۳/۹ ^a	طعم کیک	
۳/۵ ^b	۴/۱ ^a	۳/۶ ^b	۴/۳ ^a	بافت کیک	
۳/۸ ^c	۴ ^b	۳/۸ ^c	۴/۴ ^a	امتیاز نهایی	

مقادیر میانگین سه تکرار بوده و حروف متفاوت در هر ردیف نشان دهنده اختلاف معنی دار در سطح پنج درصد می باشدند

- emulsifiers in high-ratio cake model systems. *Cereal Chemistry*, 69, 206–212.
- [8] Ayoubi, A., Habibi Najafi, M.B., Karimi, M. 1387. Effect of whey protein concentrate , guar and xanthan gums on the quality and physicochemical properties of muffin cake. *Journal Of Iranian Food Science and Technology*. 34-46
- [9] Lee, C. C., & Hoseney, R. C. (1982). Optimization of the fat-emulsifier system and the gum-egg white-water system for a laboratory-scale single-stage cake mix. *Cereal Chemistry*, 59, 392–395.
- [10] Guarda , A., Rossel ,C. M., Benedito, C., and Galotto, M. J. 2004. Different Hydrocolloids as bread improvers and antistaling agents. *Food Hydrocolloids*
- [11] Barcenas, M. E., and C. M. Rosell. 2005. Effect of HPMC addition on the microstructure, quality and aging of wheat bread. *Food Hydrocol.* 19: 1037-1043--. Coffey, D. G., D. A. Bell, and A.
- [12] Rosell, C. M., Rogas. J. A., and Benedito, C. B. 2001b. Combined effect of different antistaling agents on the pasting properties of wheat flour. *European Food Research and Technology*, 212, 473- 476
- [13] Bell, D. A. (1990). Methylcellulose as structure enhancer in bread baking. *Cereal Foods World*, 35, 1001–1006.
- [14] Rosell, C. M., Rogas. J. A., and Benedito, C. B. 2001a. Influence of hydrocolloids on dough rheology and bread quality. *Food Hydrocolloids*. 15: 75 – 81
- [15] Collar, C., Andreu, P., Martinez, J.C., and Armero, E. 1999. Optimization of hydrocolloid addition to improve wheat bread functionality: a response surface methodology study. *Food Hydrocolloids*, 13, 467-475.
- [16] Gomez, M., Ronda, F., Caballero, P. A., Blanco, C. A., & Rosell, C. M. (2006). Functionality of different hydrocolloids on the quality and shelf-life of yellow layer cakes. *Food Hydrocolloids*, 21, 167–173.
- [17] Evans, L. G., Volpe, T., & Zabik, M. E. (1977). Ultrastructure of bread dough with yeast single cell protein and/or emulsifier. *Journal of Food Science*, 42, 70–74.
- [18] Kim, C. S., Lee, S. A., & Kim, H.-I. I. (1999). Development of buck wheat bread III. Effects of the thermal process of dough making on baking properties. *Journal of Food Science & Nutrition*, 4, 6–13.

۴- نتیجه گیری

اضافه کردن هیدروکلولئیدها به طور متفاوتی بر روی ویژگی های خمیر آرد گندم و کیک حاصل از آن تاثیر گذاشت. افرودن هیدروکلولئیدها ویسکوزیته خمیر را افزایش داد و زاندان بیشترین ویسکوزیته خمیر را نشان داد. استفاده از HPMC رنگ مغز کیک را بهبود بخشدید و MCC توانست در مورد شاخص بافت امتیاز بیشتری را کسب کند. در میان هیدروکلولئیدهای متفاوت HPMC از همه بهتر بود و نسبت به بقیه هیدروکلولئیدها باعث بهبود بیشتر کیفیت کیک شد. نتایج ارزیابی حسی نشان داد که امولسیفار SSL بهتر از GMS بود. نتایج ارزیابی حسی نشان داد که نمونه های حاوی زاندان نتوانستند ارزیابی های مناسبی را ارائه دهند. می توان نتیجه گرفت که نتایج مختلف این تحقیق نشان دادند با استفاده از WPI ، HPMC و SSL می توان کیک بدون چربی و تخم مرغ با کیفیت نسبتاً خوبی تولید کرد.

۵- منابع

- [1] Barcenas, M. E., Benedito, C., and Rosell, C. M. 2004. Use of hydrocolloids as bread improvers in interrupted baking process with frozen storage. *Food Hydrocolloids*, 18, 769– 774
- [2] Miller, R. A., and Hoseney, R. C. 1993. The role of xanthan gum in white layer cakes. *Cereal Chem.*70(5): 585-588
- [3] Miller, R. Z., and Setser, C. 1982. Xanthan gum in a reduced-egg-white angel food cake. *Cereal Chem.* 60(1): 62-64
- [4] Ashwini, A. Jyotsna, R. Indrani, D. 2009. Effect of hydrocolloids and emulsifiers on the rheological, microstructural and quality of eggless cake. *Food Hydrocolloids*, 23, 700- 707.
- [5] Glicksman, M. 1982. *Food hydrocolloids*. CRC press, Florida. Lucca, P. A., and Tepper, B. J. 1994. Fat replacers and the functionality of fat in foods. *Trends in Food Science and Technology*, 5, 12–19.
- [6] American Association of Cereal Chemists (AACC). (2000). Approved methods moisture (44-15), ash (08-01), gluten (38-10), Zeleny's sedimentation value (56-60), falling number (56-81B), amylograph (22-10). St. Paul, MN.
- [7] Kim, C. S., & Walker, C. E. (1992). Interactions between starches, sugars, and

Effect of some hydrocolloids and emulsifiers on the rheological and sensory characteristics of dietary cake

Ariaei, P. ^{1*}, Ghanbari, M. ¹, Abdollah por, M. ¹

1. Department of Food Science and Technology, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran
(Received: 93/2/18 Accepted: 94/4/19)

In this study egg and saturated fat were eliminated from cake formulation and microcrystalline cellulose (MCC), hydroxypropylmethylcellulose (HPMC), xanthan, whey protein isolate (WPI), glycerol monostearate (GMS) and sodium stearoyl-2-lactylate (SSL) were used as replacement. Effect of mentioned ingredient on the batter viscosity, density, cake volume and sensory scores was studied. Addition of hydrocolloids to wheat flour in the presence of SSL and GMS increased cake batter viscosity and density and xanthan showed the highest value followed by MCC and HPMC. Batter with hydrocolloids was heavier and lacks the proper aeration. Sensory evaluation of cakes with different hydrocolloids showed that the use of xanthan decrease quality scores and samples with HPMC received the highest quality scores. Use of HPMC improved crumb color and MCC improved cake texture. Results of this study indicated that some of hydrocolloids in combination with emulsifiers and WPI can be a good substitution for egg and saturated fat in cake formulation.

Key words: Hydrocolloids , Emulsifiers , Rheological , Sensory characteristics ,Dietary cake

* Corresponding Author E-Mail Address: p.aryaye@yahoo.com