

بررسی اثر ضدمیکروبی نانوآنکپسول های حاوی نایسین و ناتامایسین بر رشد استافیلوكوس اورئوس و آسپرژیلوس نایجر

محسن ضیایی^۱، محمود صوتی خیابانی^۲، سمیرا تیز چنگ^{۳*}، بابک قنبرزاده^۴،
حامد همیشه کار^۵، رضا رضایی مکرم^۶

۱- دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد، گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز

۲- دانشیار گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز

۳- دانشجوی دکتری گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز

۴- استاد گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز

۵- دانشیار مرکز تحقیقات کاربردی و دارویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز

(تاریخ دریافت: ۹۳/۱۱/۲۴ تاریخ پذیرش: ۹۴/۲/۱۹)

چکیده

نایسین و ناتامایسین به عنوان ماده ضدمیکروبی در صنایع غذایی و داروئی کاربردهای متعددی دارند. در فرم آزاد، به دلیل واکنش با قند احیاء کننده و به طور غیراختصاصی با باند شدن بر لبیدها و بروتین‌ها خاصیت ضدمیکروبی و ضد قارچی آنها کاهش می‌یابد. برای غلبه بر این محدودیت، درون پوشانی نایسین و ناتامایسین با استفاده از لیپوزوم‌ها گزارش شده است. هدف این کار پژوهشی، بررسی اثر ضدمیکروبی و ضد قارچی نانوآنکپسول‌های حاوی نایسین و ناتامایسین بر رشد استافیلوكوس اورئوس و آسپرژیلوس نایجر است. در این تحقیق، نانولیپوزوم‌های حاوی نایسین و ناتامایسین به روش مظرفی تولید شدند. پس، اندازه ذرات، درصد انکپسولاسیون و خصوصیات ضد میکروبی و ضد قارچی نایسین و ناتامایسین به صورت آزاد و انکپسوله شده در دمای ۸ و ۲۵ درجه سانتی‌گراد مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد اندازه ذرات و توزیع اندازه ذرات بترتیب در محدوده ۷۶ nm تا ۹۰ nm و ۰/۹ تا ۰/۷۳ nm درصد درون پوشانی نایسین و ناتامایسین به ترتیب در محدوده ۸۵ تا ۹۲ درصد و ۸۹ تا ۹۶ درصد است و نتایج حاصل از فعالیت ضدمیکروبی و قارچی نشان داد، استفاده از فرم انکپسوله شده مواد ضدمیکروبی، استفاده از ترکیبی از باکتریوسین‌ها و دمای پایین نگهداری تاثیر بیشتری بر کاهش جمعیت میکروبی و قارچی داشته است. در این تحقیق نانولیپوزوم‌ها به طور موفقیت آمیزی با روش مظرفی تولید شدند. این روش از نظر انکپسولاسیون نایسین و ناتامایسین و ارزیابی خصوصیات ضد میکروبی و ضد قارچی روش مناسبی بوده است.

کلید واژگان: نایسین، ناتامایسین، نانولیپوزوم، اثر ضدمیکروبی، روش حرارتی

*مسئول مکاتبات: stizchang@yahoo.com

و سویسین به صورت افزودن مستقیم، اسپری کردن و غوطه وری استفاده می شود [۸]. هاندرو دیمو و همکاران [۹]، اثر ناتاما یسین را به عنوان عامل کنترل رشد فارچی در طی تخمیر زیتون بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که وجود ناتاما یسین در محلول نمکی، موجب کنترل رشد مخمرها می شود. استفاده از باکتریوسین ها به صورت آزاد به علت برهمکنش آنها با ترکیبات مواد غذایی موجب کاهش قدرت ضد میکروبی آنها شده و در نتیجه احتیاج به دوزهای بالایی از این ترکیبات می باشد. استفاده از نانولیپوزوم های حاوی ترکیبات ضد میکروبی، یک روش مناسبی است و می تواند مشکلات استفاده از ترکیبات ضد میکروبی به صورت مستقیم در مواد غذایی را کاهش دهد. لیپوزوم ها اجزاء کروی متشکل از لیپیدهای قطبی (مثل فسفاتیدیل کولین و یا فسفاتیدیل اتانول آمین) و یا مخلوطی از چربی های قطبی همراه با کلسترول یا ارگسترون هستند [۱۰، ۱۱]. لیپوزوم ها به دلیل ساختار آمفی فیلیک خود، قادرند ترکیبات آب دوست را در فضای درونی و ترکیبات چربی دوست را در بین غشا لیپوفیلیک، نگهداری کنند [۱۲]. در پژوهشی که بنج و همکاران بر روی پنیر چدار با تلقیح لیستریا ایناکوا با جمعیت در حدود $10^6 - 10^7$ cfu/g و غلظت نایسین ۳۰۰ IU/g به صورت آزاد و میکرو پکسوله انجام دادند، پس از شش ماه نگهداری پنیر، فعالیت نایسین به فرم میکرو پکسوله تا ۹۰٪ حفظ شده و جمعیت نهایی پس از شش ماه به 10^6 cfu/ml رسید همچنین در مدت ۲ماه، کاهش جمعیت لیستریایی در مقیاس لگاریتمی برابر ۳ بود [۵]. با توجه به معایب استفاده از ترکیبات ضد میکروبی به صورت آزاد و همچنین به دلیل اینکه تاکنون از نایسین به همراه ناتاما یسین در بررسی خصوصیات ضد میکروبی استفاده نشده است، در این تحقیق اثرات ضد میکروبی نایسین و ناتاما یسین به صورت توأم و جداگانه، به دو فرم آزاد و نانولیپوزومی (تولید شده به روش مظفری) در دماهای مختلف نگهداری، مورد بررسی قرار می گیرد.

۲- مواد و روش ها

۲-۱- مواد

مواد مورد استفاده در این تحقیق شامل: لیستین (با نام تجاری، Al- آلفا- لستین با درجه خلوص ۹۹٪ از شرکت Across

۱- مقدمه

ایمنی مواد غذایی به یک نگرانی بین المللی تبدیل شده است و از طرفی، اکثر مصرف کنندگان تمایل به استفاده از غذاهای با کیفیت بالا و عدم استفاده از نگهدارنده های شیمیایی و سنتزی در ترکیبات غذایی را دارند. یکی از روش های رسیدن به این اهداف، استفاده از ترکیبات ضد میکروبی طبیعی از جمله باکتریوسین ها^۱ می باشد [۱]. نایسین^۲ یکی از شناخته ترین و پر کاربرد ترین باکتریوسین ها است. نایسین از کشت های استارتی باکتری، لاکتوکوکوس لاکتیس در محصولات لبنی تولید می شود و دارای خصوصیاتی از قبیل: آمفی فیلیک بودن، غیر سمی و بی ضرر بودن برای انسان، قابلیت نفوذ در غشاء باکتری ها و غیره می باشد [۴، ۲، ۳]. نایسین با ایجاد شکاف در غشای سلولی باکتری های گرم مثبت باعث ترشح مواد سیتوپلاسمی به خارج و از بین رفتنه آنها می شود. این ترکیب دارای خاصیت ممانعت کنندگی از رشد، باکتری های گرم مثبت (پاتوژن ها و آلوده کننده های مواد غذایی)، میکرو ارگانیسم های مولد فساد و برخی از باکتری های گرم منفی (که دچار آسیب در غشا شده اند) همچنین قادر به جلوگیری از جوانه زنی اسپورها، می باشد. مطالعات نشان داده است که نایسین قادر به جلوگیری از رشد و تشکیل آندوسپورها در جنس های مختلف کلستریدیوم و باسیلوس است. همچنین از رشد گونه های لیستریا منو سیتوژن و استافیلوکوکوس اورئوس نیز جلوگیری می کند [۶ و ۵]. در تحقیقی که وری و همکاران [۷]، در مورد پایداری و تاثیر گذاری نایسین و لیزو زیم انکپسوله شده در لیپوزوم های فسفولیپیدی در مقابل لیستریا مونو سیتوژن انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که نایسین انکپسوله شده در لیپوزوم های ساخته شده از فسفاتیدیل کولین (۱۰٪) و فسفاتیدیل کولین- کلسترول (۷۰٪ به ۳۰٪)، رشد باکتریایی را ۲ سیکل لگاریتمی در مقایسه با نایسین آزاد، بیشتر کاهش داده است. ناتاما یسین^۳ از جمله، باکتریوسین های مهم دیگر است. این ترکیب، یک پلی ان می باشد و بر روی مخمرها و کپک ها کاملاً موثر بوده و حدود چندین سال است که در نوشیدنی ها و بعضی مواد غذایی خاص مانند پنیر، گوشت، آب میوه ها، محصولات نانو ای، ماست، شراب

2. Nisin

3. Natamycin

بافر فسفات ($\text{pH}=5/5$) به آن اضافه شد سپس برای حل شده کامل نایسین، مخلوط روی همزن مغناطیسی (500 rpm) در دمای 40°C قرار گرفت.

۳-۳- تهیه محلول ناتامايسین

جهت تهیه محلول ناتامايسین، $10 \text{ میلی گرم ناتامايسین، } 3\% \text{ گلیسرول (V/V)}$ و $5 \text{ میلی لیتر بافر فسفات (pH=7/4)}$ به آن اضافه شد سپس برای حل شدن کامل ناتامايسین، مخلوط روی همزن مغناطیسی (500 rpm) در دما 40°C قرار گرفت.

۴-۳- تهیه محلول مخلوطی از نایسین و ناتامايسین

برای تهیه این محلول به $5 \text{ میلی گرم نایسین و } 2/5 \text{ میلی گرم ناتامايسین، } 3\% \text{ گلیسرول (V/V)}$ و $3\% \text{ پلی اتیلن گلیکول (V/V)}$ اضافه و سپس برای حل شدن کامل نایسین و ناتامايسین مخلوط، روی همزن مغناطیسی (500 rpm) در دمای 40°C قرار گرفت.

۵- روش تهیه نانولیپوزوم‌ها

لیپیتین هیدراته شده به محلول نایسین، ناتامايسین و یا مخلوطی از این دو، در بشر بافل دار ریخته شد و در بن ماری در دمای 60°C به مدت 10 دقیقه با سرعت 1500 rpm قرار گرفت سپس $42 \text{ میلی لیتر بافر فسفات با pH های } 5/5, 6 \text{ و } 7/4$ به ترتیب برای هر کدام از محلول‌های نایسین، ناتامايسین و مخلوط نایسین و ناتامايسین، اضافه شد و تا 90 دقیقه زیر همزن باقی ماند. فرمولاسیون‌های تهیه شده به مدت 30 دقیقه در دمای اتاق، سپس در دمای 4°C نگهداری شدند [۱۳].

۴- روش‌های آزمون

۴-۱- تعیین اندازه ذرات

تعیین و توزیع اندازه ذرات توسط دستگاه سنجش اندازه‌ی ذرات، انجام شد. اندازه نمونه‌های تهیه شده، بعد از یک ساعت نگهداری در دمای 4°C و متوسط اندازه‌ی ذرات بر اساس قطر حجمی تعیین شد (معادله ۱). تمامی نمونه‌ها در سه تکرار اندازه گیری شدند [۱۵].

آمریکا)، پلی اتیلن گلیکول (Merck، آلمان)، نایسین (Myasan)، ترکیه)، ناتامايسین (DSM، دانمارک)، گلیسرول (با درجه خلوص بالاتر از ۹۹٪، شرکت Merck، آلمان)، دی پتاسیم هیدروژن فسفات (Merck، آلمان) و محیط کشت‌های نوتربینت براث و مانیتول سالت آگار (جهت شمارش باکتریایی)، محیط کشت های سابرووددگستروز براث و سابرووددگستروز آگار (جهت شمارش قارچ)، (شرکت Merck، آلمان).

۲-۲- دستگاه‌ها و تجهیزات مورد استفاده

دستگاه اندازه گیری اندازه ذرات (مدل Sald-2010)، ساخت شرکت Shimadzu، ژاپن، دستگاه همزن برقی (مدل Rer)، ساخت شرکت Avanti ۳۰، Ika، آلمان، دستگاه سانتریفیوژ (مدل Zs)، ساخت شرکت Beckman، امریکا)، دستگاه اتوآنالایزر (Labsoc D-۶۳۶۰)، ساخت شرکت Beckman، امریکا)، دستگاه اسپکتروفوتومتر (مدل Ultrospec ۲۰۰)، ساخت شرکت Pharmacia Biotech، انگلیس)، دستگاه اندازه گیری پتانسیل زتا (مدل Malvem Nano-Zs)، ساخت شرکت HBG، آلمان) و آمیکون (فالکون نوبار (ساخت شرکت Millipore)، آلمان).

۳- روش‌ها

۳-۱- آماده سازی فسفاتیدل کولین

غاظت لیپید مورد نیاز جهت تولید لیپوزوم‌ها، با توجه به تحقیقات که تیزچنگ و همکاران [۱۳]، در بهیته سازی اندازه ذرات و تأثیر متغیرهای مستقل، غاظت فسفولیپید، سرعت همزن و زمان فرآیند بر روی اندازه ذرات انجام دادند، 30 میلی مولار انتخاب شد. در این تحقیق، ابتدا 30 میلی مولار لیپیتین با وزن ملکولی 750 g/mol ، معادل $1/125 \text{ گرم}$ ، با ترازوی حساس توزین شد سپس 4 میلی لیتر آب دو بار تقطیر به آن اضافه شد و در شیکرانکوباتور به مدت یک شبانه روز در دمای 37°C با دور 70 rpm قرار داده شد [۱۴].

۳-۲- تهیه محلول نایسین

جهت تهیه محلول نایسین، ابتدا $10 \text{ میلی گرم نایسین، } 3\% \text{ گلیسرول (V/V)}$ و $3\% \text{ پلی اتیلن گلیکول (V/V)}$ و 5 میلی لیتر

۴-۳-۴- آزمون های میکروبی

۴-۳-۱- بررسی تاثیر نایسین آزاد و لیپوزومی و مخلوط آنها (نایسین و ناتاما نایسین آزاد و لیپوزومی شده) بر جمعیت استافیلکوکوس اورئوس در دماهای مختلف برای انجام آزمون باکتریایی از باکتری استافیلکوکوس اورئوس با رقت 10^8 به ازای هر میلی لیتر و از محیط کشت، نوترینت براث استفاده شد. بدین منظور ابتدا محیط کشت نوترینت براث با باکتری مورد نظر تلقیح و سپس مواد ضد میکروبی به صورت آزاد و لیپوزومی به آن اضافه شد. نایسین و ناتاما نایسین در غلظت های مختلف (۵، ۱۰، ۲۰ ppm) به محیط کشت تلقیح شد سپس تاثیر نایسین آزاد و لیپوزومی، مخلوط نایسین و ناتاما نایسین آزاد و لیپوزومی، مخلوط نسبت ۱ به ۱ نایسین و ناتاما نایسین لیپوزوم شده بر جمعیت استافیلکوکوس اورئوس در زمان و دماهای مختلف بررسی گردید. بدین منظور در زمان های $0, 7, 14, 21, 28$ روز و دماهی نگهداری 8°C و 25°C ، نمونه های تلقیح شده و نمونه شاهد بر روی محیط کشت مانیتول سالت آگار به روش کشت عمقی، کشت انجام شد و هر هفته رشد استافیلکوکوس اورئوس مورد بررسی قرار گرفت.

۴-۳-۲- بررسی تاثیر ناتاما نایسین آزاد و لیپوزومی و مخلوط آنها (نایسین و ناتاما نایسین آزاد و لیپوزومی شده) بر جمعیت آسپرژیلوس نایجر در دماهای مختلف

برای انجام این مرحله از آسپرژیلوس نایجر با رقت 10^8 به ازای هر میلی لیتر و محیط کشت سابرو دگستروز براث استفاده شد. بدین منظور ابتدا محیط کشت موردنظر با سوپسانسیون اسپور آسپرژیلوس نایجر با رقت 10^8 اسپور به ازای میلی لیتر، تلقیح شد سپس ناتاما نایسین آزاد و لیپوزومی، مخلوط نایسین و ناتاما نایسین آزاد و لیپوزومی با غلظت های مختلف (۵، ۱۰، ۲۰ ppm) اضافه گردید و تاثیر ناتاما نایسین آزاد و لیپوزومی، مخلوط نایسین و ناتاما نایسین آزاد و لیپوزومی و مخلوط نسبت ۱ به ۱ نایسین و ناتاما نایسین لیپوزوم شده بر جمعیت آسپرژیلوس نایجر در زمان و دماهای مختلف بررسی گردید. بدین منظور در زمان های $0, 7, 14, 21$ و 28 روز و دماهی نگهداری 8°C و 25°C ، نمونه های تلقیح شده و نمونه شاهد بر روی محیط کشت سابورو دگستروز

معادله (۱)

$$\bar{D}[\text{میانگین}] = \frac{\sum n_i d_i}{\sum n_i}$$

d : قطر ذرات، \bar{D} : میانگین قطر حجمی (میانگین حجم DeBroukere mean معادله)

توزیع اندازه ذرات نیز با استفاده از معادله زیر محاسبه شد [۱۶].

معادله (۲)

$$\text{Span} = \frac{D(90\%) - D(10\%)}{D(50\%)}$$

۴-۲- درصد انکپسولاسیون

جهت اندازه گیری میزان نایسین، ناتاما نایسین و مخلوط نایسین و ناتاما نایسین، محصور شده در فرمولاسیون لیپوزومی، از دستگاه اسپکترو فوتومتر در طول موج 305 نانومتر برای سنجش ناتاما نایسین و برای سنجش نایسین از دستگاه اتو آنالیزر استفاده شد (اسس آزمایش به این صورت است که، پروتئین ها در حضور پیروگالول رد^۱ و مولیدات^۲ تشکیل کمپلکس قرمز رنگ می دهند و رنگ ایجاد شده توسط دستگاه اتو آنالیزر قابل اندازه گیری است [۱۷ و ۱۳]. از آنجایی که نایسین در دستگاه اسپکترو فوتومتر جذب ندارد و ناتاما نایسین در دستگاه اتو آنالیزر قابل تشخیص نیست، بنابراین به راحتی می توان میزان انکپسولاسیون را برای مخلوط نایسین و ناتاما نایسین محاسبه کرد. برای این منظور ابتدا فرمولاسیون لیپوزوم در آمیکون (فالکون فلتردار) ریخته و با استفاده از سانتریفیوژ با سرعت 500 دور در دقیقه به مدت 20 دقیقه، فاز حاوی مواد کپسوله شده در لیپوزومها از مایع شفاف که حاوی مواد غیر کپسوله شده بود، جدا شد سپس میزان انکپسولاسیون نایسین و ناتاما نایسین به ترتیب توسط دستگاه های اتو آنالیزر و اسپکترو فوتومتر محاسبه شد و درصد انکپسولاسیون نیز طبق فرمول زیر محاسبه شد:

معادله (۳)

$$\frac{\text{مقدار نایسین و ناتاما نایسین درون پوشانی}}{\text{مقدار کل نایسین و ناتاما نایسین اضافه شده}} \times 100 = \text{درصد شده در لیپوزوم انکپسولاسیون}$$

4. pyrogallol red
5. molybdate

۱-۶- تعیین اندازه ذرات

نتایج مربوط به اندازه‌گیری قطر متوسط ذرات و شاخص اسپن برای فرمولاسیون‌های مختلف در جدول (۱) آورده شده است.

نتایج نشان داد، تاثیر افرودن پلی‌اتیلن گلیکول (نمونه^(۲)، پلی اتیلن گلیکول به همراه ناتامايسین (نمونه^(۳)) و پلی اتیلن گلیکول به همراه ناتامايسین (نمونه^(۴)) نسبت به فرمولاسیون فسفاتیدیل خالص (نمونه^(۱)) از نظر اندازه ذرات، معنی‌دار است ($P<0.05$) با افرودن پلی‌اتیلن گلیکول (نمونه^(۲)، اندازه ذرات افزایش یافته و سپس اندازه ذرات با افزودن نایسین و ناتامايسین کاهش یافته است. همچنین با توجه به جدول (۱)، توزیع اندازه ذرات (شاخص اسپن)، در فرمولاسیون‌های ۱ تا ۵، تفاوت معنی‌داری نداشته است ($P<0.05$)

جدول ۱ نتایج مربوط به اندازه‌گیری اندازه ذرات و شاخص اسپن برای فرمولاسیون‌های مختلف

نمونه	شاخص اسپن	میانگین قطر حجمی (nm) ^{± انحراف معیار}
۱- فسفاتیدیل کولین خالص	0.773 ± 0.022^a	0.76 ± 0.028^a
۲- فسفاتیدیل کولین و پلی‌اتیلن گلیکول	0.78 ± 0.095^a	0.90 ± 0.33^b
۳- فسفاتیدیل کولین و پلی‌اتیلن گلیکول و نایسین	0.87 ± 0.083^a	0.86 ± 0.04^c
۴- فسفاتیدیل کولین و پلی‌اتیلن گلیکول و ناتامايسین	0.86 ± 0.086^a	0.85 ± 0.038^c
۵- فسفاتیدیل کولین و پلی‌اتیلن گلیکول و مخلوط نایسین و ناتامايسین	0.9 ± 0.051^a	0.81 ± 0.23^d

می‌توان نتیجه گرفت که در همه فرمولاسیون‌ها کاهش چشمگیری در شمارش باکتریایی در همه سطوح ppm^{۵، ۱۰ و ۱۵} مشاهده می‌شود. در نمونه‌های حاوی نایسین آزاد و مخلوط نایسین و ناتامايسین آزاد در زمان صفر کاهش چشمگیری در شمارش باکتریایی مشاهده شد ولی این کاهش در روزهای ۷، ۱۴ و ۲۱ تقریباً ثابت بوده و حتی در روز ۲۸ اندکی افزایش در شمارش باکتریایی مشاهده شد. در نمونه‌های حاوی نایسین لیپوزومی، مخلوط نایسین و ناتامايسین لیپوزومی و مخلوط با نسبت ۱ به ۱ نایسین و ناتامايسین در زمان صفر، کاهش چشمگیری در شمارش باکتریایی مشاهده نشده است ولی با گذشت زمان، کاهش تدریجی در روزهای ۷، ۱۴، ۲۱ و ۲۸ مشاهده شد و هر هفتۀ شمارش باکتریایی نسبت به هفتۀ قبل کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد. این کاهش به طور مداوم در همه روزهای نگهداری مشاهده شد. همچنین در فرمولاسیون‌هایی که در آنها از مخلوط نایسین و ناتامايسین استفاده شده است، نسبت به

آگار به روش کشت سطحی، کشت انجام شد و هر هفته رشد آسپرژیلوس نایجر بر روی محیط کشت، مورد بررسی قرار گرفت.

۵- طرح آماری

آزمون‌ها در سه تکرار و در قالب طرح کاملاً تصادفی، انجام شد. نرم افزار آماری (SPSS 16) در سطح احتمال ۹۵٪ (P<0.05) و آزمون چند دامنه‌ای دانکن برای مقایسه میانگین داده‌ها، استفاده شد.


۶- یافته‌ها

۶-۱- راندمان انکپسولاسیون





در این تحقیق کارایی انکپسولاسیون برای نایسین حدود ۸۵-۹۲٪، برای ناتامايسین حدود ۸۹-۹۶٪ و برای مخلوط آنها حدود ۸۵-۸۹٪ تعیین شد. در این تحقیق از پلی‌اتیلن گلیکول و گلیسرول به جای کلسترول، جهت انعطاف پذیری دیواره نanoliposomes، افزایش اندازه ذرات و پایداری سیستم لیپوزومی استفاده شد.

۶-۲- آزمون های میکروبی

نتایج حاصل از تاثیر نایسین آزاد و لیپوزومی و همچنین مخلوط آنها (نایسین و ناتامايسین آزاد و لیپوزومی شده) بر جمعیت استافیلکوکوس اورئوس در دماهای مختلف در شکل (۱) و (۲) تاثیر فرمولاسیون‌های مختلف بر کاهش جمعیت استافیلکوکوس اورئوس در دمای ۸°C و ۲۵°C در مدت ۲۸ روز نشان داده شده است. با توجه به شکل (۱) و (۲)



فرمولاسیون های که فقط حاوی نایسین هستند، شمارش باکتریایی به طور چشمگیری پایین تر است.




شکل ۲ تاثیر فرمولاسیون های مختلف بر کاهش جمعیت آسپرژیلوکوس اورئوس در دمای 25°C در غلظت های مختلف


۶-۴- نتایج حاصل از تاثیر ناتاما نایسین آزاد و لیپوزومی و همچنین مخلوط آنها بر جمعیت

آسپرژیلوکوس نایجر در دماهای مختلف

در شکل (۳) و (۴) تاثیر فرمولاسیون های مختلف بر کاهش جمعیت آسپرژیلوکوس نایجر در دمای 8°C در مدت ۲۸ روز نشان داده شده است.



شکل ۱ تاثیر فرمولاسیون های مختلف بر کاهش جمعیت آسپرژیلوکوس اورئوس در دمای 8°C در غلظت های مختلف




شکل ۴ تاثیر فرمولاسیون های مختلف بر کاهش جمعیت آسپرژیلوس نایجر در دمای ۲۵°C

۱-۷ تعیین اندازه ذرات

با توجه به نتایج درج شده در جدول (۱) تمامی فرمولاسیون ها اندازه ذرات زیر ۱۰۰ نانومتر داشتند. همچنین با افزوده شدن پلی اتیلن گلیکول (موجب انعطاف پذیری در ساختار لیپوزومها و

با توجه به شکل (۳) و (۴) می توان نتیجه گرفت که در همه فرمولاسیون ها کاهش چشمگیری در شمارش قارچ در همه سطوح ۵، ۱۰ و ۱۵ ppm مشاهده می شود. در نمونه های حاوی ناتامایسین آزاد و مخلوط نایسین و ناتامایسین آزاد در زمان صفر کاهش چشمگیری در شمارش قارچی مشاهده شد. ولی این کاهش در روز های ۷، ۱۴ و ۲۱ تقریباً ثابت بوده و حتی در روز ۲۸ اندکی افزایش در شمارش قارچی مشاهده شد.



شکل ۳ تاثیر فرمولاسیون های مختلف بر کاهش جمعیت آسپرژیلوس نایجر در دمای ۸°C

باعث کاهش اندازه ذرات می شود. با توجه به ساختار آب گریز نایسین و ناتاما نایسین اندازه ذرات تدریجاً کاهش می یابد که این امر باعث کاهش در راندمان انکپسولا سیون می شود. ولی با استفاده از پلی اتیلن گلیکول به علت افزایش اندازه و انعطاف پذیری دیواره نانو لیپوزوم ها، راندمان انکپسولا سیون به طور چشمگیری افزایش می یابد [۲۱]. با توجه به تحقیقی که توسط هوانگ و همکاران، [۲۲] انجام شد، غلظت لستیین نیز عامل مهمی در میزان راندمان انکپسولا سیون است که با نتایج این تحقیق (۳۰ میلی مولار لستیین) مطابقت دارد.

۳-۷ نتایج حاصل از تاثیر نایسین آزاد و لیپوزومی و همچنین مخلوط آنها بر جمعیت استافیلوکوکوس اورئوس و آسپرژیلوس نایجر در دماهای مختلف

استفاده از نایسین و ناتاما نایسین به صورت آزاد به دلیل واکنش با اجزای محیط و با باند شدن بر پریدهای پروتئین ها، خاصیت ضد میکروبی و ضد قارچی را کاهش می دهد [۲۳]. نتایج بدست آمده با نتایج زایر زاده و همکاران [۵] مطابقت داشت. این محققان در بررسی اثر ضد باکتریایی نایسین به دو فرم آزاد و انکپسوله در لیپوزوم، بر ماندگاری و کاهش جمعیت لیستریایی پنیر، به این نتیجه رسیدند که اختلاف معنی داری بین عملکرد نایسین آزاد و محصور در نانو کپسول های لیپوزومی بر روند کاهش جمعیت لیستریایی وجود دارد. همچنین در تیمار نایسین آزاد، جمعیت لیستریایی طی ۲ ساعت اولیه پس از تلقیح، به شدت کاهش یافته و پس از آن نسبتاً ثابت مانده است. در تیمار لیپوزومی نایسین، روند خطی کاهش مشاهده گردید، تفاوت آن با تیمار نایسین آزاد در نحوه روند کاهش بود، زیرا که در فرمول لیپوزومی یک روند کاهش به صورت خطی و مداوم بود. روند کاهش جمعیت لیستریایی در تیمار نایسین آزاد و فرمول لیپوزومی حاوی نایسین، مربوط به رهایش کترول شده لیپوزوم ها در طی زمان می باشد همچنین نتایج به دست آمده توسط مهمید و همکاران [۲۴] با نتایج به دست آمده در این تحقیق نیز مطابقت داشت. این محققان به بررسی اثر ناتاما نایسین بر روی باکتری های ایزو لوله شده از خاک های مختلف نشان داد، استفاده از ناتاما نایسین

ایجاد بافت نرم می شود) اندازه ذرات افزایش یافته و با افزوده شدن نایسین و ناتاما نایسین به علت داشتن عوامل آبگریز و قرار گیری بین دو لایه فسفولیپید، اندازه ذرات کاهش پیدا می کند. بر اساس تحقیقات محمد و همکاران [۱۸] نوع و چیدمان ماده فعال در ساختار لیپوزوم ها تاثیر بسزایی بر اندازه ذرات دارد به طوری که ماده فعال آبگریز با قرار گرفتن در سطح و بین ساختار دو لایه ای منجر به افزایش چگالی چیدمان فسفولیپیدی می شود آنها با اندازه گیری فشار سطحی مشاهده کردند که، مساحت موثر هر مولکول لستیین به ازای قرار گرفتن ترکیب فعال کاهش می - یابد، که این امر باعث کاهش اندازه ذرات می شود. با توجه به ساختار آب گریز نایسین و ناتاما نایسین اندازه ذرات باید کاهش یابد ولی با قرار گرفتن پلی اتیلن گلیکول در سطح، اندازه ذرات افزایش می یابد. که با نتایج به دست آمده در این تحقیق مطابقت دارد. نتایج حاصل از شاخص اسپن نشان دهنده، توزیع اندازه ذرات باریک تر و سیستم کلوئیدی همگن تر است. توزیع ذرات برای تمام نمونه های باریک بوده یعنی در نمونه های یکنواختی محتوا و تکرار پذیری قابل مشاهده است

۴-۷ کارایی یا راندمان انکپسولا سیون

افزایش غلظت فسفولیپید منجر به تولید تعداد بیشتر لیپوزوم و همچنین افزایش حجم داخلی کل لیپوزوم و تمرکز بیشتر ماده فعال در سطح و داخل لیپوزوم ها می شود. با توجه به اینکه در این تحقیق مقدار بالایی لستیین (۳۰ میلی مولار معادل ۱/۱۲۵ گرم در ۵۰ میلی لیتر) استفاده شده است، می توان نتیجه گرفت که یکی از عوامل مهم در افزایش راندمان انکپسولا سیون، افزایش غلظت فسفولیپید، در سیستم می باشد [۱۹] در تحقیقی که توسط ویلکینسون و همکاران [۲۰] انجام شد، آنها مشاهده کردند که در سیستم های لیپوزومی که از ترکیباتی مانند کلسیتروول استفاده شده است، به علت سخت شدن دیواره لیپوزوم ها و در نتیجه کاهش اندازه آنها نسبت به فسفاتیدیل کولین خالص، راندمان انکپسولا سیون کاهش یافته. همچنین ماده فعال نیز در ساختار لیپوزوم ها تاثیر بسزایی بر اندازه ذرات دارد که آن هم به طور مستقیم بر راندمان انکپسولا سیون تاثیر دارد. به طوری که ماده فعال آبگریز با قرار گرفتن در سطح و بین ساختار دو لایه ای منجر به افزایش چگالی چیدمان فسفولیپیدی می شود که این امر

۱۰- منابع

- [1] Cleveland J, Montville TJ, Chikindas ML, Nes IF. Bacteriocins: safe, natural antimicrobials for food preservation, 2001. *Int J Food Microbiol.* 71: 1-20.
- [2] Mozafari M, Johnson C, Demetzos C. Nanoliposomes and their application in food nanotechnology. 2008. *In J Liposome.* 18: 309 – 327.
- [3] Deegan LH, Cotter PD, Hill C, Ross P. 2006. Bacteriocins: biological tools for bio-preservation and shelf-life extension. *In Dairy J.* 16:1058-1071.
- [4] Delves-Broughton J, Williams GC, Wilkinson S. 1992. The use of the bacteriocin nisin, as a preservative in pasteurized liquid whole egg. *Letts Appl Microbiol.* 15:133–136.
- [5] Zayerzade E, Mortazavi SA, Jafari MR, Afsharnejad S, TabatabaiYazdi F, Nasiri Mahalati M. 2011. Study antibacteri- ial effect of nisin form Nanolipos and free form, in liposomes on the survival and population decline Listerian Iranian white ultrafiltration cheese. *Iran Food Scie Tech Res J.* 7(3):191-199.
- [6] Moosavy MH, Basti AA, Misaghi A, Karim G, Zahraei Salehi T, Mostafavi E. 2009. Effect of Nisin on the Growth of *Staphylococcus aureus* in Commercial Barley Soup. *Pharm Sci.* 15(3): 235- 240.
- [7] Were LM, Bruce B, Davidson P, Weiss G. 2003. Encapsulation of Nisin and Lysozyme in Liposomes Enhances Efficacy against *Listeria monocytogenes*. *J Food Prot.* 67: 922–927.
- [8] Davidson P, John N, Sofos AL. 2004. Antimicrobials in Food. *Food Sci Technol.* 145: 273-291.
- [9] Hondrodimou O, Kourkoutas Y, Panagon EZ. 2011. Efficacy of natamycin to control fungal growth in natural black olive fermentation. *Food Microbiol.* 28: 621-627.
- [10] Malheiros PS, Daroit DJ, Brandelli A. 2010. Food application of liposome encapsulated antimicrobial peptides. *Trends Food Sci Tech.* 21: 284-292.
- [11] Weiss J, Gaysinsky S, Mclement J. 2009. Nanostructured encapsulation systems: food antimicrobials. *Global Issues Food Sci Tech.* 24: 435-443.

اثر قابل توجهی بر روی تشکیل واحدهای کلنجی باکتریایی و پک در این نمونه دارد. همچنین نتایج نشان داد، جمعیت باکتری‌ها در حالت حضور و عدم حضور ناتامایسین متفاوت می‌باشند. در بررسی دماهای ۸ و ۲۵ درجه سانتی‌گراد در کاهش بار میکروبی و کاهش جمعیت قارچ‌ها، می‌توان به این مورد اشاره نمود که دمای پایین و استفاده از ترکیبی از باکتریوسین‌ها اثر چشمگیری بر کاهش بار باکتریایی و شمارش جمعیت قارچی دارد. هر چند که کاهش شمارش باکتریایی و قارچی در هر دو دمای نگهداری ۸ و ۲۵ درجه سانتی‌گراد قابل توجه است ولی نتایج در دمای ۸°C چشمگیر تر است، که می‌تواند به علت رشد سریع و بیشتر باکتری‌ها و قارچ‌ها در دماهای بالاتر باشد. نتایج بدست آمده با نتایج تحقیق موسوی و همکاران (۲۰۰۹) مطابقت داشت. در این تحقیق به بررسی اثر نایسین به عنوان یک باکتریوسین بر رشد و بقاء استافیلوکوکوس/رئوس در سوپ جو تجاری در دو دمای ۸ و ۲۵ درجه سانتی‌گراد پرداخته شده است. براساس یافته‌های این تحقیق مقادیر مختلف نایسین موجب کاهش رشد باکتری شده است همچنین درجه حرارت نگهداری روی رشد باکتری نیز موثر بوده است بدین معنی که با افزایش دمای نگهداری میزان رشد باکتری و قارچ افزایش یافته است [۲۵].

۸- نتیجه گیری

نتایج نشان داد، استفاده از فرم لیپوزومی مواد ضد میکروبی نسبت به فرم آزاد آن، استفاده از ترکیبی از باکتریوسین‌ها (نایسین و ناتامایسین) و دمای پایین نگهداری تاثیر بیشتری بر کاهش جمعیت میکروبی و قارچی داشته است.

۹- تقدیر و تشکر

بدین وسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را از معاونت آموزشی و تحقیقات تکمیلی دانشگاه تبریز و مرکز تحقیقات کاربردی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز بدليل تامین امکانات و تجهیزات و حمایت مالی از این پژوهش اعلام می‌داریم.

- drug loaging and ESEM analysis of stability. *In J of Pharam* 2004; 285: 23-34.
- [19] Rasti B, Jinap S, Mozafari MR, Yazid AM. Comparative study of the oxidative and physical stability of liposomal and nanoliposomal polyunsaturated fatty acids prepared with conventional and Mozafari methods. *Food Chem* 2012; 135: 2761–2770.
- [20] Wilkinson M, Kilcawley K. Mechanisms of incorporation and release of enzymes into cheese during ripening. *In Daiy J* 2005; 15: 817-830.
- [21] Benche R, Kheadr E. Inhibition of *Listeria innocua* in cheddar cheese by addition of nisin Zin liposome or by in situ production in mixed culture. *App Environmental Microbiol* 2002; 68:3683-3890
- [22] Hwange SY, Kim HK, Choo J, Seong GH, Hien D, Lee EK. Effects of operating parametrs on the efficiency of liposome encapsulatin of enzymes. *Collides surface Biointer* 2012; 94: 296-303.
- [23] Mohamed AN, Ranjard L, Catroux C, Catroux R, Hartmann A. Effect of natamycin on the enumeration, genetic structure and composition of bacterial community isolated from soils and soybean rhizosphere. *J Microbiol Meth* 2005; 60: 31– 40.
- [24] Mohamadi Sani A, Ehsani MR. [Effect of natamycin on UF-Feta-cheese shelf life]. *J Pajo Sazandegi* 2007; 71.
- [25] Moosavy MH, Basti AA, Misaghi A, Karim G, Zahraei Salehi T, Mostafavi E. Effect of Nisin on the Growth of *Staphylococcus aureus* in Commercial Barley Soup. *Pharmaceutical Sci* 2009; 15: 235- 240.
- [12] Rasti B, Jinap S, Mozafari MR, Yazid AM. 2012. Comparative study of the oxidative and physical stsbsility of liposome and nanoliposom polyunsaturated fatty acids prepared with conventional and mozafari methods. *Food chem. in press paper*.
- [13] Tizchang S, Sowti M, Rezai R, Ganbarzadeh B, Javadzadeh Y. 2013. Optimization and Study of physical properties of liposomes containing nisin]. *J Food sci New tech.* 2: 59-68. (Persian).
- [14] Mozafari M, Johnson C, Demetzos C. 2008. Nanoliposomes and their application in food nanotechnology. *In J of Liposome*. 18: 309 – 327.
- [15] Marsanasco M, Márquez AL, Wagner JR, Alonso S, Chiaramoni NS. 2011. Liposomes as vehicles for vitamins E and C: An alternative to fortify orange juice and offer vitamin C protection after heat treatment. *Food Res Int*. 44: 3039-3046.
- [16] Teeranachaideekul V, Souto E, Junyaprasert V, Muller R. 2007. Cetyl palmitate-base NLC for topical delivery of Coenzym Q10-Development, physicochemical characterization and in vivo release studies. *Eur J Pharm*. 67: 141-148.
- [17] Watanabe N, Kamei S, Ohkubo A, Yamanaka M, Ohsawa S, Makino S. 1986. Urinary protein as measured with a pyrogallol red-molybdate complex manually and in a Hitachi 726 automated analyzer. *Clin Chem*. 32: 1551-1554.
- [18] Mohammed AR, Weston N, Coombes G, Fitzgerald M, Perrie Y. Liposome Formulation of poorly water soluble drugs: Optimisation of

Study of Antibacterial Effect of Nano-Encapsulated Nisin and Natamycin in Liposomes against the growth of *Staphylococcus aureus* and *Aspergillus niger*

Ziae, M. ¹, Sowti Khiabani, M. ², Tizchang, S. ^{3*}, Ghanbarzadeh, B. ⁴, Hamishehkar, H. ⁵, Rezay Mokaram, R. ²

1. M.Sc. Student, Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2. Associated Professor, Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
3. Ph.D. student, Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
4. Professor, Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
5. Assistant Professor, Department of Pharmaceutical Science, Pharmaceutical Technology Laboratory, Drug Applied Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

(Received: 93/11/24 Accepted: 94/2/19)

Nisin and natamycin have been used as antimicrobial agents in food and pharmaceutical applications. In its free form, nisin can react with reducing sugars and can non-specifically bind with lipids and proteins and hence its antibacterial activity is reduced. To overcome these limitations, using of liposomes has been reported. The main object of the present study was to study of antibacterial and antifungal Effect of nano-Encapsulated nisin and natamycin in liposomes against the growth of *Staphylococcus aureus* and *Aspergillus niger*. In this research, liposomes containing nisin and natamycin were produced. Then, particle size of nano-liposome, encapsulation efficiency and antimicrobial and antifungal effects of free and nano-encapsulated nisin and natamycin at tempreture of 8 and 25°C were investigated. The results showed that particle size and size distribution (span) was 76-90 nm and 0.73-0.9 nm respectively. The encapsulation efficiency of nisin and natamycin were 85-92% and 89-96%, respectively. The antimicrobial and antifungal results showed that use of encapsulated form of them, combination of bacteriocins and low tempreture storage is more effective. In this study nanoliposomes were prepared successfully by Mozaffari method. The Mozaffari method was effeicient method for encapsulation of nisin and natamycin and evaluation of their antimicrobial and antifungal properties.

Keywords: Nisin, Natamycin, NanoLiposom, Antimicrobial agent, Heating method

* Corresponding Authors E-Mail Address: stizchang@yahoo.com